

Pyrrurha standaardeisen.

VOORWOORD:

Gezien de ontwikkeling van de kweek van de pyrrhurasoorten, die meer en meer onderhevig is aan een domesticatieproces en welke soorten we meer en meer tegenkomen op tentoonstellingen, achtte het bestuur van de Keurmeestervereniging Tropische vogels en Parkieten het noodzakelijk een soortbeschrijving voor deze soorten te ontwikkelen.

De opzet hiervan is beknopt en staat de keurmeester ten dienste als kleuomschrijving van de diverse soorten en enkele ondersoorten.

De verwachting is, dat binnen een aantal jaren de kweek van deze soorten een grote vorm zal aannemen en ongetwijfeld zullen er dan diverse mutanten ontstaan. De beschrijving van deze mutanten kan vrij gemakkelijk worden tussengevoegd, omdat de uitgave een losbladig systeem betreft.

Zonder medewerking van de TC van de PSC en van ervaren kwekers van de pyrrhurasoorten zou deze kleurstandaard niet uitgebracht kunnen worden.

Het bestuur van de KKMV-TP spreekt hierbij dan ook haar dank daarvoor uit.

Zoals bij elke standaard c.q. kleurbeschrijvingsstandaard zal ook deze soortbeschrijving periodiek herzien en bijgewerkt moeten worden, wat gen bezwaar voor deze uitgave mag zijn.

Tenslotte spreekt het bestuur van de KMV-TP de hoop uit, dat deze soortbeschrijving van de soorten mag bijdragen aan de ontwikkeling van de kweek met de pyrrhurasoorten.

Bergen op Zoom, zomer 1999.

In het najaar van het 2004 werd duidelijk dat uitgave van 1999 in een behoefte voorziet maar inmiddels niet meer aansluit bij de ontwikkelingen. Met medewerking van de TC van de PSC en van ervaren kwekers van de pyrrhurasoorten is deze uitgave dan ook uitgebouwd en verfijnd. Het bestuur van de KMV-TP spreekt hier haar dank voor uit en wenst de liefhebbers, kwekers en keurmeesters een aangenaam gebruik van deze standaard.

Herziene uitgave , zomer 2005.

Het bestuur van de Keurmeestervereniging
Tropische vogels en Parkieten.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord		1
Inhoudopgave		2
Overzicht wetenschappelijke naam naar Nederlandse naamgeving	4	
Algemeen		5
Soort /Kleurbeschrijving		
<i>NEDERLANDSE BENAMING</i>		
<i>WETENSCHAPPELIJKE BENAMING</i>		
Azara parkiet	Pyrrhura frontalis chiripepe	10
Azuro parkiet	Pyrrhura picta eisenmanni	36
Blauwkeelparkiet	Pyrrhura cruentata	6
<u>Bruinoorparkiet</u>		
Bruinoorparkiet	Pyrrhura frontalis frontalis	8
Krieg's bruinoorparkiet	Pyrrhura frontalis kriegi	9
<u>Ciriquiparkiet</u>		
Ciriquiparkiet	Pyrrhura hoffmanni gaudens	53
Demara parkiet	Pyrrhura egregia egregia	38
Deville's parkiet	Pyrrhura devillei	7
El Oro parkiet	Pyrrhura orcesis	54
Gran-Sabanaparkiet	Pyrrhura egregia obscura	39
<u>Groenwangparkiet</u>		
Argentijnse groenwangparkiet	Pyrrhura molinae australis	20
Mato Grosso groenwangparkiet	Pyrrhura molinae sordida	17
Mato Grosso groenwangparkiet zeegroen	Pyrrhura molinae sordida var	18
Palmarito groenwangparkiet	Pyrrhura molinae restricta	19
Schegel's groenwangparkiet	Pyrrhura molinae phoenicura	16
Geelvleugel groenwangparkiet	Pyrrhura molinae flavoptera	21
Groenwangparkiet	Pyrrhura molinae molinae	15
<u>Geelflankparkiet</u>		
Geelflankparkiet	Pyrrhura hypoxanta	22
Geschilderde parkiet	Pyrrhura picta picta	28
Hoffmann's parkiet	Pyrrhura hoffmanni hoffmanni	52
Jaraquelparkiet	Pyrrhura picta subandina	33
Magdalenaparkiet	Pyrrhura picta caeruleiceps	34
Neumann's parelparkiet	Pyrrhura perlata anerythra	13
Maritima parelparkiet	Pyrrhura perlata coerulescens	12
Pantchenko's parkiet	Pyrrhura picta pantchenkoi	35
Prachtvleugel parkiet	Pyrrhura calliptera	48
Prins Luciens parkiet	Pyrrhura picta lucianii	31
Roodbuik parkiet	Pyrrhura perlata perlata	14
Roodkop parkiet	Pyrrhura picta roseifrons	32
<u>Roodstaartparkiet</u>		
Kleine blauwvleugel roodstaartparkiet	Pyrrhura picta microtera	30
Roodkop roodstaartparkiet	Pyrrhura rholocephala	51

<u>Roodoorparkiet</u>		
Cubiro roodoorparkiet	Pyrrhura hoematotis immarginata	50
Roodoorparkiet	Pyrrhura hoernetotis hoematotis	49
Sandia steenparkiet	Pyrrhura rupicola sandiae	46
Santa Martaparkiet	Pyrrhura viridicata	37
Santaremparkiet	Pyrrhura picta amazonum	29
Steenparkiet	Pyrrhura rupicola rupicola	45
Wagler's parkiet	Pyrrhura perlata lepida	11
Witborst parkiet	Pyrrhura albipectus	47
<u>Witoorparkiet</u>		
Emma's witoorparkiet	Pyrrhura leucotis emma	26
Grijsborst witoorparkiet	Pyrrhura leucotis griseipectus	24
Monagas witoorparkiet	Pyrrhura leucotis auricularis	27
Pfrimer's witoorparkiet	Pyrrhura leucotis pfrimeri	25
Witoorparkiet	Pyrrhura leucotis leucotis	23
<u>Zwartstaartparkiet</u>		
Chapman's zwartstaartparkiet	Pyrrhura melanura chapmani	44
Pacific zwartstaartparkiet	Pyrrhura melanura pacifica	43
Souance's zwartstaartparkiet	Pyrrhura melanura souancei	41
Zwartstaart parkiet	Pyrrhura melanura melanura	40
Berlepsch zwartstaartparkiet	Pyrrhura melanura berlepschi	42

Overzicht wetenschappelijke naam naar Nederlandse naamgeving:

WETENSCHAPPELIJKE BENAMING:

NEDERLANDSE BENAMING:

<i>Pyrrhura albipectus</i>	Witborstparkiet
<i>Pyrrhura calliptera</i>	Prachtvleugel parkiet
<i>Pyrrhura cruetata</i>	Blauwkeelparkiet
<i>Pyrrhura devillei</i>	Deville's parkiet
<i>Pyrrhura egregia egregia</i>	Demara parkiet
<i>Pyrrhura egregia obscura</i>	Gran-Sabanaparkiet
<i>Pyrrhura frontalis chiripepe</i>	Azara's parkiet
<i>Pyrrhura frontalis frontalis</i>	Bruinoorparkiet
<i>Pyrrhura frontalis kriegi</i>	Krieg's bruinoorparkiet
<i>Pyrrhura hoematotis hoematotis</i>	Roodoorparkiet
<i>Pyrrhura hoematotis immarginata</i>	Cubiro roodoorparkiet
<i>Pyrrhura hoffmanni gaudens</i>	Ciriquiparkiet
<i>Pyrrhura hoffmanni hoffmanni</i>	Hoffmann's parkiet
<i>Pyrrhura hypoxantha</i>	Geelflankparkiet
<i>Pyrrhura leucotis auricularis</i>	Monagas witoorparkiet
<i>Pyrrhura leucotis emma</i>	Emma's witoorparkiet
<i>Pyrrhura leucotis griseipectus</i>	Grijsborst witoorparkiet
<i>Pyrrhura leucotis leucotis</i>	Witoorparkiet
<i>Pyrrhura leucotis pfrimeri</i>	Pfrimer's witoorparkiet
<i>Pyrrhura melanura berlepschi</i>	Berlepschi's parkiet
<i>Pyrrhura melanura chapmani</i>	Chapman's zwartstaartparkiet
<i>Pyrrhura melanura melanura</i>	Zwartstaart parkiet
<i>Pyrrhura melanura pacifica</i>	Pacific zwartstaartparkiet
<i>Pyrrhura melanura souancei</i>	Souance's zwartstaartparkiet
<i>Pyrrhura molinae australis</i>	Argentijnse groenwangparkiet
<i>Pyrrhura molinae molinae</i>	Groenwangparkiet
<i>Pyrrhura molinae phoenicura</i>	Schlegel's groenwangparkiet
<i>Pyrrhura molinae restricta</i>	Palmarito groenwangparkiet
<i>Pyrrhura molinae sordida</i>	Mato Grosso groenwangparkiet
<i>Pyrrhura molinae flavoptera</i>	Geelvleugel groenwangparkiet
<i>Pyrrhura molinae sordida var.</i>	Mato Grosso groenwangparkiet zeegroen.
<i>Pyrrhura orcesis</i>	El Oro parkiet
<i>Pyrrhura perlata anerythra</i>	Neumann's parelparkiet
<i>Pyrrhura perlata coerulescens</i>	Maritiba parelparkiet
<i>Pyrrhura perlata lepida</i>	Wagler's parkiet
<i>Pyrrhura perlata perlata</i>	Roodbuikparkiet
<i>Pyrrhura picta amazonum</i>	Santaremparkiet
<i>Pyrrhura picta caeruleiceps</i>	Magdalenaparkiet
<i>Pyrrhura picta eisenmanni</i>	Azuero parkiet
<i>Pyrrhura picta lucianii</i>	Prins Lucien's parkiet
<i>Pyrrhura picta microtera</i>	Kleine blauwvleugel roodstaartparkiet
<i>Pyrrhura picta pantchenkoi</i>	Pantchenko's parkiet
<i>Pyrrhura picta picta</i>	Geschilderde parkiet
<i>Pyrrhura picta roseifrons</i>	Roodkopparkiet
<i>Pyrrhura picta subandina</i>	Jarquielparkiet
<i>Pyrrhura rholocephala</i>	Roodkop roodstaartparkiet
<i>Pyrrhura rupicola rupicola</i>	Steenparkiet
<i>Pyrrhura rupicola snadaiae</i>	Sandia steenparkiet
<i>Pyrrhura viridicata</i>	Santa Martaparkiet

ALGEMEEN:

Voor de tot standkoming van deze soortbeschrijving is hoofdzakelijk het standaardboekwerk Parrots of the World van Joseph. M. Forshaw geraadpleegd.

In deze beschrijving staan dan ook soorten, welke als zeer zeldzaam aan te merken zijn en mogelijk is reeds uitgestorven, terwijl men van een aantal andere soorten denkt, dat er nog maar enkele exemplaren voorkomen. De gegevens van deze soorten dateren dan ook uit de jaren 20. Vast staat echter, dat alle omschrijvingen in "Parrots of the Word" wetenschappelijk zijn vastgesteld, reden waarom dit standaardboekwerk dan ook is gehanteerd.

De verschillen tussen sommige soorten en ondersoorten zijn zo gering, dat men ze met elkaar zou moeten kunnen vergelijken om ze te kunnen onderverdelen.

Het verspreidingsgebied van de Pyrrhurasoorten omvat een groot aantal landen in Zuid-Amerika, waaronder de meesten in Brazilië. Opgemerkt moet worden, dat niet alle Pyrrhurasoorten in dezelfde landen voorkomen. Zo komt b.v. de Pyrrhura perlata in het Amazonegebied in Brazilië voor en de Pyrrhura orcesi in het Andesgebergte van Equador.

Er is uiterlijk geen geslachtsonderscheid. De jonge vogels lijken al gauw op de volwassen exemplaren.

De kwekers van de pyrrhurasoorten dienen er voor te waken, dat deze vogels onderling niet met elkaar gekruist worden (mutaties bij sommige soorten zou dit in de hand kunnen werken). De tekeningsvelden zijn bij sommige soorten al vrij moeilijk te onderscheiden. De oorspronkelijke (onder)soorten moeten echter duidelijk herkenbaar blijven, ook al zijn de kleuren gereduceerd.

In deze soortbeschrijving wordt gesproken over b.v. roodbruin of rood/bruin, groenblauw of groen/blauw.

Met roodbruin – groenblauw wordt een gemengde kleur bedoeld.

Met rood/bruin – groen/blauw wordt bedoeld; rood of bruin – groen of blauw.

Roodbruin is overwegend rood. Bruinrood is overwegend bruin. Etc.

De keuring van de Pyrrhurasoorten is een conditiekeuring. Dat wil zeggen, dat de vogels in hoofdzaak beoordeeld worden op de regelmatigheid en symmetrie van de tekening, de juiste kleurdiepte en –egaliteit en uiteraard de conditie.

Ringmaat:

Kleine Pyrrhura's, zoals de leucotis 4,5 mm.

Middelgrote Pyrrhura's zoals de frontalis 5 mm.

Grote Pyrrhura's, zoals de cruentata 5,4 mm.

SOORT - / KLEURBESCHRIJVING:

BLAUWKEELPARKIET.

Wetenschappelijk naam: Pyrrhura cruentata.
Duits: Blaulatzsittich
Engels: Blue-throated conure

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA CRUENTATA:

Van de P. cruentata zijn geen ondersoorten bekend.

Formaat: Lengte 30 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel grijs donkerbruin, geleidelijk overgaand in grijs/donkerbruin, met gele omzoming richting nek. Wangen olijfgroen. Oorstreek roodbruin, naar achteren overgaand in een oranje-gele nekpartij. Het roodbruin van de oorstreek loopt onder het oog door tot aan de snavel. Rond het oog een onbevederde grijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht helder rood. Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel olijfgroen, buitenste Vleugelpennen grijs/zwart.

Lichaam:

Hals groen, geleidelijk overgaand in een blauwe kropstreek. Nek blauwgroen. Borst, flanken en buik groen. Onderbuik donkerrood. Mantel en rug groen. Onderrug donkerrood. Stuit rood, overgaand in groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren olijfgroen/geel. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruingeel.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijsbruin/zwart.

BIJZONDERHEDEN:

De Pyrrhura cruentata wordt als nominaatvorm beschreven. Overige benamingen: Blue-chested conure, Orche-marked conure, Red-rumped conure, Red-eared conure. Perruche Tiriba en Roodoorparkiet.

DEVILLE'S PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura devillei*
Duits: Bolivien Rotschwanzsittich
Engels: Blaze-winged conure.

ONDESOORTEN VAN PYRRHURA DEVILLEI:

Van de *P. devillei* zijn geen ondersoorten bekend.

Formaat: Lengte 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd groen/bruin. Schedel asbruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal bruinrood tot zwart bandje. Wangen groen. Oostreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde grijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom scharlaken rood. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel overwegend rood/olijfgeel. Buitenste vleugelpennen blauwgroen.

Lichaam:

Hals olijfgroen/bruin, met een witachtig-gele omzoming. Borst en zijanten nek olijfgroen/asbruin. Buik groen, met plaatselijk rood. Onderbuik roodbruin. Flanken, mantel en rug groen. Stuit olijfgroen, iets rood.

Staat:

Bovenstaartdekveren olijfgroen, aan het eind bruinrood. Onderstaart groen.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijsbruin/zwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *Pyrrhura devillei* wordt als nominaatvorm omschreven. In de natuur komen hybriden voor van de *P. devillei* en *P. frontalis*. Deze soort komt niet in Nederland voor. Overige benamingen: Bronze-winged conure, Bolivia roodstaartparkiet en Devillesittich.

BRUINOOR PARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura frontalis frontalis.
Duits: Braunohrsittich
Engels: Maroon-bellied conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA FRONTALIS:

Van de bruinoorparkiet (P. f. frontalis) zijn de volgende ondersoorten bekend:

Pyrrhura frontalis chiripepe Azaraparkiet
Pyrrhura frontalis kriegi Krieg's bruinoorparkiet.

MUTATIES VAN DE BRUINOOR PARKIET:

Van de bruinoorparkiet is de pastelmutatie ontstaan. Deze nieuwe kleurslag toont (vooralnog) een geringe melanine reductie waardoor de meeste kleuren in het algemeen lichter zijn. Met name de veervelden van het vleugeldek, de mantel en de buik tonen een duidelijke opbleekfactor. Het van oorsprong groen toont geelachtig groen. Gestreefd dient te worden naar een goede kleuregaliteit.

Formaat : Lengte 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel groen met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal bruinrood bandje. Wangen en nek groen. Oorstreek bruingrijs. Rond het oog een onbevederde witte ring, 3 felrode veertjes boven de neusdoppen.

Vleugels:

Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauwgroen, aan de toppen overwegend groen. Ondervleugel groen, buitenste vleugelpennen blauwgroen.

Lichaam:

Hals olijfgroen/bruin, met een geelbruine omzoming. Nek groen. Borst en buik bruin/olijfgroen, met een gedeeltelijk geelbruine omzoming. Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel, rug en stuit groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren olijfgroen, vaak bruinrood aan het einde. Onderstaart groen, gedeeltelijk roodbruin.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De Pyrrhura frontalis frontalis wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van deze bruinoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Reddish-bellied conure, Brown-eared conure, Scally breasted conure.

KRIEG'S BRUINOOR PARKIET

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura frontalis kriegi*.
Duits: Krieg's Braunohrsittich
Engels: Krieg's conure.

Formaat: Lengte 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel groen met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal bruinrood bandje. Wangen en nek groen. Oorstreek bruingrijs. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugel:

Vleugeldekken, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel overwegend groen. Buitenste vleugelpennen blauwgroen.

Lichaam:

Hals olijfbruin/groen met een bleekgele omzoming. Nek groen. Borst en buik olijfgroen/bruin. Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen/bruinrood, meestal bruinrood aan het einde. Onderstaart groen, aan de punten iets bruinrood.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijszwart.

Snavel: Grijszwart

BIJZONDERHEDEN:

De *P. f. kriegi* wordt als ondersoort omschreven van *P. f. frontalis*. De beschrijving van de Krieg's bruinoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

AZARA PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura frontalis chiripepe*.
Duits: Paraguay - Braunohrsittich.
Engels: Azara's conure.

Formaat:

Lengte 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel groen met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een bruinrood bandje. Wangen en nek groen. Oorstreek bruingrijs. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen. Buitenste vleugelpennen blauwgroen.

Lichaam:

Hals olijfbruin met een gele omzoming. Nek, borst en buik olijfgroen/bruin. Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel, rug en stuit groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren olijfgroen, zonder een bruin uiteinde. Onderstaart groen/roodbruin.

Ogen:

Donkergrijs.

Poten:

Grijs, nagels grijszwart.

Snavel:

Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. f. chiripepe* wordt als ondersoort omschreven van de *P. f. frontalis*. Overige benamingen: Blaze- of Bronze-winged conure.

PARELPARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura perlata perlata.
Duits: Blausteißsittich.
Engels; Crimson-bellied conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA PERLATA PERLATA:

Van de parelparkiet (P.p. perlata) zijn de volgende ondersoorten bekend:

P. perlata anerythra` Neumann's parelparkiet.
P. perlata coerulescens Maritiba parelparkiet.
P. perlata lepida Wagler's parelparkiet.

WAGLER'S PARELPARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura perlata lepida.
Duits: Blauwangensittich.
Engels; Pearly conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel diep bruingrijs met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal donker bruingrijs bandje. Wangen blauwgroen. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom helder rood. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel roodgrijs.

Lichaam:

Hals, borst en nek bruingrijs, met een grijze omzoming. Op de bovenborst en in de nek onregelmatig groen en blauw. buik groen, iets blauw bewaasd. Onderbuik plaatselijk roodbruin. Flanken groen, met plaatselijk blauw. Mantel en rug groen. Stuit groen uitlopend tot blauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis olijfgroen. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Roodbruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De P. p. lepida wordt als ondersoort omschreven van de P.p. perlata. De beschrijving van de Wagler's parelparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren.

Overige benamingen: Geen.

MARITIBA PARELPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura perlata coerulescens*.
Duits: Maritiba Blausteißittich.
Engels: Maritiba pearly conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd bruingrijs. Schedel bleekbruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal donkerbruin bandje. Wangen groen/blauw, overgaand in blauw aan de benedenrand. Oorstreek grijs/bruingeel. Rond het oog en onbevederde witte ring. Teugel groen.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom helder rood. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel roodgrijs.

Lichaam:

Hals en borst bruingrijs, met een grijsbruine omzoming. Op de bovenborst en nekpartij onregelmatig blauw. Buik groenblauw sterk blauw bewaasd. Op de middenonderbuik iets rood. Flanken blauw. Mantel en rug groen. Stuit groen, plaatselijk bruinrood.

Staat:

Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis olijfgroen. Onderstaart overwegend roodbruin, iets blauw.

Ogen: Roodbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. p. coerulescens* wordt als ondersoort omschreven van de *P. p. perlata*. De beschrijving van de Maritiba parelparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

NEUMANN'S PARELPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura perlata anerythra*.
Duits: Neumann's Blausteißsittich
Engels: Neumann's pearly conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd bruin. Schedel bleekbruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal donkerbruin bandje. Wangen groen, geleidelijk overgaand in blauw aan de benedenrand. Oorstreek bruingeel. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, soms iets rood. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen, soms iets rood.

Lichaam:

Hals en borst bruingrijs, met een geelbruine omzoming. Op de bovenborst en nekpartij onregelmatig blauw. Buik groen, iets blauw bewaasd met op de middenonderbuik iets rood. Flanken groen, plaatselijk iets blauw. Mantel en rug groen. Stuit groen, plaatselijk bruinrood.

Staat:

Bovenstaartdekveren bruinrood, plaatselijk olijfgroen. Onderstaart overwegend roodbruin, iets groenblauw.

Ogen: Roodbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. p. anerythra* wordt als ondersoort omschreven van de *P. p. perlata*. Overige benamingen: Geen.

ROODBUIKPARKIET:

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura perlata perlata*
Duits: Rotbauchsittich.
Engels: Crimson-bellied conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel bruin tot zwartbruin en doorspekt met blauwe veertjes. Op het voorhoofd, direct boven de snavel een smal roodbruin bandje. Wangen geelachtiggroen, aan de benedenrand iets blauw. Rond het oog een onbevederde witte oogring.

Vleugels:

Vleugeldek groenblauw. Vleugelbocht rood. Vleugelzoom blauw. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel rood.

Lichaam:

Hals, bovenborst en nek bruin, met een brede lichtgrijze tot bleekgele omzoming. Nek plaatselijk grijs/blauw. Onderborst en buik helder rood, met enkele centimeters onder de vleugelbochten een vrij strakke borst-buik afscheiding. Onderbuik rood, onderstaartdekveren blauw,. Flanken blauw, plaatselijk iets groen. Mantel en rug olijfgroen. Stuit olijfgchtig groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren diep bruinrood, aan de basis groen, aan het eind blauw. Onderstaart donkergrijs.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. p.perlata* wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de roodbuik parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

GROENWANG PARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura molinae molinae.
Duits: Grünwangensittich.
Engels; Green-cheeked conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA MOLINAE:

Van de groenwangparkiet (P. m. molinae) zijn de volgende ondersoorten bekend:

P. molinae australis Argentijnse groenwangparkiet.
P. molinae phoenicura Schlegel's groenwangparkiet.
P. molinae restricta Palmarito groenwangparkiet
P. molinae sordida Mato Grosso groenwangparkiet
P. molinae sordida var. Zee-groene Mato-Grosso groenwangparkiet.
P. molinae flavoptera Geelvleugel groenwangparkiet (1994, CBF 2693)

Formaat: 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd *en* schedel donker grijsbruin, overgaand in bruingroen.. Wangen groen, oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen met blauwe waas.

Lichaam:

Hals uiteenlopend van bruin tot grijsgroen, met een lichte wit tot bleekgele omzoming. Nek bleekbruin, met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst bleekbruin tot groen, met een lichte bruingele omzoming. Buik groen, plaatselijk roodbruin. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel, rug, flanken en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren donker rood, aan de basis groen, aan het eind iets blauw. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De p. m. molinae wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de groenwangparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Rotschwanzsittich, Molinaparkiet, Molinasittich.

SCHLEGEL'S GROENWANGPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura molinae phoenicura*.
Duits: Schlegels Grünwangen Rotschwanzsittich

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel donker grijsbruin, overgaand in bruingroen. Wangen groen. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen, met blauwe waas.

Lichaam:

Hals bleekbruin, met een donkerbruine omzoming. Nek bleekbruin, met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst groen tot bleekbruin, met een lichte bruingele omzoming. Buik groen, plaatselijk roodbruin. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel, rug, flanken en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren, vanuit de basis overwegend groen naar donker rood, naar het einde iets blauw. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Donkergrijs.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. m. phoenicura* wordt als ondersoort van de *P. m. molinae* omschreven. Overige benamingen: Geen.

MATO GROSSO GROENWANGPARKIET.

Wetenschappelijk naam: *Pyrrhura molinae sordida*.
Duits: Mato Grosso Grünwangen Rotschwanzsittich.
Engels: Sordid conure.

MUTATIES VAN DE MATO GROSSO GROENWANGPARKIET.

Bij de Mato Grosso groenwangparkiet is de zeegroen mutatie opgetreden.

Formaat; Lengte 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd donker grijsbruin, op de schedel geleidelijk overgaand in bruingroen. Wangen groen. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen met blauwe waas.

Lichaam:

Hals bleekbruin, met een licht grijze omzoming. Nek bleekbruin, met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst groenbruin. Buik groen, plaatselijk bleek roodbruin. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel, rug, flanken en stuit groen.

Totale lichaamskleur iets donkerder groen als de nominaatvorm.

Staart:

Bovenstaartdekveren donker rood, aan de basis groen, aan het eind iets blauw. Onderstaart roodbruin, naar het eind blauwgroen.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. m. sordida* wordt als ondersoort van de *P. m. molinae* omschreven. De beschrijving van de Mato Grossoparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

MATO GROSSO GROENWANG PARKIET ZEEGROEN.

Kop en masker:

Voorhoofd diep grijs, op de schedel geleidelijk overgaand in bleekgrijs. Op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal grijs bandje. Wangen zeegroen. Oorstreek grijs. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren zeegroen. Vleugelbocht en vleugelzoom zeegroen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel zeegroen, met blauwe waas.

Lichaam:

Hals bleekgrijs, met een lichtgrijze omzoming. Nek zeegroen, met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst grijs tot bleekgrijs, met een geelachtige omzoming. Buik bleek zeegroen. Mantel, rug, flanken en stuit zeegroen.

Staart:

Bovenstaartdekveren grijs. Onderstaart grijs, naar het einde iets blauw.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

Deze nieuwe kleurslag is vooralsnog één van de weinige mutatievormen bij de Pyrrhurasoorten.

De beschrijving van de Mato Grosso parkiet zeegroen is vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren.

PALMARITO GROENWANG PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura molinae restricta*.
Duits: Palmarito Grünwangen Rotschwanzsittich.
Engels: Santa Cruz conure.

Formaat: Lengte 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel donker grijsbruin, overgaand in bruingroen. Wangen groenblauw. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen, met blauwe waas.

Lichaam:

Hals bleekbruin tot grijs, met een grijswitte omzoming. Nek bleekbruin, met plaatselijk enkele blauwe veertjes. Borst bruin, met een lichte grijswitte omzoming. Op de borst plaatselijk iets groen. Buik groen, plaatselijk roodbruin. Midden-onderbuik iets vaal roodbruin. Mantel en rug groen. Flanken en stuit groenblauw.

Staat:

Bovenstaartdekveren donker rood, aan de basis groen, aan het eind blauw. Onderstaart roodbruin, naar het einde blauw.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. m. restricta* wordt als ondersoort van de *P. m. molinae* omschreven. Overige benamingen: Geen.

ARGENTIJNSE GROENWANGPARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura molinae australis.
Duits: Argentinien Grünwangen Rotschwanzsittich.
Engels: Argentine conure.

Formaat: Lengte 26 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel donker grijsbruin. Wangen groen. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen, met blauwe waas.

Lichaam:

Hals bleekbruin tot grijs, met een donkerbruine omzoming. Nek bleekbruin, met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst bruin, met een lichte bruingele omzoming, plaatselijk iets groen. Buik iets groen, echter voornamelijk roodbruin. Mantel, rug, flanken en stuit groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren roodbruin, aan de basis groen, aan het eind nauwelijks iets blauw. Onderstaart dof roodbruin, aan het eind nauwelijks iets blauw.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. m. australis* wordt als ondersoort van de *P. m. molinae* omschreven. De beschrijving van de Argentijnse groenwangparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

GEELVLEUGEL GROENWANGPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura molinae flavoptera*.
Duits: Gelblveugel Grünwangen Sittich.
Engels: Yellowwinged Greenscheeked Conure.

Formaat: Lengte 26 cm

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel donkergrijsbruin. Wangen groen, oorstreek grijsbruin, rond de ogen een onbevederde witte oogring.

Vleugels:

Vleugelbocht geel. Ondervleugeldekken geel. Bovenvleugel groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw.

Lichaam:

Hals uiteenlopend van bruin tot grijsgroen met een lichte wit tot bleekgele omzoming. De nek is bleekbruin met mogelijk enkele blauwe veertjes. Borst bleekbruin tot groen met een lichte bruingele omzoming. Buik groen, middenonderbuik roodbruin. Mantel, rug, flanken en stuit groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren donkerrood, aan de basis groen, aan het eind iets blauw. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs.

Nagels: Grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

Deze soort is in 1994 geregistreerd onder het CBF nummer CBF 2693. Deze soort is niet in Nederland.

Overige benamingen: Geen.

GEELFLANK PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura hypoxantha*.
Duits: Gelbflanksittich.
Engels: Yellow-sided conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA HYPOXANTHA.

Van de *P. hypoxantha* zijn geen ondersoorten bekend.

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd donkergrijsbruin, naar de schedel geleidelijk overgaand in bruin. Wangen groen/bruin, overgaand naar geel. Oorstreek grijsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel geel.

Lichaam:

Hals en kropstreek bruin, met geelwitte omzoming. Nek bruin, met een blauwe band. Bovenborst geelwit, iets bruin gezoomd. Borst geel. Flanken geel, met een smalle groene omzoming. Buik geel tot vaalbruin. Midden-onderbuik oranje-rood. Mantel, rug en stuit geelgroen.

Staat:

Bovenstaartdekveren donkerrood. Onderstaart geel tot roodbruin, aan het eind blauwgroen.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijs.

Snavel: Bruingrijs.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. hypoxantha* is een vrij zeldzame vogel en wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Geen.

WITOORPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura leucotis leucotis*.
Duits: Weißohrsittich.
Engels: White-eared conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA LEUCOTIS:

P. leucotis griseipectus Grijsborst witoorparkiet
P. leucotis pfrimeri Pfrimer's witoorparkiet
P. leucotis emma Emma's witoorparkiet
P. leucotis auricularis Monagas witoorparkiet.

MUTATIES VAN DE WITOORPARKIET.

Van de witoorparkiet is een pastel mutatie bekend. Deze kleurslag toont (vooral nog) een geringe melanine reductie, waardoor de meeste kleuren in het algemeen lichter zijn. Met name de veervelden van het vleugeldekk, de mantel en de buik tonen een duidelijke opbleekfactor. Het van oorsprong groen toont geelachtig-groen. Gestreefd dient te worden naar een goede kleuregaliteit.

WITOORPARKIET.

Formaat: Lengte 23 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel grijsbruin, overgaand in kastanjebruin richting snavel. Op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal blauw bandje. Wangen kastanje bruin, met aan de benedenrand een smal blauw randje. Oorstreek geel tot grijswit. Rond het oog een zeer smalle grijsachtig-blauwe onbevederde ring.

Vleugels:

Vleugeldekkveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek bruin/groen met blauw en iets witgele omzoming. Nek richting kropstreek en borst bruin en blauw, met een witgele omzoming. Flanken en buik groen. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel groen. Rug en stuit roodbruin.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen, naar het eind roodbruin. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin, iris geel tot roodbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. l. leucotis* wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Witoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen. Maroon-faced parrakeet, Blue-naped conure.

GRIJSBORST WITOORPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura leucotis griseipectus*.
Duits: Salvadori Weißohrsittich.
Engels: Brazil greybreasted conure.

Formaat: Lengte 23 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel grijsbruin, overgaand in kastanjebruin richting snavel. Wangen kastanjebruin. Oorstreek wit met aan de randen iets bruin. Rond het oog een smalle onbevederde grijsachtige ring.

Vleugels;

Vleugeldekken groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek bruin, naar de zijanten van de nek vaal grijs. In de nek bevindt zich een blauwe waas. Vanuit de nek richting kropstreek en borst bruingrijs, met witgele omzoming. Flanken en buik groen. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel groen. Rug groen, geleidelijk overgaand in een roodbruine stuit.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen, naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin, iris geelbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. l. griseipectus* wordt als ondersoort van de *P. l. leucotis* omschreven. De beschrijving van de Grijsborst witoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Salvadori witoorparkiet.

PFRIMER'S WITTOORPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura leucotis pfrimeri*.
Duits: Pfrimers Sittich.
Engels: Pfrimer's conure.

Formaat: Lengte 23 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd roodbruin. Wangen en oorstreek roodbruin. Schedel grijsblauw. Rond het oog een smalle onbevederde ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek bruin, met aan de zijkanten van de nek vaal grijs. Vanuit de nek richting kropstreek en borst, bruin met witgele omzoming. Flanken en buik groen. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel groen. Rug groen, geleidelijk overgaand in een roodbruine stuit.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen, naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin, iris geelbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. l. pfrimeri* wordt als ondersoort van de *P. l. leucotis* omschreven. De beschrijving van de Pfrimer's witoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. (Op moment van schrijven standaard, niet in Nederland aanwezig.) Overige benamingen: Geen.

EMMA'S WITTOORPARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura leucotis emma.
Duits: Emma's Weißohrsittich.
Engels: Emma's conure.

Formaat: Lengte 23 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel blauw, overgaand in kastanjebruin richting achterkop. Wangen kastanjebruin, aan de benedenrand iets blauw. Oorstreek bruinwit. Rond het oog een zeer smalle onbevederde ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek overwegend blauw, iets bruin. Vanuit de nek, richting kropstreek en brost, bruin met blauw en een brede witgele omzoming. Flanken en buik groen. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel groen. Rug groen, geleidelijk overgaand in een roodbruine stuit.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin, iris roodbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De P. l. emma wordt als ondersoort van de P. l. leucotis omschreven. De beschrijving van de Emma's witoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen:

MONAGAS WITTOORPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura leucotis auricularis*.
Duits: Monagas Weißohrsittich.
Engels: Monagas white-eared conure.

Formaat: Lengte 23 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel blauw, overgaand in kastanjebruin richting nek. Wangen kastanjebruin, aan de benedenrand iets blauw. Oostreek helder wit. Rond het oog een zeer smalle onbevederde ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, overgaand in een groenblauwe vleugelzoom. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek groen met veel blauw. Vanuit de nek, richting kropstreek en borst, bruin en blauw, met brede witgele omzoming. Flanken diep groen. Buik groen. Midden-onderbuik roodbruin. Mantel diep groen. Rug groen, geleidelijk overgaand in een roodbruine stuit.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen naar het einde roodbruin. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin, iris geelbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. l. auricularis* wordt als ondersoort van de *P. l. leucotis* omschreven.
Overige benamingen: Geen.

GESCHILDERDE PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta picta*.
Duits: Blaustirn-Rotschwanzsittich.
Engels: Painted conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA PICTA:

Van de geschilderde parkiet (*P. p. picta*) zijn de volgende ondersoorten bekend.

<i>P. picta amazonum</i>	Santarem parkiet.
<i>P. picta microtera</i>	Kleine blauwvleugel roodstaartparkiet.
<i>P. picta lucianii</i>	Prins Lucien's parkiet.
<i>P. picta roseifrons</i>	Roodkop parkiet.
<i>P. picta subandina</i>	Jaraquiel parkiet.
<i>P. picta caerauleiceps</i>	Magdalena parkiet.
<i>p. picta pantchenkoi</i>	Patchenkoi parkiet.
<i>P. picta eisenmanni</i>	Azuero parkiet.

GESCHILDERDE PARKIET.

Formaat: Lengte 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd blauw. Schedel blauw/bruin. Wangen roodbruin, aan de benedenrand iets blauw. Oorstreek grijswit tot bruingeel. Rond het oog een smalle onbevederde bruingrijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht helder rood, vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst en zijanten nek donkerbruin, met een grijs tot bruingele V-vormige omzoming, vaag doorspekt met rozerood. Op de borst en in de nek plaatselijk blauw. Flanken en rug groen. Buik groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen, overgaand in een bruinrode onderrug. Stuit bruinrood, aan de randen groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren vanuit de basis bruin/groen, overgaand in bruin. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. p. picta* wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Geschilderde parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Blue-winged conure. Rotzügelsittich, Blauwvleugel roodstaart parkiet.

SANTAREM PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta amazonum*
Duits: Santarem Sittich.
Engels: Santarem conure.

Formaat: Lengte 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel bruin. Wangen bruin. Oorstreek grijswit tot bruingeel. Rond het oog een onbevederde grijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en zijkanten nek donkerbruin, met een grijs tot bruingele V-vormige omzoming. Borst olijfgroen, met een grijs tot bruingele omzoming. Op de borst plaatselijk iets blauw. Flanken en rug groen. Buik groengeel. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen, overgaand in een bruinrode rug. Stuit bruinrood, aan de randen groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren, vanuit de basis groen/bruin, overgaand in bruin. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. p. amazonum* wordt als ondersoort omschreven van de *P.p. picta*. Overige benamingen: Geen.

KLEINE BLAUWVLEUGEL ROODSTAART PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta microtera*.
Duits: Kleiner blaustirn Rotschwanzsittich.

Formaat: Lengte 20 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd blauw (vrij smalle zone). Schedel bruin. Wangen roodbruin, aan de benedenrand blauwgroen. Oorstreek grijswit tot bruingeel. Rond het oog een onbevederde grijswitte ring.

Vleugels;

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en borst vaal bruingrijs, met een smalle grijs tot bruingele omzoming. Op de borst plaatselijk iets groen/blauw. Flanken en rug groen. Buik groen. Midden-onderbuik iets bruinrood. Mantel en bovenrug groen, met iets bruinrood op de onderrug. Stuit overwegend groen, aan de benedenrand groenblauw.

Staat:

Bovenstaartdekveren, vanuit de basis groen, vrij snel overgaand in bruin. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.p. microtera* wordt als ondersoort omschreven van de *P. p. picta*. De beschrijving van de kleine blauwvleugel roodstaartparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Niet in Nederland aanwezig. Overige benamingen: Geen.

PRINS LUCIEN'S PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta lucianii*.
Duits: Prinz Lucians Rotschwanzsittich
Engels: Prince Lucien's conure.

PRINS LUCIEN'S PARKIET:

Formaat: Lengte 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd rood schedel bruin, met soms iets blauw en/of enkele rode veertjes. Wangen roodbruin, aan de benedenrand iets blauw. Oorstreek grijswit tot bruingeel, soms iets rood. Rond het oog een onbevederde grijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met en enkel rood veertje. Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst en zijkanten nek donker bruingroen, met een grijze tot bruingele V-vormige omzoming. Op borst en nek plaatselijk blauw. Flanken en rug groen. Buik overwegend groen. Midden-onderbuik iets bruinrood. Mantel groen, overgaand in een bruinrode rug. Stuit bruinrood, aan de randen groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren, vanuit de basis bruingroen, overgaand in bruinrood. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.p.lucianii* wordt als ondersoort omschreven van de *P. p. picta*. Overige benamingen: Bonaparte's conure.

ROODKOP PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta roseifrons*.
Duits: Rotscheitelsittich
Engels: Rose-headed conure.

Formaat: Lengte 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel oranjerood, soms rood. Achterhoofd en nek donkerbruingrijs. Wangen rood tot roodbruin. Oorstreek grijswit tot bruingeel, soms iets rood. Rond het oog een onbevederde grijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht rood, vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst en zijkanten nek bruin/groen, met een grijsbruine tot geelrode V-vormige omzoming. Flanken groen. Buik overwegend groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, plaatselijk groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren aan de basis iets groen, vrij snel overgaand in bruinrood. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. p. roseifrons* wordt als ondersoort van de *P.p. picta* omschreven. De beschrijving van de Roodkopparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

JARAQUIEL PARKIET

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta subandina*.
Duits: Jaraquiel sittich.
Engels: Jaraquiel conure.

Formaat: Lengte 20 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd roodachtig bruin. Schedel bruin. Wangen groen. Oorstreek geelbruin. Rond het oog een onbevederde grijze ring. Teugel rood.

Vleugels:

Vleugeldekkveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst en zijkanten nek vaal bruin/groen, met een grijze tot bruingele omzoming. Op de borst en in de nek plaatselijk iets blauw. Flanken *groen*. Buik overwegend groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, aan de randen iets groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren vanuit de basis bruin/groen, vrij snel overgaand in bruinrood. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Geelbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.p. subandina* wordt als ondersoort van de *P. p. picta* omschreven. Overige benamingen: Geen.

MAGDALENA PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta caeruleiceps*
Duits: Magdalena Sittich.
Engels: Magdalena conure.

MAGDALENA PARKIET:

Formaat: Lengte 20 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel blauw, met direct boven de snavel, een smal diep rood bandje. Wangen rood, tot roodbruin in de lagere gedeeltes. Oorstreek grijswit. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst en zijkanten nek bruin, met een grijze tot bruingele omzoming. Overgangsgebied van nek naar schedel bruin. Nek blauw. Flanken roodbruin. Buik overwegend groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, naar de randen groenblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren aan de basis groen, vrij snel overgaand in bruinrood. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.p.caeruleiceps* wordt als ondersoort van de *P.p. picta* omschreven. Overige benamingen: Geen.

PANTCHENKO PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta pantchenkoi*.
Duits: Pantchenko Blaustirn Rotschwanzsittich.
Engels: Pantcheko conure.

Formaat: Lengte 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd blauw, direct boven de snavel een rood bandje, dat overgaat in de rode teugel. Het rood loopt als een smal streepje onder het oog. Oorvlek is bruingeel. De wangen bleekblauwgroen, nek bruin overgaand in een blauwe ondernek.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom groen, met enkele rode veertjes. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst en zijkanten nek bruin, met een grijze tot bruingele omzoming. Overgangsgebied van nek naar schedel bruin. Nek blauw. Flanken roodbruin. Buik overwegend groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen. Rug bruinrood. Stuit overwegend bruinrood, naar de randen groenblauw.

Staart:

Bovenstaartdekveren aan de basis groen, vrij snel overgaand in bruinrood. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.p. pantchenkoi* wordt als ondersoort van de *P.p.picta* omschreven. Overige benamingen: Geen.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura picta eisenmanni*.
Duits: Azuero Sittich.
Engels: Azuero conure.

Formaat: Lengte 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd blauw. Schedel blauw/bruin met op het voorhoofd, direct boven de snavel, een rood bandje. Wangen roodbruin, aan de benedenrand iets blauw. Oor en benedenzijde van de oorstreek rood. Oorvlek vuil wit. Rond het oog een smalle onbevederde bruingrijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met plaatselijk enkele rode veertjes. Vleugelzoom groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst en zijkanten nek donkerbruin, met een grijs tot bruingele omzoming, welke op de borst matig en minder sprekend is. Op de borst en in de nek plaatselijk blauw. Flanken en rug groen. Buik groen. Midden-onderbuik bruinrood. Mantel groen, overgaand in een bruinrode rug. Stuit bruinrood, aan de randen groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren vanuit de basis bruin/groen, overgaand in bruin. Onderstaart bruinrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart tot grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.p. eisenmanni* wordt als ondersoort van de *P.p.picta* omschreven. Deze soort heeft geen V-vormige omzoming van de keelveren zoals alle andere pictasoorten, maar een ronde omzoming. Overige benamingen: Geen.

SANTA MARTA PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura viridicata*.
Duits: Santa Marta Sittich
Engels: Santa Marta conure.

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel groen, met direct boven de snavel, een smal rood bandje. Wangen groen. Oorstreek paarsbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groenblauw. Vleugelbocht en vleugelzoom geelrood, overgaand in groen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel geel, plaatselijk iets oranje-rood.

Lichaam:

Hals, nek en borst groen, gevlekt met rood en paarsbruin. Bovenbuik oranje-rood. Onderbuik groen. Mantel, flanken, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen. Onderstaart overwegend roodbruin, plaatselijk iets groen.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. viridicata* wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Geen.

DEMARARA PARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura egregia egregia.
Duits: Feuerbugsittich.
Engels: Fiery-shouldered conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA EGREGIA:

Van de demararaparkiet (P. e. egregia) is één ondersoort bekend.
P. egregia obscura Gran-Sabana parkiet.

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel overwegend grijs met groen, soms bruin. Wangen groen. Oorstreek groen, plaatselijk roodbruin. Rondom het oog een onbevederde witte oog- ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel oranjerood.

Lichaam:

Hals donker groenbruin, met een gedeeltelijk geelwitte tot oranje omzoming. Nek, borst en flanken groen. Buik groen, iets blauw. Midden-onderbuik iets roodbruin. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis groen. Onderstaart grijsrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig-grijs.

BIJZONDERHEDEN:

De P.e. egregia wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Demarara parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Demarara conure. Demararasittich.

GRAN SABANA PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura egregia obscura*.
Duits: Grau Sabana Sittich.
Engels: Grna-Sabana conure.

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel grijs met bruin. groen. Oorstreek groen, plaatselijk iets roodbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren donkergroen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranje. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel oranjerood.

Lichaam:

Hals donkergroen/bruin, met een gedeeltelijke geelwitte tot oranje omzoming. Nek, borst en flanken groen. Buik diep groen. Midden-onderbuik iets bruinrood. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren bruinrood, aan de basis groen. Onderstaart grijsrood.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig grijs.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. e. obscura* wordt als ondersoort omschreven van de *P. e. egregia*. Het verschil is zeer gering en alleen maar te zien indien men beide exemplaren (soort en ondersoort) zou kunnen vergelijken. Overige benamingen: Geen.

ZWARTSTAART PARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura melanura.
Duits: Schwarzschwanzsittich.
Engels: Maroon-tailed conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA MELANURA:

Van de zwartstaartparkiet (P.m.melanura) zijn de volgende ondersoorten bekend:

P. melanura souancei	Souancei's zwartstaartparkiet
P. melanura berlepsch	Berlepschi's zwartstaartparkiet
P. melanura pacifica	Pacific zwartstaartparkiet
P. melanura chapmani	Chapman's zwartstaartparkiet.

ZWARTSTAART PARKIET.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel donkergrijs overgaand in groen. Wangen en oorstreek groen. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood, plaatselijk iets geel. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek grijs tot bruin/groen, met een grijswitte omzoming. Borst groen met een grijze omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met gedeeltelijk grijze omzoming. Onderbuik groen. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren donkerroodbruin, aan de basis groen. Onderstaart grijszwart.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De P. m.melanura wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Black-tailed conure, Bruinstaartparkiet, Braunschwanzsittich.

SOUANCEI'S ZWARTSTAARTPARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura souancei.
Duits: Souancei's Schwarzschwanzsittich.
Engels: Souance's conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel donkergrijs overgaand in groen. Wangen en oorstreek groen. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste vleugelpennen groen, heel weinig blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek grijs tot bruin/groen, met een grijswitte omzoming. Borst bruin/groen met een grijze tot witte omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met een gedeeltelijk grijze omzoming. Onderbuik groen, gedeeltelijk bruinrood. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren gedeeltelijk donkerroodbruin, aan de basis bruingroen. Onderstaart grijszwart.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig-grijs.

BIJZONDERHEDEN:

De P.m.souancei wordt als ondersoort omschreven van de P.m.melanura. De beschrijving van de Souancei's zwartstaart parkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

BERLEPSCHI'S ZWARTSTAART PARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura melanura berlepschi
Duits: Graf Berlepsch Sittich
Engels: Berlepsch's conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel donkergrijs. Wangen en oorstreek groen tot olijfgroen. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek tot bruingroen, met een bruingele tot witte omzoming. Borst groen/bruin met en bruingele tot witte omzoming. Flanken groen. Buik groenbruin met een gedeeltelijk grijze omzoming. Onderbuik groen. Middenonderbuik bruinrood. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren donkerroodbruin, aan de basis groen. Onderstaart bruin tot grijszwart.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De P.m.berlepschi wordt als ondersoort omschreven van de P.m. melanura. Overige benamingen: Geen.

PACIFIC ZWARTSTAART PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura melanura pacifica*.
Duits: West-Anden Schwarzschwanzsittich.
Engels: Pacific black-tailed conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel grijsgroen. Wangen en oorstreek groen. Rond het oog een smalle onbevederde ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek bruingroen, met een bruingele tot witte omzoming. Borst groenbruin met een bruingele omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met plaatselijk roodbruin. Onderbuik groen. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren rood tot roodbruin, aan de basis groen. Onderstaart grijszwart.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig grijs.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.m.pacifica* wordt als ondersoort omschreven van de *P.m. melanura*. De beschrijving van de Pacific zwartstaartparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Geen.

CHAPMAN'S ZWARTSTAART PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura melanura chapmani*.
Duits: Chapman Sittich.
Engels: Chapman's conure.

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en Schedel donkergrijs aan de veerrandjes iets groen. Wangen en oorstreek groen, iets roodbruin doorschijnend. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom oranjerood. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek grijs tot bruingroen, met een grijswitte omzoming. Borst bruingroen met een grijswitte omzoming. Flanken groen. Buik groen/bruin, met gedeeltelijk grijze omzoming. Onderbuik groen. Middenonderbuik gedeeltelijk bruinrood. Mantel bleek groen. Rug en stuit groen. Totale lichaamskleur meer olijfgroen.

Staat:

Bovenstaartdekveren voornamelijk roodbruin, aan de basis groen. Onderstaart grijszwart.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijszwart.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.m. chapmani* wordt als ondersoort omschreven van de *P.m. melanura*. Overige benamingen: Geen.

STEENPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura rupicola rupicola*.
Duits: Steinsittich.
Engels: Black-capped conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA RUPICOLA:

Van de steenparkiet (*P. rupicola rupicola*) is één ondersoort bekend:
P. rupicola sandiae Sandia steenparkiet.

STEENPARKIET:

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd donkerbruin/zwart. Schedel grijs tot donkerbruin. Wangen en oorstreek groen, aan de randen iets bruin. Rond het oog een onbevederde grijswitte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, nek en achternek donkerbruin/zwart, met een brede bruingele tot witte V-vormige omzoming. Borst donkerbruin, met een bruingele tot witte omzoming. Flanken groen. Buik groenbruin, met enkele rode veertjes. Mantel groen. Rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen. Onderstaart grijszwart.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijs.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.r. rupicola* wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Steenparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Zwartkapparkiet, Rock conure, Schwarzkappensittich.

SANDIA STEENPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura rupicola sandiae*.
Duits: Sandia Steinsittich
Engels: Sandia conure.

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd donkerbruin/zwart. Schedel donkerbruin. Wangen en oorstreek olijfgroen, aan de randen diep groen. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht en vleugelzoom rood. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals, borst, nek en zijkanten nek donkerbruin tot zwart met een smalle bruingele tot witte V-vormige omzoming. Flanken groen. Buik, groengeel, plaatselijk iets bruin met mogelijk enkele rode veertjes. Mantel groen. Rug en stuit groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren groen. Onderstaart grijszwart tot grijsbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijs.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.r.sandiae* wordt als ondersoort van de *P.r.rupicola* omschreven. De beschrijving van de Sandia steenparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. De verschillen tussen soort en ondersoort zijn zo gering, dat men ze eigenlijk met elkaar zou moeten vergelijken. Overige benamingen: Geen.

WITBORST PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura albipectus*.
Duits: Weißhals-Weißbrustsittich
Engels: White-necked conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel diep grijsbruin, iets gezoomd richting nek. Op het voorhoofd, direct boven de snavel, een smal roodbruin bandje. Wangen groenbruin, geel omzoomd. Oorstreek oranjegeel. Rondom het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met enkele rode veertjes. Vleugelzoom rood. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals wit, in een kraag, die de nek omcirkelt. Aan de voorzijde geleidelijk overgaand in een gele borst en bovenbuik. Flanken groen. Onderbuik groen, met een roodbruine waas. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren groen, overgaand in roodbruin. Onderstaart groen tot roodbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Donkergrijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijsbruin.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. albipectus* wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: White-necked conure, Witnekparkiet, Weißhalssittich.

PRACHTVLEUGEL PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura calliptera*.
Duits: Prachtflügelsittich.
Engels: Brown-breasted conure.

Formaat: 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel vaal bruin, plaatselijk groenblauw. Wangen groen. Oorstreek roodbruin. Rond het oog een onbevederde grijze ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen, met geeloranje veertjes. Vleugelzoom geel. Grote buitenste vleugelpennen blauwgroen. Ondervleugel groen, met soms een geel veertje.

Lichaam:

Hals bleek bruin, geleidelijk overgaand in een groene nek. Borst bruin tot roodbruin met groene waas. Buik groen, plaatselijk roodbruin. Flanken, mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren bruinrood. Onderstaart donker bruinrood.

Ogen: Geel, iets bruin.

Poten: Bruin, nagels iets grijs.

Snavel: Hoornkleurig.

BIJZONDERHEDEN:

De *P.calliptera* wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Flame-winged conure, Beautiful conure. Bruinborstparkiet, Braunbrustsittich.

ROODOORPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura hoematotis hoematotis*.

Duits: Rotorhsittich.
Engels: Red-eared conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA HOEMATOTIS:

Van de roodoorparkiet (*P. h. hoematotis*) is één ondersoort bekend.
P. hoematotis immarginata Cubiro roodoorparkiet.

ROODOORPARKIET:

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd grijs tot bruingroen, plaatselijk iets blauw. Schedel bruin, overgaand in olijfgroen, met een gele zoom, richting nek. Wangen groen. Oorstreek roodbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren en vleugelbocht groen. Vleugelzoom groenblauw. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek bruin tot bruinachtig grijs. Borst, nek en bovenbuik olijfgroen tot geel, met een vaal grijsgele omzoming. Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel, rug en stuit groen, iets blauw-achtig.

Staat:

Bovenstaartdekveren roodbruin, aan het eind iets olijfgroen. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel; Grijshoornkleurig.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. h. hoematotis* wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Rodoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Blood-eared conure, blutohrsittich.

CUBIRO ROODOORPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura hoematotis immarginata*.
Duits: Cubiro Blutohr-Rotschwanzsittich.

Engels: Cubiro red-eared conure.

Formaat: Lengte 25 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd grijsbruin, plaatselijk iets blauw. Schedel bruingroen, overgaand in olijfgroen richting nek. Wangen groen. Oorstreek roodbruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels;

Vleugeldekveren en vleugelbocht groen. Vleugelzoom groenblauw. Grote buitenste vleugelpennen groenblauw. Ondervleugel groen.

Lichaam:

Hals en nek groen. Borst, achternek en bovenbuik olijfgroen, met iets gele omzoming. Onderbuik bruinrood. Flanken, mantel en rug groen. Stuit blauwgroen.

Staat:

Bovenstaartdekveren roodbruin, aan het eind iets olijfgroen. Onderstaart roodbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Grijshoornkleurig

BIJZONDERHEDEN:

De *P. h. immarginata* wordt als ondersoort omschreven van de *P. h. hoematotis*. De beschrijving van de Cubiro roodoorparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Niet in Nederland aanwezig ten tijde van schrijven standaard. Overige benamingen: Geen.

ROODKOP ROODSTAARTPARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura rhodoccephala*.
Duits: Rotstirnsittich.
Engels: Rose-crowned conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en schedel helder rood, geleidelijk overgaand in een groene nek. In de overgangszone plaatselijk vaal bruin. Wangen groen. Oorstreek kastanjebruin. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren groen. Vleugelbocht groen met enkele oranje veertjes. Vleugelzoom oranjegeel, halverwege overgaand in geelwit. Grote buitenste vleugelpennen violetblauw. Ondervleugel groen/grijsblauw.

Lichaam:

Hals en bost groen/bruin, met een smalle bruine omzoming. Flanken en onderbuik groen. Midden-onderbuik iets bruinrood. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren roodbruin. Onderstaart vaal roodbruin.

Ogen: Bruin.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. rhodoccephala* wordt als nominaatvorm omschreven. De beschrijving van de Roodkop roodstaartparkiet is mede vastgesteld aan de hand van bij de kweker bekeken exemplaren. Overige benamingen: Rose-headed conure, Rotkopfsittich.

HOFFMANN'S PARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura hoffmanni hoffmanni.
Duits: Gelbgrünersittich.
Engels: Hoffmann's conure.

ONDERSOORTEN VAN DE PYRRHURA HOFFMANNI:

Van de Hoffmann's parkiet (P.h. hoffmanni) is één ondersoort bekend.
P. hoffmanni gaudens Chiriqui parkiet.

HOFFMANN'S PARKIET:

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd groengeel. Schedel groen, gedeeltelijk streepachtig getekend en doorspekt met gele veertjes. Wangen groen, doorspekt met gezoomd geel. Oorstreek diep rood. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels;

Vleugeldekveren overwegend groen. Primaire en secundaire vleugelveren gedeeltelijk geel, richting uiteinden groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom geelgroen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen tot vaal olijfgeel.

Lichaam:

Hals, borst, nek en buik diep groen, doorspekt met vaal oranje/gele veertjes. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren rood tot olijfgroen. Onderstaart bruinrood, aan het eind olijfgroen.

Ogen: Bruin tot grijswit.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig.

BIJZONDERHEDEN:

De P. h. hoffmanni wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Sulphur-winged conure, Hoffmannsittich.

CHIRIQUI PARKIET.

Wetenschappelijke naam: *Pyrrhura hoffmanni gaudens*.
Duits: Chiriquisittich.
Engels: Chiriqui conure.

Formaat: Lengte 24 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd groengeel. Schedel groen, gedeeltelijk streepachtig getekend en doorspekt met gele en oranjegele veertjes. Wangen groen, doorspekt met geel. Oorstreek diep rood. Rond het oog een onbevederde witte ring.

Vleugels:

Vleugeldekveren overwegend groen. Primaire en secundaire vleugelveren gedeeltelijk geel, richting uiteinden groen. Vleugelbocht groen. Vleugelzoom geelgroen. Grote buitenste vleugelpennen blauw. Ondervleugel groen tot vaal olijfgroen.

Lichaam:

Hals, borst en nek diep groen, doorspekt met vaal oranje/gele veertjes. Buik donkergroen, met bijzonder weinig geel. Mantel, rug en stuit groen.

Staat:

Bovenstaartdekveren rood tot olijfgroen. Onderstaart bruinrood, aan het eind olijfgroen.

Ogen: Bruin tot grijswit.

Poten: Grijs, nagels grijszwart.

Snavel: Hoornkleurig.

BIJZONDERHEDEN:

De *P. h. gaudens* wordt als ondersoort omschreven van de soort *P. h. hoffmanni*. Overige benamingen: Geen.

EL ORO PARKIET.

Wetenschappelijke naam: Pyrrhura orcesi.
Duits: El Orosittich.
Engels: El oro conure.
Formaat: Lengte 22 cm.

Kop en masker:

Voorhoofd en voorste gedeelte van de kruin rood. Schedel groen, met plaatselijk een rode of grijze veer. Wangen en oorstreek groen. Rond het oog een onbevederde rose/witte oogring.

Vleugels:

Vleugeldekveren, vleugelbocht en vleugelzoom groen. Buitenste primaire- en mediale vleugelpennen helder rood. Primaire slagpennen en de buitenste secundaire vleugelpennen blauw, met een smalle groene buitenvlag. Ondervleugel groen, neigend naar olijf

Lichaam:

Hals, nek, zijkanten nek groen met een gedeeltelijk lichtgrijze omzoming. Borst hoofdzakelijk groen, met soms enkele rode veren. Buik groen met plaatselijk rood. Onderbuik groen. Flanken, mantel en rug groen. Stuit helder groen.

Staart:

Bovenstaartdekveren groen, bruinrood aan het einde. Onderstaart grijsgroen, donker bruinrood aan het einde.

Ogen: Donkerbruin.

Poten: Zwart, nagels zwart.

Snavel: Hoornkleurig.

BIJZONDERHEDEN:

De P. orcesi wordt als nominaatvorm omschreven. Overige benamingen: Geen.