

Standaard

Japanse Kwartels (Coturnix c. Japonica)

Uitgegeven door:
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Copyright by NBvV.
Alle rechten voorbehouden

Uitgave: zomer 1993

OPMERKING VOORAF:

**Om het document snel te kunnen downloaden zijn figuren en opmaakruimten verwijderd.
De bladzijdenummers van de inhoudsopgave zijn daardoor niet meer juist.**

VOORWOORD.

Gezien de ontwikkelingen van de kweek met de Japanse kwartels, die vooral de laatste jaren meer en meer onderhevig is geworden aan het domesticatieproces, achtte de T.C. van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers het wenselijk, dat er een standaard voor deze groep van kwartels werd samengesteld.

Bij deze standaard is een "kopstudie" van de kop van de Japanse kwartel gevoegd, welke het mogelijk maakt een begrijpelijke, eensluidende omschrijving te geven van de tekening van kop en masker, voor zowel de wildvorm als alle mutanten.

Verder is er onderscheid gemaakt tussen een kwartel met een intensieve bevedering en een kwartel met een zogenaamde schimmelbevedering. Ook dit treedt op bij zowel de wildvorm als bij de diverse mutanten. Beide vormen dienen overigens in aanmerking te kunnen komen voor een hoge puntenwaardering.

In deze standaard zijn naast de wildvorm, de mutanten van de Japanse kwartels verdeeld in 3 groepen, t.w. "normale mutanten", (bruin; roodbruin; pastel en isabel); "mutanten zonder keeltekening", (zonder keel- en streep-tekening en zonder keel- maar met streep-tekening); "overige mutanten", (bont, wit en albino).

De T.C. is dank verschuldigd aan een aantal kwekers van Japanse kwartels. Hun ervaringen hebben bijgedragen aan de tot standkoming van deze standaard.

Deze standaard zal periodiek herzien worden. Uitbreidingen en herzieningen kunnen eenvoudig worden verwerkt, omdat het een losbladig systeem is.

De T.C. spreekt de hoop uit, dat deze standaard stimulerend mag werken op de verdere ontwikkelingen in de kweek van de Japanse kwartels.

Bergen op Zoom,

zomer 1993.

T.C. Tropische vogels etc.

INHOUDSOPGAVE:

Pag.

Voorwoord.....	1
Inhoudsopgave.....	2
Algemeen.....	3
Vederstructuur.....	3
Mutaties.....	3
Fysieke eigenschappen.....	4
Kopstudie.....	5
Algemene keurtechnische aanwijzingen.....	5
Kleurstandaard	
- Wildvorm intensief.....	7
- Wildvorm schimmel.....	9
- Bruin intensief.....	10
- Bruin schimmel.....	11
- Roodbruin intensief.....	11
- Roodbruin schimmel.....	13
- Isabel intensief.....	14
- Isabel schimmel.....	15
- Pastel wildvorm intensief.....	15
- Pastel wildvorm schimmel.....	16
- Pastel bruin intensief.....	17
- Pastel bruin schimmel.....	19
- Pastel roodbruin intensief.....	20
- Pastel roodbruin schimmel.....	21
- Zonder keel- en streep-tekening wildvorm intensief.....	21
- Zonder keel- en streep-tekening wildvorm schimmel.....	22
- Zonder keel- en streep-tekening bruin intensief.....	22
- Zonder keel- en streep-tekening bruin schimmel.....	23
- Zonder keel- en streep-tekening roodbruin intensief.....	23
- Zonder keel- en streep-tekening roodbruin schimmel.....	24
- Zonder keel- en streep-tekening past.wildv.intensief.....	24
- Zonder keel- en streep-tekening past.wildv.schimmel.....	25
- Zonder keel- en streep-tekening past.bruin intensief.....	25
- Zonder keel- en streep-tekening past.bruin schimmel.....	25
- Zonder keel- en streep-tekening past.ro.br intensief.....	26
- Zonder keel- en streep-tekening past.ro.br.schimmel.....	26
- Zonder keel- met streep-tekening wildvorm intensief.....	27
- Zonder keel- met streep-tekening wildvorm schimmel.....	27
- Zonder keel- met streep-tekening bruin intensief.....	28

- Zonder keel- met streep-tekening bruin schimmel	28
- Zonder keel- met streep-tekening roodbruin intensief	29
- Zonder keel- met streep-tekening roodbruin schimmel	29
- Zonder keel- met streep-tekening past.wildv.intensief	30
- Zonder keel- met streep-tekening past.wildv.schimmel	30
- Zonder keel- met streep-tekening past.bruin intensief	31
- Zonder keel- met streep-tekening past.bruin schimmel	32
- Zonder keel- met streep-tekening past.ro.br.intensief	32
- Zonder keel- met streep-tekening past.ro.br.schimmel	33
- Albino	33
- Wit	33
- Bont	34

ALGEMEEN.

DE JAPANESE KWARTEL. (Coturnix c. japonica).

Deze uit Z.O. Azië stammende kwartelsoort is samen met de Chinese dwergkwartel de meest voorkomende kwartelsoort in onze volieres en is reeds volledig gedomesticeerd.

Soorten die tot hetzelfde geslacht Coturnix behoren zijn:

De Europese kwartel (Coturnix, coturnix, coturnix)

Deze erg veel op de Japanse kwartel gelijkende soort is beduidend kleiner ca. 15 cm en lijkt qua formaat meer op de **Coromandel of regenkwartel** (Coturnix, coromandelica) en de **Harlekijnkwartel** (Coturnix d. delegorguei).

De haan bezit in de paartijd een zwarte keel. De keel van de hen is bij deze soort bleker dan bij de Japanse kwartel. Ook de roep is anders, deze is drieledig terwijl deze bij Japanse kwartel tweeledig is.

De Afrikaanse kwartel (Coturnix, coturnix, africana).

De Afrikaanse kwartel is in zijn geheel licht beige/bruin van kleur met een tot in nek uitvloeiende bruine koptekening. Deze soort is in het verleden veelvuldig gebastaardeerd met de Japanse kwartel. Aangezien deze bastaarden vruchtbaar bleken te zijn, is hiermee doorgefokt om nieuwe kleurslagen bij de Japanse kwartel te verkrijgen.

De Madeira kwartel (Coturnix, coturnix, confisa).

Deze wijkt qua tekening en bevedering iets af van de Japanse kwartel. Deze lijkt qua kleur veel op de Japanse kwartel isabel, maar mist de streep-tekening. De kopkleur is geheel bruin met een minimale tekening.

Door de massale kweek in vooral de zuidelijke Europese landen, zijn er verschillende mutaties en mutatiecombinaties ontstaan zoals o.a. bruin, roodbruin, pastel, isabel, wit, albino, bont en mutant zonder keel-tekening.

VEDERSTRUCTUUR.

Hoewel er tot nu toe nog geen veder onderzoek bij de Japanse kwartel is gedaan, kan er toch van worden uitgegaan, dat de resultaten van het veder onderzoek bij de andere kwartels ook voor de Japanse kwartel gelden.

De aanwezige kleurstoffen bij de Japanse kwartel zijn:

- zwart eumelanine
- roodbruin phaeomelanine.

Carotenoïde kleurstoffen zijn in de bevedering van de Japanse kwartel niet aanwezig.

Wel is er sprake van schimmel- en intensieve vogels.

DE MUTATIES.

De Bruine mutant:

Deze kleurslag ontstaat door een verzwakte oxydatiegraad van het zwarte eumelanine. In plaats van zwart eumelanine wordt nu zandkleurig bruin eumelanine gevormd en wel op dezelfde plaatsen als waar bij de wildvorm het zwart eumelanine zit.

De vorming van het roodbruine phaeomelanine wordt door deze mutatie niet aangetast.

De Roodbruine mutant:

Deze mutant ontstaat door het wegvallen van het zwarte eumelanine en het volledig aanwezig blijven van het roodbruine phaeomelanine.

Daar er bij de haan nog een vage koptekening is waar te nemen, kan er van worden uitgegaan dat daar nog een lage concentratie eumelanine aanwezig is, of dat net als bij de Japanse meeuw, sprake is van een derde pigment.

Dit laatste zou kunnen worden bewezen door het ontstaan van een grijze mutant en deze te combineren met een roodbruine, of door veder onderzoek.

De Pastel mutant:

Bij deze mutatie is zowel de normaal te vormen hoeveelheid eumelanine als het phaeomelanine gereduceerd tot ongeveer 50 %. Deze factor is met andere mutaties te combineren.

De pasteltint is een volledig opgebleekte kleur die egaal aanwezig dient te zijn.

De Isabel mutant:

Bij de isabelmutatie heeft er een sterke reductie van ongeveer 80% in de vorming van het eumelanine plaats gevonden. Het roodbruine phaeomelanine wordt bij deze mutatie niet aangetast en is volledig aanwezig. De isabel is licht beige/bruin van kleur.

De mutant zonder keeltekening:

Net als bij de Chinese dwergkwartel is ook hier bij de Japanse kwartel de gehele lichaamskleur donkerder geworden t.o.v. de wildvorm. Daar de keeltekening ontbreekt, is er geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen hen en haan. Bij de Chinese dwergkwartel wordt er één variëteit gevraagd, bij de Japanse kwartel zijn dat er twee n.l. met- en zonder streep-tekening.

Zonder keel- en streep-tekening:

Deze variëteit is net als bij de Chinese dwergkwartel voorzien van een zgn schubtekening en mag geen lengtestrepen laten zien.

Zonder keeltekening met streep-tekening:

Dit type moet wel lengte strepen hebben, welke zeer fijn van vorm dienen te zijn moeten bijna aaneensluiten en symmetrisch op een rij liggen.

De bonte mutant:

Door het plaatselijk niet tot oxydatie komen van het melanine ontstaat een bonte mutant. Dit niet tot oxydatie komen van het melanine kan per veer of veerveld voorkomen.

De witte mutant:

Door selectie van de bonte mutant, kan een geheel witte kleurslag ontstaan. In principe is dit de witte zwartoog. De kleur kan in helderheid variëren wat afhankelijk is van de kleur die wordt gemaskeerd.

De albino mutant:

Wanneer er een totale reductie van zowel het eumelanine als van het phaeomelanine plaatsvindt is er sprake van een ino-mutatie.

Aangezien de Japanse kwartel van nature alleen melanine in de bevedering bezit, zal bij het ontstaan van een ino-mutatie een geheel helder witte vogel met rode ogen ontstaan die dan albino wordt genoemd.

STANDAARD FYSIEKE EIGENSCHAPPEN.

Formaat:

De Japanse kwartel meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart ca 18 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

Model:

De romp is eivormig met in het verlengde hiervan een vrij korte staart. De borst is van voor- en opzij gezien tamelijk breed en vol. De rondingen moeten vloeiend verlopen. Op de kop/nek scheiding is een kleine holte die vloeiend moet verlopen. De kop is iets afgeplat met het oog nagenoeg in het centrum. De haan heeft een iets bredere schedel. Om het oog bevindt zich een smalle oogring die minimaal bevederd is.

Houding:

De romp maakt een hoek van 45 tot 60 graden met het horizontaal. De kwartel moet recht op de poten staan en een fiere houding aannemen.

Konditie:

Om voor een hoge puntenwaardering in aanmerking te komen is een goede konditie een eerste vereiste. De Japanse kwartel moet helder uit zijn ogen kijken. Rondom de snavel en neusgaten mogen geen vochtige plekjes zichtbaar zijn. Ditzelfde geldt ook voor de aarsbevedering.

Poten:

Het loopbeen is stevig en vrij van bevedering. De tenen zijn recht en elke teen is voorzien van een korte iets gekromde nagel. Er steken drie tenen naar voren en één korte teen naar achteren. De middelste voorteen is ca 1 cm langer dan de overige twee tenen.

Snavel:

De snavel is ongeveer 7.5 mm lang. De bovensnavel is aan de punt iets gekromd en gepunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

Bevedering:

De bevedering dient geheel compleet te zijn, strak en goed aaneengesloten gedragen te worden. Van de vleugels moeten de toppen nog net zichtbaar zijn. Zowel de vleugelpennen als de staart- en stuitveren mogen geen slijtage vertonen.

KOPSTUDIE JAPANSE KWARTEL.

1. **Kopstreep:** Een streep-tekening midden, boven op schedel. Begint ter hoogte van het oog en loopt in twee vertakkingen in de nek en vervolgens in vier vertakkingen.
2. **Schedel**
3. **Wenkbrauwstreep:** Loopt vanaf de neusdoppen, boven het oog licht gebogen naar de nek. Deze streep is ongeveer 3 mm breed en aan het begin iets smaller.
4. **Oogstreep:** Loopt in het verlengde van de neusdoppen over (door) het oog naar de nek. Deze ... streep is sikkelvormig en in het midden ongeveer 4 mm breed.
5. **Oorstreep:** Een sikkelvormige streep vanaf de oorstreek tot de keel. Deze tekening overlapt gedeeltelijk de oogstreep.
6. **Bovensnavelstreep:** Loopt vanaf de bovensnavelinplant, onder de neusdop en onder het oog, tot de oorstreek. Deze streep is ongeveer 3 mm breed.
7. **Ondersnavelstreep:** Loopt vanaf de ondersnavel, onder de bovensnavelstreep, tot iets achter het oog.
8. **Kinstreep:** Een dun streepje van onder de snavel op de kin.
9. **Kinvlek:** Een vlek op de kin, net onder de snavel, welke loopt vanaf de ondersnavelstreep tot de wangstreep.
10. **Keel**
11. **Wangstreep:** Een sikkelvormige streep vanaf de wang naar de keel.
12. **Keelband:** Het veerveld, tussen wang- en oorstreep.

ALGEMENE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN.

Zoals bij alle soorten vogels het geval is, zijn er ook Japanse kwartels met lange of korte bevedering, de zogenaamde schimmel- en intensieve vormen. De schimmelvorm bij de kwartels is te herkennen aan een sluiervaas over de bevedering.

Een ideale intensieve kwartel mag geen enkele schimmelvorming tonen. Toch moet de eerste jaren bij de beoordeling van de schimmelvorming nog enige soepelheid worden betracht.

Bastaarden van of met kwartels worden door de NBvV niet gevraagd, toch komt het regelmatig voor dat er niet geheel raszuivere kwartels op de TT's te zien zijn. Met name bastaarden met de Afrikaanse kwartel worden vaak als cinnamon ingestuurd. Deze bastaarden zijn echter te herkennen aan de kop-tekening, deze vloeit bij een bastaard uit tot in de nek en is zwart of bruin van kleur. De lichaamskleur van zo'n bastaard komt heel dicht in de buurt van een isabel, maar de vleugelpennen laten veelal nog een zwartbruin tekeningspatroon zien. Ook kruisingen met de inlandse kwartel komen voor, deze zijn moeilijk te herkennen, maar de kop-tekening is dieper zwart en in de broedtijd vloeit dit bij de haan uit, vooral in de kinvlek. Wanneer er kwartels moeten worden gekeurd met duidelijke eigenschappen zoals voornoemd, kunnen deze het beste worden gekeurd als Japanse kwartel die dan moeten worden bestraft in de rubriek kleur en tekening met b.v. de opmerking toont kenmerken van de Afrikaanse kwartel in de nek.

Bij de Japanse kwartels dient men er rekening mee te houden, dat in de broedtijd de kinvlek dieper en egaler van kleur is dan in rusttijd. In rusttijd zien we hier witte lengtestreepjes. Aangezien de TT periode doorgaans in rusttijd valt, mag men dit niet bestraffen. Wel geniet de diepst en egaalst gekleurde kinvlek de voorkeur. Aangezien kwartels loopvogels zijn en de bodem van de TT-kooi veelal met zand is bedekt, is het soms moeilijk om de poten te controleren op reinheid en de aanwezigheid van alle nagels. Dit probleem kan eenvoudig worden opgelost zonder de kwartel te pakken, door de kooi schuin naar voren te houden, zodat het zand tegen het voorfront schuift. De kwartel zal van nature altijd tegen de achterkant van de TT-kooi blijven lopen waardoor de poten dus gemakkelijk kunnen worden beoordeeld. Wanneer de kwartels in lopers zitten, kunnen de poten worden gecontroleerd door een keurbriefje achterin de kooi te leggen, als de kwartel hier dan overheen loopt zijn de poten weer gemakkelijk te beoordelen.

Kwartels dienen net als de duiven als eerste te worden gekeurd, dit om langdurig verblijf in de kooi voor de keuring te voorkomen. Vaak worden ze zonder water ingebracht, waardoor ze op de lange duur bol en dik gaan zitten wanneer ze 's-middags pas zouden worden gekeurd.

WILDVORM intensief (haan).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Donkerbruin, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:

Warm kaneelkleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Licht crèmekleurig, de dijen iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine- en grote slagpennen zwartbruin met een iets grijze waas.

Snavel:
Zwartgrijs iets lichter bij de punt. De neusdoppen zijn donker vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:
Zwartbruine pupil met bruine oogring.

Tekening:
Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	zwartbruin.	Oorstreep:	zwartbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	zwartbruin.
Kinstreep:	zwartbruin.	Kinvlek:	kastanjebruin.
Wangstreep:	zwartbruin.	Keelband:	gebroken wit.

Borsttekening:
Op de warm kaneelkleurige borst bevinden zich lichtcrème lengtestrepen met een iets lichtere dwarstekening, wat een gehamerde indruk geeft.

Flanktekening:
Op de kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.
Op de kastanjebruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en zwartbruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben en een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:
Op het donkerbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner.
Op de donkerbruine veertjes van het rugdek bevindt zich op elk veertje een dwarstekening welke zwartbruin, lichtbruin en lichtcrème van kleur is. Dit geeft een gehamerde indruk.
Op het vleugeldek bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwarstekening aanwezig die zwartbruin en lichtcrème van kleur zijn. Dit geeft een gehamerde indruk.
Op de voorvlag bevindt zich bij de grote slagpennen een kastanjebruine dwarstekening. Bij de kleine slagpennen is deze iets lichter van kleur, maar wel omzoomd door een donkerbruine rand. Ook aan de achtervlag bevindt zich een minimale tekening.

Staarttekening:
Op de donkerbruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een zwartbruine en lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

WILDVORM intensief (hen).

Kleur:
Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Donkerbruin het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:
Licht kaneel/crèmekleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Licht crèmekleurig tot beigebruin.

Vleugelpennen:
Kleine- en grote slagpennen zwartbruin met een iets grijze waas.

Snavel:
Zwartgrijs iets lichter bij de punt. De neusdoppen zijn donker vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels zijn vlees- tot hoornkleurig aan het puntje.

Ogen:
Zwartbruine pupil met bruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	zwartbruin.	Oorstreep:	zwartbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	zwartbruin.
Kinstreep:	bruin.	Kinvlek:	crème.
Wangstreep:	zwartbruin.	Keelband:	crème.

De zwartbruine aflijning zoals bij de haan is nagenoeg verdwenen.

Borsttekening:

Op de licht kaneelkleurige borst bevinden zich lichtcrème lengtestrepen. Hier is een zwartbruine streep- en stipvorming welke zo diep mogelijk tot in de buik moet doorlopen.

Een iets kastanjebruine kleur onder de keel is toegestaan.

Flanktekening:

Op de kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de kastanjebruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en een donker tot zwartbruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het donkerbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner.

Op de donkerbruine veertjes van het rugdek bevindt zich op elk veertje een dwarstekening welke zwartbruin, lichtbruin en lichtcrème van kleur is wat een gehamerde indruk geeft.

Op het vleugeldekk bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwarstekening aanwezig die zwartbruin en lichtcrème van kleur zijn. Dit geeft een gehamerde indruk.

Op de voorvlag bevindt zich bij de grote slagpennen een kastanjebruine dwarstekening. Bij de kleine slagpennen is dit iets lichter van kleur, maar wel omzoomd door een donkerbruine rand. Op de achtervlag bevindt zich een minimale tekening.

Staarttekening:

Op de donkerbruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een zwartbruine en lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

Keurtechnische aanwijzingen.

Een strakke bevedering en een goede conditie is een eerste vereiste. Ook het model moet goed "vol" zijn, te smalle vogels moeten bestraft worden bij model. De borstkleur moet zo diep mogelijk zijn en zo ver mogelijk uitvloeien in de buik.

De gehele lichaamstekening moet scherp en symmetrisch zijn en niet te grof t.o.v. de aangegeven normen. De kintekening moet scherp afgetekend zijn mag geen bontvorming onder de snavel tonen. De onderaan de witte keelband grenzende zwartbruine oorstreep kan iets in kleurdiepte variëren en moet met enige soepelheid worden beoordeeld. De hen is vaak iets groter van formaat dan de haan. Bij de hen moet de kinvlek zo egaal mogelijk aanwezig zijn, zonder witte bandvorming, wat een man kenmerk is. De borstkleur kan bij de hen nogal variëren in kleurdiepte en egaliteit, die met een diepste en egaalste borstkleur verdienen de voorkeur. Een diepe en zo scherpe mogelijke tekening die zo ver mogelijk doorloopt geniet de voorkeur.

Ook een veelvoorkomende fout bij kwartels is een beschadigde kop als gevolg van het veelvuldig opvliegen in de kooi of bij de hen door het kaalplukken door de haan.

WILDVORM schimmel (haan en hen).**Kleur:**

Als bij de Wildvorm intensief, maar met een gelijkmatige grijsachtige schimmelverdeling.

De basiskleur en -tekening is als bij de wildvorm intensief. Per veer moet echter een lichtgrijze veerrand te zien zijn. Deze "schimmelverdeling" moet een regelmatig verloop hebben en mag niet in elkaar overlopen, zodat een sluierwaas over de bevedering vloeit.

Door de kortere kopbevedering is de schimmelverdeling op de kop iets minder duidelijk dan op het dek, maar moet wel waarneembaar zijn.

Keurtechnische aanwijzingen.

Door het schimmeleffect lijkt het, dat de kleur lichter is dan de kleur bij de intensief.

Een veel voorkomende fout bij schimmelkewartels is een te veel aan schimmelvorming. Wanneer het schimmeleffect wordt waargenomen als een grijze waas, moet dit gestraft worden bij kleur.

Wanneer een kwartel in elkaar gedoken zit, zien wij in de nek/rugscheiding bedoelde grijze waas. Door de kwartel te laten lopen, kunnen wij de schimmelverdeling in dit veerveld beoordelen.

Een andere voorkomende fout bij schimmel kwartels is het zwak aanwezig zijn van het schimmeleffect op de borst. Ook dit moet worden gestraft bij kleur.
Door de wat langere bevedering lijkt een schimmelkwartel wat forser dan een intensieve kwartel.

BRUIN intensief (haan).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Bruin het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:
Warm kaneelkleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Licht crèmekleurig tot gebroken wit, de dijen iets donkerder.

Vleugelpennen:
Kleine- en grote slagpennen zandkleurig bruin aan de toppen iets lichter.

Snavel:
Bruingrijs iets lichter bij de punt. De neusdoppen zijn vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:
Zwartbruine pupil met bruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	donkerbruin.	Oorstreep:	donkerbruin
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	donkerbruin.
Kinstreep:	donkerbruin.	Kinvlek:	kastanjebruin.
Wangstreep:	donkerbruin.	Keelband:	gebroken wit.

Borsttekening:
Op de warm kaneelkleurige borst bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, met een iets lichtere dwarstekening wat een gehamerde indruk geeft.

Flanktekening:

Op de kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengte streepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.
Op de kastanjebruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en bruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het donkerbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner.
Op het bruine rugdek bevindt zich op elk veertje een dwarstekening welke donkerbruin/grijs, lichtbruin en lichtcrème van kleur is wat een gehamerde indruk geeft.
Op het vleugeldek bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwarstekening aanwezig die donkerbruin en lichtcrème van kleur is. Dit geeft een gehamerde indruk.
Op de voorvlag bevindt zich bij de grote slagpennen een kastanjebruine dwarstekening. Bij de kleine slag-pennen is deze iets lichter van kleur met tevens een lichtcrème dwarstekening. Ook op de achtervlag bevindt zich een minimale tekening.

Staarttekening:

Op de bruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een donkerbruine en lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

BRUIN intensief (hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Bruin het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:

Licht kaneel/crèmekleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Licht crèmekleurig tot gebroken wit, de dijen iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine- en grote slagpennen warm bruin aan de toppen iets lichter.

Snavel:

Bruin iets lichter bij de punt. De neusdoppen zijn vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:

Zwartbruine pupil met bruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	donkerbruin.	Oorstreep:	donkerbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	donkerbruin.
Kinstreep:	bruin.	Kinvlek:	crème.
Wangstreep:	donkerbruin.	Keelband:	crème.

De bruine aflijning zoals bij de haan is slechts minimaal aanwezig.

Borsttekening:

Op de licht kaneelkleurige borst bevinden zich lichtcrème lengtestrepen. Hier bevindt zich een bruine streep- en stipvorming, welke zo diep mogelijk tot in de buik moet doorlopen. Iets warmer bruin onder de keel is toegestaan.

Flanktekening:

Op de kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de kastanjebruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en bruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het bruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner.

Op het bruine rugdek bevindt zich op elk veertje een dwarstekening welke donkerbruin/grijs, lichtbruin en lichtcrème van kleur is wat een gehamerde indruk geeft.

Op de voorvlag van de pen bevindt zich bij de grote slagpennen een kastanjebruine dwarstekening. Bij de kleine slagpennen is dit iets lichter van kleur, met tevens een lichtcrème dwarstekening. Op de achter vlag van de pen bevindt zich een minimale tekening.

Staarttekening:

Op de bruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een donkerbruine en lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

BRUIN schimmel (haan en hen).

Zie bij de wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Haan:

Veelvoorkomende fouten zijn te licht onder de snavel, te fletse of vlekkerige borstkleur. Keelband niet scherp en of onderbroken.

Hen:

Keeltekening te licht, borsttekening te zwak.

Beiden:

Het rugdek is ook vaak vlekkerig doordat de donker bruine dwarstekening te prominent aanwezig is.

Gestreefd moet worden naar een zo warmbruin mogelijke kwartel. Het verschil in bruin tussen de wildvorm en

het bruin van de bruine mutant, is als het verschil in bruin tussen hagelslag puur en melkhagelslag, waarbij dan de pure hagelslag het bruin van de wildvorm benadert en de melkhagelslag het bruin van de mutant. Verder is deze mutatie gelijk aan de wildvorm.

ROODBRUIN intensief (haan).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Diep roodbruin, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:
Roodbruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Licht crèmekleurig bij de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:
De voorvlag van de pennen is roodbruin, op de achtervlag is deze kleur iets lichter.

Snavel:
Beigebruin, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:
Zwartbruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	roodbruin.	Oorstreep:	roodbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	roodbruin.
Kinstreep:	roodbruin.	Kinvlek:	lichtroodbruin.
Wangstreep:	roodbruin.	Keelband:	gebroken wit.

Borsttekening:
Op de roodbruine borst bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, met een iets lichtere dwarstekening wat een gehamerde indruk geeft.

Flanktekening:
Op de warm roodbruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengte streepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.
Op de warm roodbruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en diep roodbruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:
Op het diep roodbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het diep roodbruine rugdek bevindt zich op elk veertje een dwarstekening welke lichtcrème van kleur is wat een gehamerde indruk geeft.
Op het vleugeldek bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwarstekening aanwezig die lichtcrème van kleur is. Dit geeft een gehamerde indruk.
De dwarstekening is bij de roodbruine mutant minimaal aanwezig.

Staarttekening:
Op de roodbruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

ROODBRUIN intensief (hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Diep roodbruin, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:

Licht roodbruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Licht crèmekleurig, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

De voorvlag van de pen is roodbruin, de achtervlag iets lichter.

Snavel:

Beigebruin, de neusdoppen zijn vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	roodbruin.	Oorstreep:	roodbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	roodbruin.
Kinstreep:	roodbruin.	Kinvlek:	beigebruin.
Wangstreep:	roodbruin.	Keelband:	crème.

De roodbruine aflijning is slechts minimaal aanwezig.

Borsttekening:

Op de licht roodbruine borst bevinden zich lichtcrème lengtestrepen. Hier bevindt zich een roodbruine streep en stipvorming, welke zo diep mogelijk tot in de buik moet doorlopen. Iets dieper roodbruin onder de keel is toegestaan.

Flanktekening:

Op de roodbruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de roodbruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en diep roodbruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het diep roodbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het diep roodbruine rugdek bevindt zich op elk veertje een dwarstekening welke lichtcrème van kleur is, wat een gehamerde indruk geeft.

Op het vleugeldek bevinden zich fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwarstekening aanwezig welke lichtcrème van kleur, wat een gehamerde indruk geeft.

De dwarstekening is minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de roodbruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit.

Ook hier is een lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

ROODBRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen:

Haan:

Een veelvoorkomende fout is een geheel witte kinvlek. De borstkleur dient zo egaal mogelijk te zijn, vaak is deze vlekkerig en te flets van kleur. De keelband dient scherp afgelijnd te zijn.

Hen: Ook hier is een witte kinvlek fout en laat de borst vaak te weinig tekening zien.

Beiden: De lichaamskleur laat vaak donkerdere veervelden zien, vooral de mantel en de kopkleur. Deze moeten zo egaal mogelijk diep roodbruin zijn.

Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een derde pigment zoals dat bij de japanse meeuw voor komt, waar dit verschijnsel mokkabruin invloed wordt genoemd, hier kan sprake zijn van invloed van de bruine Japanse kwartel. Verder gelijk aan de wildvorm.

ISABEL intensief (haan).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Crème, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:
Lichtcrème.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Gebroken wit bij de dijen en de aars lichtcrème.

Vleugelpennen:
De voorvlag van de pennen is lichtgrijs, de achtervlag is iets lichter.

Snavel:
Beige, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:
Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:
Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	crème.	Oorstreep:	crème.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	crème.
Kinstreep:	crème.	Kinvlek:	lichtcrème.
Wangstreep:	crème.	Keelband:	gebroken wit.

Borsttekening:
Op de lichtcrème borst bevinden zich lengtestreepjes die gebroken wit van kleur zijn, met een iets lichtere dwarstekening die minimaal zichtbaar is.

Flanktekening:
Op de oranje-roodbruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengte streepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.
Op de oranje-roodbruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en roodbruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:
Op het crème rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het crème rugdek bevindt zich op elk veertje een dwarstekening welke lichtcrème van kleur is wat een gehamerde indruk geeft.
Op het vleugeldek bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwarstekening aanwezig, die lichtcrème van kleur is. Dit geeft een gehamerde indruk.
De dwarstekening is bij de isabel mutant minimaal aanwezig.

Staarttekening:
Op de crème staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

ISABEL intensief (hen).

Kleur:
Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Crème, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:
Gebroken wit met lichtcrème waas.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Gebroken wit, bij de dijen en de aars lichtcrème.

Vleugelpennen:
De voorvlag van de pen is crème, de achtervlag iets lichter.

Snavel:

Beige, de neusdoppen zijn vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:
Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	crème.	Oorstreep:	crème.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	crème.
Kinstreep:	crème.	Kinvlek:	lichtcrème.
Wangstreep:	crème.	Keelband:	crème.

De crème aflijning is slechts minimaal aanwezig.

Borsttekening:

De borst is gebroken wit met een crème waas, waarop zich nog minimaal zichtbare lichtcrème lengtestreepjes bevinden.

De streep- en stiptekening, is iets scherper aanwezig.

Flanktekening:

Op de oranje-roodbruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de oranje-roodbruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en roodbruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het crème rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het crème rugdek bevindt zich op elk veertje een dwars-tekening welke lichtcrème van kleur is, wat een gehamerde indruk geeft.

Op het vleugeldek bevinden zich fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwars-tekening aanwezig, welke lichtcrème van kleur, wat een gehamerde indruk geeft.

De dwarstekening is minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de crème staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit.

Ook hier is een lichtcrème dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

ISABEL schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel

Keurtechnische aanwijzingen.

De isabel mag geen zwarte of bruine veervelden laten zien in het masker en op het rugdek.

Een veelvoorkomende fout is een te donkere kop- en rugdekkleur.

Egaliteit is een eerste vereiste, de kleurdiepte moet met enige soepelheid worden beoordeeld.

Verder gelijk aan de wildvorm.

PASTEL WILDVORM intensief (haan).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Opgebleekt bruin met een iets grijze waas, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:

Licht kaneelkleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Gebroken wit bij de dijen en de aars lichtcrème.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen lichtbruin met grijze waas.

Snavel:

Lichtgrijs, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:
Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	bruingrijs.	Oorstreep:	bruingrijs.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	bruingrijs.
Kinstreep:	bruingrijs.	Kinvlek:	opgebleekt kastanjebruin.
Wangstreep:	bruingrijs.	Keelband:	gebroken wit.

Borsttekening:

Op de licht kaneelkleurige borst bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, met een nog iets lichtere dwarstekening die minimaal zichtbare gehamerde indruk geeft.

Flanktekening:

Op de licht kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de licht kastanjebruine flank bevindt zich ook een lichtcrème en donkerbruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben, wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het opgebleekte rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het rugdek bevindt zich op elk veertje een lichtcrème en donkerbruine dwarstekening die duidelijk zichtbaar moet zijn, maar niet storend mag werken t.o.v. de rugdekkleur.

Op het vleugeldek bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwarstekening aanwezig, die lichtcrème en bruin van kleur is met grijze waas. Dit geeft een gehamerde indruk.

De dwarstekening is minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de opgebleekte staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een bruinrijze dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

PASTEL WILDVORM intensief (hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Opgebleekt bruin met een iets grijze waas, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:

Crème tot licht crèmekleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Gebroken wit, bij de dijen en de aars lichtcrème .

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen lichtbruin met grijze waas.

Snavel:

lichtgrijs, de neusdoppen zijn vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	bruingrijs.	Oorstreep:	bruingrijs.

Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	bruingrijs.
Kinstreep:	bruingrijs.	Kinvlek:	lichtcrème.
Wangstreep:	bruingrijs.	Keelband:	lichtcrème.

Aan de onderzijde van de keelband bevindt zich een lichtbruine aflijning met grijze waas die slechts minimaal aanwezig is.

Borsttekening:

De crème tot licht crèmekleurig borst, bevinden zich zichtbare lengtestreepjes die gebroken wit en lichtcrème van kleur zijn.

De gehamerde dwarstekening, is bruingrijs en lichtbruin van kleur.

Flanktekening:

Op de licht kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de licht kastanjebruine flank bevindt zich ook een nog zichtbare lichtcrème en bruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het opgebleekte rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het rugdek bevindt zich op elk veertje een lichtcrème en donkerbruine gehamerde dwarstekening, die duidelijk zichtbaar moet zijn en niet storend mag werken t.o.v. de rugdekkleur.

Op het vleugeldek bevinden zich fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een dwars- tekening aanwezig welke lichtcrème en bruin van kleur is met een grijze waas, wat een gehamerde indruk geeft.

De dwarstekening is minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de opgebleekte staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit.

Ook hier is een lichtcrème en bruingrijze dwarstekening met grijze waas, wat een gehamerde indruk geeft.

PASTEL WILDVORM schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Een pastel is een kleurslag, waarbij de oorspronkelijke kleur en de kleur van de tekening tot ca. 50 % is gereduceerd. In de praktijk kan het voorkomen dat er kwartels op de TT zitten die slechts voor 40 % en zelfs zijn er die tot 60% zijn opgebleekt. Zeker de eerst komende jaren zal hierbij de nodige soepelheid moeten worden betracht bij de beoordeling hiervan. Een opmerking hierover maken is zeker gewenst. Wel moet streng worden gelet op kleuregaliteit en de kleur van de tekening, dit mag geen sterk contrastverschil tonen, maar moet een zachte indruk geven. Een veel voorkomende fout is dat de ehamerde dwarstekening te donker is en daardoor een te groot contrast vormt met de lichaamskleur.

Verder gelijk aan de wildvorm.

PASTEL BRUIN intensief (haan).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Lichtbruin, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:

Licht kaneelkleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Gebroken wit, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen licht beigebruin aan de toppen iets lichter.

Snavel:

Beigebruin, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtbruin.
Oogstreep:	lichtbruin.	Oorstreep:	lichtbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	lichtbruin.
Kinstreep:	lichtbruin.	Kinvlek:	licht kastanjebruin.
Wangstreep:	lichtbruin.	Keelband:	gebroken wit.

Borsttekening:

Op de licht kaneelkleurige borst bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, met een lichtcrème gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:

Op de licht kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de licht kastanjebruine flank bevindt zich ook een gehamerde dwarstekening die lichtcrème en lichtbruin van kleur is.

Rug- en vleugeltekening:

Op het lichtbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het lichtbruine rugdek bevindt zich op elk veertje een nog zichtbare lichtcrème en bruine gehamerde dwarstekening die niet storend mag werken t.o.v. de rugdekkleur.

Op het vleugeldek bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een lichtcrème en bruine gehamerde dwarstekening zichtbaar aanwezig.

De dwarstekening is minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de lichtbruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een lichtcrème en bruine gehamerde dwarstekening waarneembaar.

PASTEL BRUIN intensief (hen).**Kleur:**

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Lichtbruin, het vleugeldek is een nuance lichter.

Borst:

Crème tot licht crèmekleurig.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Gebroken wit, bij de dijen en de aars lichtcrème.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen licht beigebruin aan de toppen iets lichter.

Snavel:

Beigebruin, de neusdoppen zijn vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème.	Wenkbrauwstreep:	lichtcrème.
Oogstreep:	lichtbruin.	Oorstreep:	lichtbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtcrème.	Ondersnavelstreep:	lichtbruin.
Kinstreep:	lichtbruin.	Kinvlek:	lichtcrème.
Wangstreep:	lichtbruin.	Keelband:	lichtcrème.

Aan de onderzijde van de keelband bevindt zich een lichtbruine aflijning, die slechts minimaal aanwezig is.

Borsttekening:

De crème tot licht crèmekleurig borst, bevinden zich zichtbare lengtestreepjes, met een lichtbruine gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:

Op de licht kastanjebruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de licht kastanjebruine flank bevindt zich ook een nog zichtbare lichtcrème en bruine dwarstekening die een regelmatig verloop dient te hebben wat een gehamerde indruk geeft.

Rug- en vleugeltekening:

Op het lichtbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen van lichtcrème lengtestreepjes welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het lichtbruine rugdek bevindt zich op elk veertje een nog zichtbare lichtcrème en bruine gehamerde dwarstekening, die duidelijk zichtbaar moet zijn en niet storend mag werken t.o.v. de rugdekkleur.

Op het vleugeldek bevinden zich fijne lengtestreepjes welke lichtcrème van kleur zijn. Ook hier is een licht crème en bruine dwarstekening aanwezig, wat een gehamerde indruk geeft.

De dwarstekening is minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de lichtbruine staartveren bevinden zich lichtcrème lengtestreepjes, die iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is nog een lichtcrème en bruine gehamerde dwarstekening aanwezig.

PASTEL BRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Een pastelbruine is een kleurslag, waarbij de bruine kleur en de kleur van de tekening tot ca. 50 % is gereduceerd. Ook bij deze kleurslag moet in de eerste plaats gelet worden op de kleuregaliteit. De kleurdiepte moet met enige soepelheid worden beoordeeld, maar een opmerking hierover kan wel geplaatst worden. De pastelbruine is te onderscheiden van de pastel wildvorm doordat deze de grijze waas mist in de vleugelpennen. Ook de bruine kleur is anders en iets warmer dan bij de pastel wildvorm. De snavelkleur is bij de pastel wildvorm ook altijd dieper en lichtgrijs van kleur.

Verder gelijk aan de wildvorm en wildvorm pastel.

PASTEL ROODBRUIN intensief (haan).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Licht roodbruin.

Borst:

Licht roodbruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Gebroken wit, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen licht roodbruin.

Snavel:

Hoornkleurig, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep: gebroken wit.
Oogstreep: gebroken wit.
Bovensnavelstreep: gebroken wit.

Wenkbrauwstreep: gebroken wit.
Oorstreep: licht roodbruin.
Ondersnavelstreep: licht roodbruin.

Kinstreep:	gebroken wit.	Kinvlek:	licht roodbruin.
Wangstreep:	licht roodbruin.	Keelband:	wit.

Borsttekening:

Op de licht roodbruine borst bevinden zich lengtestreepjes die gebroken wit van kleur zijn, de gehamerde dwarstekening is gebroken wit en licht roodbruin van kleur.

Flanktekening:

Op de opgebleekte roodbruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lengte streepjes die gebroken wit van kleur zijn, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit. Op de licht roodbruine flank bevindt zich ook een minimale gehamerde dwarstekening die gebroken wit van kleur is en een regelmatig verloop dient te hebben.

Rug- en vleugeltekening:

Op het licht roodbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen lengtestreepjes die gebroken wit van kleur zijn, welke tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het licht roodbruine rugdek bevindt zich op elk veertje een gehamerde dwarstekening, elke gebroken wit van kleur is.

Op het vleugeldek bevinden zich zeer fijne lengtestreepjes welke gebroken wit van kleur zijn. Ook hier is een gehamerde dwarstekening aanwezig, die gebroken wit van kleur is. De lichtcrème dwarstekening minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de licht roodbruine staartveren bevinden zich lengtestreepjes, die gebroken wit van kleur zijn en iets smaller zijn dan op de stuit. Ook hier is een gebroken witte gehamerde dwarstekening nog minimaal waarneembaar.

PASTEL ROODBRUIN intensief (hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Licht roodbruin.

Borst:

Gebroken wit met licht roodbruine waas.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Gebroken wit, bij de dijen en de aars iets donkerder .

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen licht roodbruin.

Snavel:

Hoornkleurig, de neusdoppen zijn vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	gebroken wit.	Wenkbrauwstreep:	gebroken wit.
Oogstreep:	gebroken wit.	Oorstreep:	licht roodbruin.
Bovensnavelstreep:	gebroken wit.	Ondersnavelstreep:	licht roodbruin.
Kinstreep:	gebroken wit.	Kinvlek:	lichtcrème.
Wangstreep:	licht roodbruin.	Keelband:	lichtcrème.

Aan de onderzijde van de keelband bevindt zich een licht roodbruine aflijning die slechts minimaal aanwezig is.

Borsttekening:

De borst is gebroken wit en er bevinden zich nog minimaal zichtbare licht roodbruine lengtestreepjes. De licht roodbruine gehamerde dwarstekening is ook minimaal aanwezig

Flanktekening:

Op de opgebleekte roodbruine flank welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit bevinden zich lengte streepjes die gebroken wit van kleur zijn, die ter hoogte van de borst ca. 1 mm breed zijn en uitlopen tot ca. 2 mm bij de stuit.

Op de licht roodbruine flank bevindt zich ook een minimale gebroken witte gehamerde dwarstekening, die een regelmatig verloop dient te hebben.

Rug- en vleugeltekening:

Op het licht roodbruine rugdek bevinden zich symmetrische banen lengtestreepjes die gebroken wit van kleur zijn en tot op de stuit doorlopen, in de nek is deze bestreping iets fijner. Op het licht roodbruine rugdek bevindt zich op elk veertje een nog zichtbare gehamerde dwarstekening die gebroken wit van kleur is.

Op het vleugeldek bevinden zich fijne lengtestreepjes welke gebroken wit van kleur zijn. Ook hier is een gebroken witte dwarstekening aanwezig.

De dwarstekening is minimaal aanwezig.

Staarttekening:

Op de licht roodbruine staartveren bevinden zich lengtestreepjes, die gebroken wit van kleur en iets smaller zijn dan op de stuit.

Ook hier is een gebroken witte gehamerde dwarstekening minimaal aanwezig.

PASTEL ROODBRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Net als bij de andere pastellen is de egaliteit een eerste vereiste. De kleurdiepte kan nogal variëren 50% reductie moet als ideaal worden gezien. Waar speciaal bij de pastel roodbruin opgelet moet worden is de snavelkleur, hierop is vaak nog een donkere punt waarneembaar. Ook iets donkere veervelden in de nek komen regelmatig voor. Dit wordt veroorzaakt door de inkweek van de Afrikaanse kwartel wat na enkele generaties nog steeds te zien is. De kwartel dient gewoon als Japanse kwartel gekeurd te worden en worden bestraft bij kleur met maximaal 16 punten en bij tekening met maximaal 26 punten, met de opmerking: "toont iets van de kenmerken in de snavel- en nekkleur van de Afrikaanse kwartel." Bij deze kwartels zal de donsbevedering te donker zijn voor een zuivere pastel roodbruin.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING WILDVORM intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Donker kastanjebruin.

Borst:

Donker kastanjebruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Donkerbruin mat van tint, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen zwartbruin met een kastanje bruine gehamerde dwarstekening.

Snavel:

Donkerbruin, de neusdoppen bruin.

Poten:

Donker vleeskleurig, de nagels bruin.

Ogen:

Zwartbruine pupil met donkerbruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	ontbreekt, zw.bruin gehamerd.	Wenkbrauwstreep:	kastanjebruin.
Oogstreep:	zwartbruin.	Oorstreep:	zwartbruin.
Bovensnavelstreep:	kastanjebruin.	Ondersnavelstreep:	zwartbruin.
Kinstreep:	zwartbruin.	Kinvlek:	kastanjebruin.
Wangstreep:	zwartbruin.	Keelband:	kastanjebruin.

Borsttekening:

Op de donker kastanjebruine borst bevindt zich eeng gehamerde zwartbruine dwarstekening.

Flanktekening:

Op de donker kastanjebruine flank bevindt zich een gehamerde dwarstekening welke zwart en kastanjebruin van kleur is en loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:

Op het rugdek bevindt zich vanaf de nek tot op de stuit een regelmatige gehamerde dwarstekening die zwartbruin en kastanjebruin van kleur is.

Staarttekening:

Op de donker kastanjebruine staartveren is het tekeningspatroon gelijk aan dat op de stuit.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING WILDVORM schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Deze mutant is te vergelijken met de mutant van de Chinese dwergkwartel zonder keeltekening. Deze mutatie mag dan ook beslist geen lengtestreepjes laten zien. Veel voorkomende fouten zijn bontvorming onder de snavel en in de vleugelpennen. Ook dient speciaal gelet te worden op de kleur van de nagels, deze moeten éénkleurig bruin zijn. Er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat er van deze mutatie zowel intensieve als schimmel variëteiten voorkomen. Er bestaat geen uiterlijk verschil tussen haan en hen.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING BRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Kastanjebruin, een nuance lichter dan bij de wildvorm zonder keeltekening.

Borst:

Kastanjebruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Bruin, mat van tint bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen chocoladebruin met een kastanjebruine gehamerde dwarstekening.

Snavel:

Bruin, de neusdoppen iets lichter.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels bruin.

Ogen:

Donkerbruine pupil met bruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	bruin gehamerd.	Wenkbrauwstreep:	donker kaneelkleurig.
Oogstreep:	bruin.	Oorstreep:	diepbruin.
Bovensnavelstreep:	bruin.	Ondersnavelstreep:	diepbruin.
Kinstreep:	diepbruin.	Kinvlek:	donker kaneelkleurig.
Wangstreep:	diepbruin.	Keelband:	kaneelkleurig.

Borsttekening:

Op de kastanjebruine borst bevindt zich een gehamerde bruine dwarstekening.

Flanktekening:

Op de kastanjebruine flank bevindt zich een gehamerde dwarstekening welke donkerbruin en licht kastanjebruin van kleur is en loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:

Op het rugdek bevindt zich vanaf de nek tot op de stuit een regelmatige gehamerde dwarstekening die bruin en licht kastanjebruin van kleur is.

Staarttekening:

Op de kastanjebruine staartveren is het tekeningspatroon gelijk aan dat op de stuit.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING BRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

De bruine mutant is ondanks zijn grote gelijkenis met de wildvorm onmiddellijk te herkennen aan de chocolade bruine vleugelpennen. De algehele lichaamskleur is warmer bruin dan de wildvorm.

Ook bij deze kleurslag gelden dezelfde veel voorkomende fouten als bij de wildvorm zonder keeltekening zoals bontvorming onder de snavel, in de vleugelpennen en op de nagels.

Lengtestreepjes mogen beslist niet getoond worden.

Ook hier is de bruine kleur te vergelijken met de kleur van melkhagelslag in vergelijking met pure hagelslag zoals bij de wildvorm.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING ROODBRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Diep roodbruin, een nuance donkerder dan bij de roodbruine met keeltekening.

Borst:

Diep roodbruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Crèmekleurig bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen roodbruin met minimale gehamerde dwarstekening.

Snavel:

Donkerbeige, de neusdoppen iets lichter.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	roodbruin gehamerd.	Wenkbrauwstreep:	licht roodbruin.
Oogstreep:	diep roodbruin.	Oorstreep:	diep roodbruin.
Bovensnavelstreep:	licht roodbruin.	Ondersnavelstreep:	roodbruin.
Kinstreep:	diep roodbruin.	Kinvlek:	roodbruin.
Wangstreep:	diep roodbruin.	Keelband:	roodbruin.

Borsttekening:

Op de roodbruine borst bevindt zich een gehamerde donker roodbruine en crème dwarstekening.

Flanktekening:

Op de donker roodbruine flank bevindt zich een gehamerde dwarstekening welke crème en diep roodbruin van kleur is en loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:

Op het diep roodbruine rugdek bevindt zich vanaf de nek tot op de stuit een regelmatige gehamerde dwarstekening welke diep roodbruin en crème van kleur is.

Staarttekening:

Op de diep roodbruine staartveren is het tekeningspatroon gelijk aan dat op de stuit.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING ROODBRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Deze mutant wordt vaak als bruin betiteld, als gevolg van de bruine tint van de lichaamskleur, wat wordt veroorzaakt door de "donkerfaktor" die zich bij deze mutatie voordoet. Hier dient ook rekening mee te worden gehouden. De

diepst gekleurde variëteit geniet de voorkeur.
Verder gelijk aan de andere mutanten zonder keeltekening.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING PASTEL WILDVORM intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Opgebleekt kastanjebruin met grijze waas.

Borst:

Opgebleekt kastanjebruin met grijze waas.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Opgebleekt bruin bij de dijnen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen opgebleekt bruin met grijze waas met minimaal zichtbare licht kastanjebruine gehamerde dwarstekening.

Snavel:

Bruingrijs, de neusdoppen iets lichter.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels lichtbruin.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	bleek zwartbruin gehamerd met een grijze waas.
Wenkbrauwstreep:	licht kastanjebruin.
Oogstreep:	bleek donkerbruin.
Oorstreep:	bleek donkerbruin.
Bovensnavelstreep:	licht kastanjebruin.
Ondersnavelstreep:	bleek donkerbruin.
Kinstreep:	bleek donkerbruin.
Kinvlek:	licht kastanjebruin met een grijze waas.
Wangstreep:	bleek donkerbruin.
Keelband:	kaneelkleurig met een iets grijze waas.

Op de opgebleekte zwartbruine borst bevindt zich een gehamerde dwarstekening met grijze waas.

Flanktekening:

Op de bruingrijze flank bevindt zich een grijze gehamerde dwarstekening met een iets grijze waas en loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:

Op het opgebleekte zwartbruine rugdek bevindt zich vanaf de nek tot op de stuit een regelmatige gehamerde dwarstekening met een iets grijze waas. Op het vleugeldek is deze iets fijner.

Staarttekening:

Op de opgebleekte zwartbruine staartveren is het tekeningspatroon gelijk aan dat op de stuit.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING PASTEL WILDVORM schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Ook bij deze pastel mutatie is de egaliteit een eerste vereiste. Een veel voorkomende fout is dan ook, dat ze vaak te vlekkelig van kleur zijn. Dit wordt veroorzaakt, doordat de tekening niet zo ver is gereduceerd als de lichaamskleur. Ook de grijze waas mag niet te prominent aanwezig zijn.

Verder als de wildvorm zonder keeltekening. De dwarstekening moet zij het in gereduceerde vorm aanwezig zijn.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING PASTEL BRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Licht kastanjebruin.

Borst:
Licht kastanjebruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Lichtbruin, mat van tint bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:
Kleine en grote slagpennen lichtbruin met een minimaal zichtbare gehamerde dwarstekening.

Snavel:
Bruin, de neusdoppen iets lichter.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:
Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:
Kop en masker:

Kopstreep:	licht bruin gehamerd.	Wenkbrauwstreep:	lichtbruin.
Oogstreep:	lichtbruin.	Oorstreep:	lichtbruin.
Bovensnavelstreep:	lichtbruin.	Ondersnavelstreep:	lichtbruin.
Kinstreep:	lichtbruin.	Kinvlek:	licht kaneelkleurig.
Wangstreep:	lichtbruin.	Keelband:	licht kaneelkleurig.

Borsttekening:
Op de licht kastanjebruine borst bevindt zich een lichtbruine gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:
Op de licht kastanjebruine flank bevindt zich een gehamerde dwarstekening welke iets donkerder is dan de lichaamskleur en loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:
Op het licht kastanjebruine rugdek bevindt zich vanaf de nek tot op de stuit een regelmatige gehamerde dwarstekening welke bruin en lichtcrème van kleur is. Op het vleugeldek is deze iets fijner.

Staarttekening:
Op de staartveren is het tekeningspatroon gelijk aan dat op de stuit.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING PASTEL BRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Deze pastelbruine mutant zonder keeltekening is te onderscheiden van de pastelwildvorm zonder keeltekening, doordat deze de grijze waas mist en warmer bruin van tint is.
Ook de slagpennen zijn bruin van kleur zonder grijze waas.
Egaliteit is een eerste vereiste.
De gehamerde dwarstekening is minimaal aanwezig, maar moet wel zichtbaar zijn.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING PASTEL ROODBRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:
Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Licht roodbruin.

Borst:
Licht roodbruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Crème tot lichtcrème, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:
Kleine en grote slagpennen licht roodbruin

Snavel:
Beige, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:
Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	licht roodbruin gehamerd.
Wenkbrauwstreep:	licht roodbruin (minimaal zichtbaar).
Oogstreep:	licht roodbruin.
Oorstreep:	licht roodbruin.
Bovensnavelstreep:	licht roodbruin (minimaal zichtbaar).
Ondersnavelstreep:	licht roodbruin.
Kinstreep:	licht roodbruin.
Kinvlek:	licht roodbruin (minimaal zichtbaar).
Wangstreep:	licht roodbruin.
Keelband:	licht roodbruin (minimaal zichtbaar).

Borsttekening:
Op de licht roodbruine borst bevindt zich een minimaal aanwezige lichtcrème gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:
Op de licht roodbruine flank bevindt zich een minimale lichtcrème gehamerde dwarstekening die loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:
Op het licht roodbruine rugdek bevindt zich vanaf de nek tot op de stuit een minimale gehamerde dwarstekening welke lichtcrème van kleur is. Op het vleugeldek is deze iets lichter en fijner.

Staarttekening:
Op de licht roodbruine staartveren is het tekeningspatroon gelijk aan dat op de stuit.

ZONDER KEEL- EN STREEPTEKENING PASTEL ROODBRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Hoewel deze kleurslag vrij dicht bij de "gewone" pastelroodbruin ligt, zit er toch een duidelijk verschil in, zoals missen van de keeltekening bij de haan en de kleur van de borst bij de hen. Tevens mag deze mutant geen lengtestreepjes tonen.

Egaliteit is ook hier een eerste vereiste. Bij deze mutant dient speciaal op de nekkleur gelet te worden, die mag geen donkere veervelden laten zien.

Dit is een kenmerk van de Afrikaanse kwartel.

Verder gelijk aan de wildvorm.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING WILDVORM intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Kastanjebruin.

Borst:
Kastanjebruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Donkerbruin, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:
Kleine en grote slagpennen zwartbruin met een kastanjebruine gehamerde dwarstekening.

Snavel:
Donkerbruin, de neusdoppen bruin.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:
Zwartbruine pupil met donkerbruine oogring.

Tekening:
Kop en masker:

Kopstreep:	crème lengtestreepjes.	Wenkbrauwstreep:	kaneelkleurig.
Oogstreep:	kastanjebruin.	Oorstreep:	kastanjebruin.
Bovensnavelstreep:	kastanjebruin.	Ondersnavelstreep:	zwartbruin.
Kinstreep:	zwartbruin.	Kinvlek:	kastanjebruin.
Wangstreep:	zwartbruin.	Keelband:	donker kaneelkleurig.

De gehele kop is voorzien van fijne korte crème lengtestreepjes.

Borsttekening:
Op de kastanjebruine borst bevinden zich zeer fijne lichtcrème lengtestreepjes en een zwartbruine gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:
Op de kastanjebruine flank bevinden zich regelmatige fijne crème lengtestreepjes en een lichtcrème en donker bruine gehamerde dwarstekening welke loopt vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:
Op het kastanjebruine rugdek bevinden zich vanaf de nek tot op de stuit symmetrische banen van zeer fijne lengtestreepjes van ca. 1 mm breed. Op elke veertje is tevens een gehamerde dwarstekening welke zwartbruin van kleur is, met lichtcrème en kastanjebruin.
Op het vleugeldek is deze iets lichter en fijner.

Staarttekening:
Op de kastanjebruine staartveren is de crème en donkerbruine gehamerde dwarstekening iets grover dan op de stuit. Tevens is op elk veertje een crème lengtebestreping aanwezig.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING WILDVORM schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Er dient op gelet te worden, dat de streeptekening overal een regelmatig en fijn verloop dient te hebben. Vaak is er op de kop maar één baan met lengtestreepjes te zien, zoals bij de wildvorm. Ook een grove tekening is fout en moet bestraft worden bij tekening.

Verder gelijk aan de mutant zonder keel- en streeptekening wildvorm en de "gewone" wildvorm.

ZONDER

KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING BRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Kastanjebruin, een nuance lichter dan bij de wildvorm met streeptekening.

Borst:
Kastanjebruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering.
Bruin, mat van tint, bij de dijnen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:
Kleine- en grote slagpennen chocoladebruin, met een kastanjebruine gehamerde dwarstekening.

Snavel:
Bruin, de neusdoppen iets lichter.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels bruin.

Ogen:
Donkerbruine pupil met bruine oogring.

Tekening:
Kop en masker:

Kopstreep:	crème lengtestreepjes over de gehele kopbreedte.		
Wenkbrauwstreep:	chocoladebruin.		
Oogstreep:	kastanjebruin.	Oorstreep:	kastanjebruin.
Bovensnavelstreep:	chocoladebruin.	Ondersnavelstreep:	kastanjebruin.
Kinstreep:	kastanjebruin.	Kinvlek:	chocoladebruin.
Wangstreep:	kastanjebruin.	Keelband:	chocoladebruin.

De gehele kop is voorzien van fijne korte crème lengtestreepjes.

Borsttekening:
Op de kastanjebruine borst bevinden zich zeer fijne crème lengtestreepjes en een bruine gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:
Op de kastanjebruine flank bevinden zich regelmatige fijne crème lengtestreepjes en een crème en bruine gehamerde dwarstekening, die lopen vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeldek:
Op het kastanjebruine rugdek bevinden zich vanaf de nek tot op de stuit symmetrische banen van zeer fijne lengtestreepjes van ca. 1 mm breed. Op elk veertje is tevens een gehamerde dwarstekening, welke bruin van kleur is, met lichtcrème en kastanjebruin.
Op het vleugeldek is deze tekening iets fijner.

Staarttekening:
Op de kastanjebruine staartveren is de crème en bruine gehamerde dwarstekening grover dan op de stuit. Tevens is op elk veertje een crème lengtebestreping aanwezig.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING BRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

De kleur bruin is bij deze mutant te onderscheiden t.o.v. de wildvorm doordat het bruin warmer (melkchocolade) en de wildvorm kouder (puur) van tint is. De streep-tekening dient ook hier minimaal aanwezig te zijn. Verder gelijk aan de mutant wildvorm zonder keeltekening, met streep-tekening.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING ROODBRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Donker roodbruin, tegen het bruin van melkchocolade.

Borst:
Donker roodbruin, tegen het bruin van melkchocolade aan.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Donker crème, bij de dijnen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:
Kleine- en grote slagpennen roodbruin, iets lichter dan de lichaamskleur, met een crème gehamerde dwarstekening.

Snavel:
Donkerbeige, de neusdoppen bruin.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil, met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	crème lengtestreepjes, over de gehele breedte.		
Wenkbrauwstreep:	roodbruin.		
Oogstreep:	donkerroodbruin.	Oorstreep:	diep roodbruin.
Bovensnavelstreep:	roodbruin.	Ondersnavelstreep:	diep roodbruin.
Kinstreep:	diep roodbruin.	Kinvlek:	roodbruin.
Wangstreep:	diep roodbruin.	Keelband:	roodbruin.

De gehele kop is voorzien van zeer fijne korte crème lengtestreepjes.

Borsttekening:

Op de donkerroodbruine borst bevinden zich zeer fijne crème lengtestreepjes van ca. 1 mm breed en een regelmatige crème en donker roodbruine gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:

Op de donker roodbruine flank bevinden zich regelmatige fijne crème lengtestreepjes en een crème en donker roodbruine gehamerde dwarstekening, die lopen vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:

Op het donkerroodbruine rugdek bevinden zich vanaf de nek tot op de stuit symmetrische banen van zeer fijne lengtestreepjes van ca. 1 mm breed. Op elk veertje is tevens een crème en donker roodbruine gehamerde dwarstekening aanwezig.

Op het vleugeldek is deze tekening iets fijner.

Staarttekening:

Op de donker roodbruine staartveren is de crème en donker roodbruine gehamerde dwarstekening iets grover dan op de stuit.

Tevens is op elk veertje een crème lengtebestreping aanwezig.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING ROODBRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Gestreefd moet worden naar een zo egaal mogelijke diep roodbruine kleur. De vleugelpennen zijn iets lichter, de diepst gekleurde genieten de voorkeur.

Verder gelijk aan de mutatie zonder keeltekening, met streepstekening wildvorm.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING PASTEL WILDVORM intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:

Opgebleekt kastanjebruin, met grijze waas.

Borst:

Opgebleekt kastanjebruin, met grijze waas.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Opgebleekt bruin, mat van tint, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine- en grote slagpennen opgebleekt bruin met grijze waas met een minimale dwarstekening.

Snavel:

Bruingrijs, de neusdoppen iets lichter.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels lichtbruin.

Ogen:

Bruine pupil, met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	licht crème lengtestreepjes over de gehele breedte.		
Wenkbrauwstreep :	licht kastanjebruin.		
Oogstreep:	opgebleekt kastanjebruin.	Oorstreep:	opgebleekt kastanjebruin.
Bovensnavelstreep:	licht kastanjebruin.	Ondersnavelstreep:	opgebleekt kastanjebruin.
Kinstreep:	opgebleekt kastanjebruin.	Kinvlek:	licht kastanjebruin.
Wangstreep:	opgebleekt kastanjebruin.	Keelband:	licht kastanjebruin.

De gehele kop is voorzien van zeer fijne korte licht crème lengtestreepjes.

Borsttekening:

Op de opgebleekte kastanjebruine borst bevinden zich zeer fijne lichtcrème lengtestreepjes van ca. 1 mm breed en een regelmatige gehamerde dwarstekening met grijze waas.

Flanktekening:

Op de bruinigrijze flank bevinden zich regelmatige fijne lichtcrème lengtestreepjes en een gehamerde dwarstekening welke minimaal zichtbaar moet zijn en lopen vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:

Op het opgebleekte kastanjebruine rugdek bevinden zich vanaf de nek tot op de stuit symmetrische banen van zeer fijne lichtcrème lengtestreepjes van ca. 1 mm breed. Op elk veertje is tevens een crème en grijze licht gehamerde dwarstekening aanwezig.

Op het vleugeldek is deze tekening nog iets fijner.

Staarttekening:

Op de opgebleekte kastanjebruine staartveren zijn nog fijne lengtestreepjes aanwezig en een iets gehamerde crème en grijze tekening.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING PASTEL WILDVORM schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Egaliteit is een eerste vereiste bij een pastel. Vaak is te zien, dat de kleur plaatselijk niet ver genoeg is gereduceerd, waardoor vlekkerige kleur ontstaat.

De gehele lichaamstekening moet nog vaag waarneembaar zijn, hetgeen op de kop een licht pareleffect geeft.

Verder gelijk aan de wildvorm, maar door de streepstekening lijkt deze vorm een nuance lichter dan de mutatie zonder keel- en streepstekening pastel wildvorm.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING PASTEL BRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Licht kastanjebruin.

Borst:

Licht kastanjebruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Licht bruin, mat van tint, bij de dijnen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine- en grote slagpennen licht bruin. De gehamerde dwarstekening is nog slechts minimaal zichtbaar.

Snavel:

Bruin, de neusdoppen iets lichter.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil, met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	lichtcrème lengtestreepjes over de gehele breedte.
Wenkbrauwstreep:	lichtbruin.
Oogstreep:	lichtbruin.
Oorstreep:	crème.
Bovensnavelstreep:	lichtbruin.
Ondersnavelstreep:	lichtbruin, (minimaal zichtbaar).
Kinstreep:	lichtbruin.
Kinvlek:	lichtbruin.
Wangstreep:	lichtbruin, (minimaal zichtbaar).
Keelband:	lichtbruin.

De gehele kop is voorzien van minimale korte licht crème lengtestreepjes.

Borsttekening:

Op de licht kastanjebruine borst bevinden zich zeer fijne licht crème lengtestreepjes, van ca 1 mm breed en een regelmatige gehamerde licht bruine dwarstekening.

Flanktekening:

Op de licht kastanjebruine flank bevinden zich regelmatige fijne licht crème lengtestreepjes en een minimale gehamerde dwarstekening, die lopen vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeldek:

Op het licht kastanjebruine rugdek bevinden zich, vanaf de nek tot op de stuit, symmetrische banen van zeer fijne lengtestreepjes van ca 1 mm breed. Op elk veertje is tevens nog een minimale gehamerde dwarstekening aanwezig. Op het vleugeldek is deze tekening nog iets fijner.

Staarttekening:

Op de licht kastanjebruine staartveren zijn nog fijne lengtestreepjes aanwezig en een iets gehamerde tekening.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING PASTELBRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Door het geringe verschil tussen lichaamskleur en de kleur van de tekening, moet er op gelet worden, dat deze mutatie niet te ver wordt gereduceerd. Ideaal is een reductie, die ligt tussen de 55% en de 65%.

Er dient dan ook op gelet te worden dat, zowel de pasteltinten als de tekening zichtbaar blijven. De tekening moet overigens over het gehele lichaam zowel zichtbaar als overal aanwezig zijn.

T.o.v. de wildvorm met streep-tekening is hier geen grijze waas, maar een beige waas aanwezig. Ook is deze pastelbruine mutatie warmer van kleur dan de wildvorm met streep-tekening. Door de streep-tekening lijkt deze mutatie een nuance lichter dan de pastel wildvorm zonder keeltekening.

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING PASTEL ROODBRUIN intensief (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Licht roodbruin.

Borst:

Licht roodbruin.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Crème tot lichtcrème, bij de dijen en de aars iets donkerder.

Vleugelpennen:

Kleine en grote slagpennen licht roodbruin de gehamerde dwarstekening is nog slechts minimaal zichtbaar.

Snavel:

Beige, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:

Bruine pupil met chocoladebruine oogring.

Tekening:

Kop en masker:

Kopstreep:	licht crème (lengtestreepjes).
Wenkbrauwstreep:	licht roodbruin (minimaal zichtbaar).
Oogstreep:	licht roodbruin.
Oorstreep:	licht roodbruin.
Bovensnavelstreep:	licht roodbruin (minimaal zichtbaar).
Ondersnavelstreep:	licht roodbruin (minimaal zichtbaar).
Kinstreep:	licht roodbruin.
Kinvlek:	licht roodbruin.
Wangstreep:	licht roodbruin.
Keelband:	licht crème.

De gehele kop is voorzien van nauwelijks zichtbare minimale korte lichtcrème lengtestreepjes.

Borsttekening:

Op de licht roodbruine borst bevinden zich zeer fijne lichtcrème lengtestreepjes van ca. 1 mm breed en een minimale gehamerde dwarstekening.

Flanktekening:

Op de licht roodbruine flank bevinden zich regelmatige fijne lichtcrème lengtestreepjes en een minimale gehamerde dwarstekening die lopen vanaf de kropstreek tot aan de stuit.

Rug- en vleugeltekening:

Op het licht roodbruine rugdek bevinden zich vanaf de nek tot op de stuit symmetrische banen zeer fijne lichtcrème lengtestreepjes van ca. 1 mm breed. Op elk veertje is tevens nog een minimale gehamerde dwarstekening aanwezig. Op het vleugeldek is deze tekening nog iets fijner.

Staarttekening:

Op de licht roodbruine staartveren zijn nog fijne lengtestreepjes aanwezig (en een minimale gehamerde tekening).

ZONDER KEELTEKENING, MET STREEPTEKENING PASTEL ROODBRUIN schimmel (haan en hen).

Zie wildvorm schimmel.

Keurtechnische aanwijzingen.

Aangezien de licht roodbruine kleur lichaamskleur en de lichtcrème bestreping dichtbij elkaar liggen qua kleur, toont deze kleurslag een vrij egale tint. Toch moet er bij deze kleurslag opgelet worden dat de lichtroodbruine kleur net iets dieper is dan de tekening.

Ook dient er speciaal op gelet te worden dat er geen donkere veervelden in de nek aanwezig zijn. (invloed Afrikaanse kwartel). Verder gelijk aan de wildvorm met en zonder keeltekening en bestreping.

ALBINO (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Helder wit.

Borst:

Helder wit.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:

Helder wit.

Vleugelpennen:

Helder wit.

Snavel:

Hoornkleurig, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:

Vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.

Ogen:

Pruimrood met helderrode oogring.

Keurtechnische aanwijzingen.

De albino Japanse kwartels moeten smetteloos wit zijn zonder enige vorm van aanslag of onreinheid. Er dient

speciaal gelet te worden dat er zich geen "bruine waas" op de kleur wit bevindt.
Veel voorkomende fouten zijn ook dunne bevedering op de wangen en de vleugelbocht.
Vuile en of onreine buikbevedering moet bestraft worden bij bevedering en in ernstige mate ook bij kleur.
Door een andere vederstructuur in de keel ontstaat daar een iets gehamerde indruk .

WIT (haan en hen).

Kleur:

Schedel - nek - rugdek/mantel - stuit en vleugeldek:
Helder wit.

Borst:
Helder wit.

Buik - onderlijf - aarsbevedering:
Helder wit.

Vleugelpennen:
Helder wit.

Snavel:
Hornkleurig, de neusdoppen vleeskleurig.

Poten:
Vleeskleurig, de nagels hornkleurig.

Ogen:
Zwartbruine pupil met bruine oogring.

Keurtechnische aanwijzingen.

De witte Japanse kwartels moeten smetteloos wit zijn zonder enige vorm van aanslag of onreinheid.
De meest voorkomende fouten zijn bontvorming in de bevedering en de hoorndelen.
Veel voorkomende fouten zijn ook dunne bevedering op de wangen en de vleugelbocht.
Vuile en of onreine buikbevedering moet bestraft worden bij bevedering en in ernstige mate ook bij kleur.
Door een andere vederstructuur in de keel ontstaat daar een iets gehamerde indruk .

BONT (haan en hen).

Qua kleurbeschrijving wordt verwezen naar de wildvorm. Aan het bontpatroon worden de volgende algemene eisen gesteld:

- er moet 40% tot 60% bontvorming zijn
- het moet symmetrisch zijn
- het dient uit aaneengesloten veervelden te bestaan (niet vlekkelig).
- het tekeningspatroon moet bij voorkeur voor 50% onderbroken zijn.
- bontvorming in de hoorndelen is niet toegestaan en moeten qua kleur hetzelfde zijn zoals in de standaard van de kleurslag vermeld staat.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden, dat de bonte Japanse kwartel alleen gevraagd wordt in de wildvorm en die mutaties waarbij zich geen kwantitatieve melanine reductie heeft voorgedaan.

Dus: bont wildvorm; bont bruin; bont wildvorm zonder keeltekening en bont bruin zonder keeltekening.

Hoewel de getekende nog niet beschreven is, behoort dit zeker tot de selectie mogelijkheden. In voorkomende gevallen dienen de kwekers hier dan ook op gewezen te worden.