



Het Beleid van de  
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

ten aanzien van  
**Huisvestingsadviezen**  
voor kooi- en volièrevogels

november 2021 DE&W 05



Commissie Dierenwelzijn – ethiek en Wetgeving

## Colofon

### Auteur

Henk van der Wal

**2021**

### Document 2021 DE &W 05

© 2021 [Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers](#)



De NBvV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de teksten van deze monografie of de toepassing van de adviezen.

Printed on demand:  
Bonds bureau [Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers](#)  
Bergen op Zoom

Op het voorblad:  
Een voorbeeld van het huisvesten van vogels in volièrres en vluchten.

## **Meewerkende Speciaalclubs NBvV.**

Om actuele praktijkervaringen van de verschillende houders van kooi- en volièrevogels te kunnen verwerken in de huisvestingsadviezen (dus op basis van citizen science) is de medewerking gevraagd van de Speciaalclubs die aangesloten zijn bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Aan deze monografie is medewerking verleend door:  
Overkoepelende Vereniging Speciaalclubs binnen de NBvV  
Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadinen;  
Speciaalclub Europese Cultuurvogels;  
Spanish Timbrado Society Nederland;  
Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken;  
Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland;  
Speciaalclub Waterslagers "De Nachtegaal";  
Speciaalclub Japanse Meeuwen en overige Lonchura's  
Nederlandse Zebravinken Club  
Nederlandse Kleurkanarie Club

## **Medewerking van fabrikanten van kooien.**

*Wie een langere tijd vogels houdt, wordt ongemerkt een bekwaam timmerman.*

In veel gevallen worden volières, vluchten en broedkooien door de vogelliefhebber zelf gemaakt op basis van beschikbare ruimte rondom het huis.  
De omvang wordt mede bepaald door de grootte van de te houden vogels.

Ook de markt is hierop ingesprongen en diverse fabrikanten hebben niet alleen een leveringsprogramma voor volières, maar ook voor kooien.  
Op basis van praktijkervaringen zijn nu kunststof kooien beschikbaar die niet alleen voldoen aan huisvestingsadviezen die gerelateerd zijn aan wettelijke dierenwelzijn eisen, maar ook aan de hygiëne eisen die gericht zijn op het voorkomen van b.v. besmettelijke vogelziekten.

Om hieraan te voldoen is een vorm van uniformiteit ontstaan tussen de kooien van de verschillende fabrikanten.

In deze monografie zijn afbeeldingen geplaatst van kooien die gebouwd worden door:

VAN KEULEN kooien. Ambachtsweg 20, 7440 AB NIJVERDAL.

Tel. +31(0) 548 612452, E-mail [j.petersen@keulen.com](mailto:j.petersen@keulen.com) website [www.vankeulenkooien.nl](http://www.vankeulenkooien.nl)

GEHU KOOIEN, Transportweg 9, 7442CT NIJVERDAL.

Tel. 9548 616187, E-mail [gehukooien@gmail.com](mailto:gehukooien@gmail.com), website [www.gehu.nl](http://www.gehu.nl)

JH Bird Products Professional, Kampweg 9/A, 5469 EX ERP.

E-mail [info@firmaheesakkers.nl](mailto:info@firmaheesakkers.nl) website [www.jhbirdproducts.com](http://www.jhbirdproducts.com)

## De Inhoud.

Medewerkende Speciaalclubs NBvV	4
Medewerking van fabrikanten van kooien	4
De Inleiding	6
Waarom huisvestingsadviezen?	7
<b>Deel 1 : Dierenwelzijn.</b>	
Het beleid van de NBvV	8
De intrinsieke waarde van de kooi- en volièrevogel	8
De “Vijf Vrijheden” van Brambell	8
De zorgplicht	9
<b>Deel 2: Huisvesting</b>	
Volières	11
Gaas	12
Kooien	13
<b>Kooiuitvoeringen</b>	
Vluchtkooien	13
(Broed) kooien	14
Maatvoering van fabrieksmatig vervaardigde broedkooien	16
Inrichting van kooien en volières	19
<b>Deel 3: Huisvestingsadviezen / Huisvestingsmatrixen</b>	
De jaarcyclus van een kooi- en volièrevogel	20
De clustervorming	21
<b>Huisvestingsadviezen en de bijbehorende Huisvestingsmatrix</b>	
Clusters 1a en 1b - zaadetende inheemse vogels	22
Clusters 2a en 2b – insecten en vruchtenetende inheemse vogelsoorten	24
Clusters 2c en 2d – insecten en vruchtenetende inheemse vogels	26
Cluster 3a – zaadetende uitheemse vogels – kardinaalachtigen	28
Cluster 3a – zaadetende uitheemse vogels – gorzen	29
Clusters 3b t/m 3g – zaadetende uitheemse vogels – Afrikaanse Prachtvinken	30
Clusters 3b t/m 3g – zaadetende uitheemse vogels – Australische Prachtvinken	32
Clusters 3e en 3f – zaadetende uitheemse vogels – overige Prachtvinken	34
Clusters 3h t/m 3k – zaadetende uitheemse vogels – vinkachtigen	36
Cluster 4a – insecten en vruchtenetende uitheemse vogels	38
Clusters 4b en 4c – insecten en vruchtenetende uitheemse vogels	40

**Vervolg inhoudsopgave:**

Clusters 4d t/m 4f – insecten en vruchtenetende uitheemse vogels	42
Cluster 4g – insecten en vruchtenetende uitheemse vogels	44
Clusters 5a t/m 5c – Papegaaiachtigen – Lori's	46
Cluster 6a – Papegaaiachtigen – Kaketoets	48
Cluster 6b – Papegaaiachtigen – Agaporniden	49
Clusters 6c t/m 6e – Papegaaiachtigen - Echte papegaaien	50
Clusters 7a t/m 7c - Papegaaiachtigen – Parkieten	52
Clusters 7d en 7e - Papegaaiachtigen – Parkieten	54
Clusters 8a en 8b – Duiven en tortels	55
Cluster 9 – Grondvogels – kwartels, fazantachtigen, rallen en waterhoenders	58

## **De Inleiding.**

Eén van de pijlers van de Missie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is:  
*Het bevorderen van een kennis- en informatieoverdracht naar haar leden toe, waardoor zij in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig en duurzaam te houden, met in achtneming van de normen en waarden op het gebied van de gezondheid en het welzijn van hun vogels.*

De basiskennis die nodig is om op een verantwoorde wijze kooi- en volièrevogels te houden is verwoord in het “Handboek Vogelverzorging” geschreven door de Commissie Dierenwelzijn, – ethiek & Wetgeving van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. ISBN 978-90-582129-5-5.

Aanvullend op het Handboek Vogelverzorging zijn en worden voor veel vogelsoorten “Houderijrichtlijnen” geschreven.

Op basis van de praktijkervaringen van fokkers wordt extra aandacht besteed aan de huisvesting- en verzorgingsadviezen die specifiek van toepassing zijn voor de beschreven vogelsoort.

Ook het verloop van het broedseizoen wordt beschreven.

In de praktijk is het vaak gewenst dat een vogelliefhebber bij het aanschaffen van een nog niet eerder gehouden vogelsoort, vooraf zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd over de specifieke kennis die nodig is om op een verantwoorde wijze de vogelsoort te houden en of er mee te fokken.

Een houderijrichtlijn is hiervoor een goede informatiebron.

Op de site van de NBvV zijn via het tabblad downloads/dierenwelzijn zo'n 500 houderijrichtlijnen terug te vinden.

Het opstellen van die houderijrichtlijnen is mogelijk gemaakt door de medewerking van vele leden van de NBvV, die vanuit hun dagelijkse praktijk met het houden, verzorgen en fokken van kooi- en volièrevogels, de benodigde praktijkervaringen konden inbrengen.

De huisvesting van kooi- en volièrevogels is niet bij iedere vogelsoort hetzelfde. Daarom vormt de rubriek “Huisvesting” een vast onderdeel van een per vogelsoort geschreven houderijrichtlijn.

Analyse van de verschillende houderijrichtlijnen binnen de geslachten en soorten die behoren tot één familie, geeft aan dat er nogal eens verschillen in de maatvoering van kooitypen worden aangegeven.

Hierdoor ontstaan misschien verwarringen, die feitelijk niet nodig zijn.

Een uniform advies voor de huisvesting van alle kooi- en volièrevogels is ook niet mogelijk en ook niet gewenst.

Zolang de grootte van een vogel, maar ook het gedrag van een vogel van invloed is op de huisvesting, zien we in de praktijk dat kooi- en volièrevogels jaarlijks nogal eens van kooitype verwisselen.

Ze zitten op jaarbasis dus niet permanent in dezelfde huisvesting, het zijn echte verhuizers.

Deze monografie schenkt aandacht aan de huisvestingsadviezen zoals die passen binnen het adviesbeleid van de NBvV ten aanzien van dierenwelzijn, dierenethiek, diergezondheid en wetgeving.

De houderijrichtlijnen zijn hierop aangepast.

November 2021

Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving NBvV  
afd. Educatie en kennisoverdracht.

## Waarom huisvestingsadviezen?

Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van dierenwelzijn, dierenethiek, diergezondheid en diergedrag bepaalt te wijze waarop haar leden omgaan met deze genoemde onderwerpen.

Onder de zorgplicht die de leden van de NBvV hebben ten opzichte van het houden, verzorgen en fokken met kooi- en volièrevogels, behoort ook de zorg voor een toereikende behuizing met daaraan verbonden voldoende hygiënische omstandigheden.

In het Besluit houders van dieren, een AMvB bij de Wet dieren zijn in §2, artikel 1.6 Houden van dieren, 1.7 verzorgen van dieren, en 1.8 Behuizing, meerdere verplichtingen voor de houder van een dier opgenomen.

Niet wordt in detail aangegeven welke voorzieningen moeten worden getroffen om aan die verplichtingen te voldoen.

Feitelijk zijn de genoemde verplichtingen zogenaamde doelvoorschriften of “open normen”. Hiermee wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de vogelliefhebber voor de door hem of haar gehouden vogelsoorten.

Zo krijgt men met een “open norm” de ruimte zelf de middelen te kiezen waarmee het beoogde doel kan worden verwezenlijkt.

Het gevolg van open normen is dat, in tegenstelling tot de ministeriele regelingen in België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, in Nederland geen wettelijk voorgeschreven maatvoeringen voor volières, vluchten, uitvliegkooien, vluchtkooien of broedkooien zijn vastgesteld.

Om een zo'n uniform mogelijke richting te geven aan een verantwoorde wijze waarop de aantoonbaar in Nederland gehouden kooi- en volièrevogels worden gehuisvest, voorziet de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in huisvestingsadviezen voor de vogelfamilies, waarvoor ook houderijrichtlijnen zijn geschreven.

Kooi- en volièrevogels worden over een tijdsduur van een jaar, diverse malen verhuisd.

Dit is afhankelijk van de stadia waarin we een jaarcyclus van de vogel samenvatten.

Eigenlijk ontstaat de noodzaak mede door het wisselen van de fysieke behoeften en de ethologische gedragingen van de vogel, die kenmerkend zijn voor die stadia.

Voor al die verschillende stadia zijn door de NBvV in de vorm van een huisvestingsmatrix huisvestingsadviezen opgesteld.

Deze adviezen komen niet uit literatuurstudies, maar zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijkervaringen van vele vogelliefhebbers die lid zijn van de NBvV (citizen science).

## **Dierenwelzijn.**

### **Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.**

Het beleid van de NBvV ten aanzien van dierenwelzijn is op schrift gesteld via twee documenten:

- a) Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels;
- b) Uitvoeringsbesluit van het Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels.

Dit beleid is een onderdeel van het totale beleid van de NBvV.

Het totale beleid is afgeleid van de Statuten en de Missie van de NBvV.

In het jaarverslag wordt dit beleid gepubliceerd en aangevuld met de beleidsplannen voor het komende jaar.

Ook het gevoerde beleid ten aanzien van dierenwelzijn, diergezondheid en dierenethiek is niet statisch.

Mede afhankelijk van technische ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, maar ook door het beschikbaar komen van goede voedingsmiddelen en middelen en methoden ter bevordering van de gezondheid, zijn inzichten in het houden en fokken van kooi- en volièrevogels aan veranderingen onderhevig.

Daarnaast staat dit beleid ook onder invloed van steeds veranderende wetgeving.

De kennisoverdracht van de ontwikkelingen op het gebied van o.a. die wetgeving, maar ook de maatschappelijke inzichten op het houden van en fokken met vogels vindt plaats via monografieën aan de leden van de NBvV.

### **De intrinsieke waarde van de kooi- en volièrevogel.**

De NBvV stemt als dierhouderijorganisatie in met de in de Wet dieren omschreven intrinsieke waarde van de door haar leden gehouden vogelsoorten.

Daarmee wordt de eigenwaarde van deze groep vogels erkend als dieren met gevoel.

In de praktijk van het houden van vogels legt dit uitgangspunt vergaande verplichtingen op aan de vogelhouder.

Allereerst ontstaat daardoor een zorgplicht.

Daarnaast ontstaat ook de verplichting om met respect om te gaan met het denkvermogen, het leervermogen, het diergedrag en de gezondheid van de vogel.

Met de instemming van de intrinsieke waarde van de kooi- en volièrevogels ligt eigenlijk opgesloten dat de vogelhouder zich maximaal moet inspannen die voorwaarden te scheppen waaronder de gehouden vogels zich "goed" voelen.

### **De "Vijf Vrijheden".**

In 1965 kreeg het Brambell Committee van de Britse regering de opdracht om de voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten worden.

De Britse Farm Animal Welfare Council heeft deze voorwaarden in 1993 uitgewerkt tot de bekende "Vijf Vrijheden".

Deze voorwaarden zijn in 2011 ook opgenomen in de Nederlandse Wet dieren en zijn dan als omschrijving van de zorg voor dieren als volgt gedefinieerd:

Dieren moeten gevrijwaard zijn van dorst, honger en onjuiste voeding;

Dieren moeten gevrijwaard zijn van fysiek en fysiologisch ongerief;

Dieren moeten gevrijwaard zijn van pijn, verwonding en ziektes;



Dieren moeten gevrijwaard zijn van angst en chronische stress;  
Dieren moeten gevrijwaard zijn van beperking van hun normaal gedrag,  
voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Bovenstaande zorgplichten richten zich op het voorkomen van alleen maar negatieve gevolgen die kunnen ontstaan bij het houden van dieren.

Anno 2021 is dit niet meer voldoende.

Een belangrijk facet dat meer aandacht verdient, is dat onze gehouden kooi- en volièrevogels zich aantoonbaar “gelukkig” voelen, floreren, in hun omgeving waarin ze gehouden worden.

Een pleidooi daarvoor is afkomstig van dr. ing. Hans Hopster, de eerste lector dierenwelzijn in Nederland.

Tot voor zijn pensionering in 2021 was hij onder andere verbonden aan de Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden.

Als zorg sprak hij uit:

***Wij willen dat dieren floreren;  
Daar zijn nieuwe ontwerpen voor nodig;  
Het is tijd voor een grote sprong voorwaarts.***

*(citaat uit het interview dat hij daags na zijn pensionering had met “Levende Have”, het landelijk kennisnetwerk voor houders van boerderijdieren, oktober 2021).*

## **De zorgplicht.**

Het beleid van de NBvV ten aanzien van dierenwelzijn richt zich op het verantwoord en diervriendelijk houden van vogels en deze zo te huisvesten, verzorgen en er eventueel mee te fokken, dat de belangen van het dier niet worden geschaad.

Voortvloeiende uit de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier, staat in dit gevoerde beleid het dier centraal.

De Nederlandse wetgeving voorziet, in het Besluit houders van dieren, in het benoemen van de zorgplicht voor dieren.

De wettekst geeft een zevental richtlijnen aan.

Degene die een dier houdt draagt er zorg voor dat een dier:

- wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging nodige kennis en vaardigheden;
- slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging in staat is;
- dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd;
- een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden;
- een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en de leeftijd geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van het dier;
- toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen;
- voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

Samenvattend:

De zorg voor dieren moet zich uitstrekken tot de voorwaarden waaronder dieren zich volledig positief kunnen ontplooiën.

Een dier voelt zich goed als de “Vijf Vrijheden” zijn geborgd.

Daarvoor is het nodig dat het dier vrij is van intense angst, pijn en andere negatieve ervaringen.

Liever zien we dat het dier zich “beter dan goed” voelt.

Het dier moet goed functioneren, een bevredigende gezondheid hebben, een normale groeiperiode doormaken.

Het dier moet zowel normaal als soortspecifiek functionerende fysiologische behoeften en ethologische gedragssystemen kunnen ontwikkelen.

Maar ook: het dier moet een normaal leven kunnen leiden in een verrijkt leefmilieu en in gezelschap van soortgenoten.



## Deel 2: Huisvesting

Afhankelijk van de fysieke behoeften en de ethologische gedragingen van de diverse vogelsoorten, onderscheiden we huisvesting van vogels in kooien, volièrès, vluchten, of in een vijver of weide.

In kooien, vluchten en volièrès kunnen we de eisen van een te houden vogelsoort op gebied van temperatuur en vochtigheidsgraad beter in de hand houden dan in een vijver of een weide.

Maar voor volièrè alsook vijver of weide geldt dat de vogels dan moeten kunnen beschikken over een schuilgedeelte waar ze kunnen schuilen voor slecht weer en lage temperaturen.

Hoe je vogels ook huisvest, zorg er voor dat huisvesting altijd is aangepast op de eisen die de vogelsoort daaraan stelt.

Altijd moet de huisvesting zodanig zijn dat schade aan de gezondheid en het welbevinden van de vogel voorkomen wordt.

In de toekomst zullen er misschien bindende voorschriften komen waaraan kooien en volièrès moeten voldoen. Deze voorschriften moeten dan sowieso in acht genomen worden. Bij het bouwen van volièrès krijgt de houder misschien te maken met de gemeentelijke bouwvoorschriften.

Men moet zich in zijn eigen belang vooraf laten informeren hoe die voorschriften luiden en zich daaraan houden bij het bouwen van een volièrè.

Een goede constructie van een vogelverblijf, ook wel een beschermde behuizing genoemd, is van groot belang voor het welzijn van de daarin verblijvende vogels.

Van belang zijn dan de volgende voorwaarden:

- moet geen naden en kieren hebben waarin parasieten zich kunnen verschuilen;
- moet goed schoon te houden zijn met bijvoorbeeld warm water (al dan niet met een ontsmettingsmiddel);
- moet niet vochtig zijn;
- moet een goede plaats bieden aan voer- en drinkbakken waarbij voorkomen moet worden dat deze onderling uitgewisseld worden.

Daarnaast moet het materiaal van de constructie zodanig gekozen worden dat deze niet door bijvoorbeeld daarin gehuisveste papegaaien wordt aan- of opgevreten.

Ook de maaswijdte van het gekozen gaas moet afgestemd zijn op de grootte van de vogelsoorten.

## Volièrès

Voor de meeste vogelsoorten zal gelden dat ze gehouden moeten worden in afgesloten volièrès of vluchten om ontsnappen in de vrije natuur tegen te gaan.

Volièrès zijn er in soorten en maten.

Er zijn binnenvolièrès welke zich in een kamer of schuur bevinden, hier kan de fokker temperatuur, luchtvochtigheid en (dag) licht samenstelling en lengte geheel bepalen.

Dat levert vaak grote voordelen op voor zowel de vogel als ook de fokker.

Er kan zorg op maat aangeboden worden.

De zogenaamde buitenvolièrè is meestal in de tuin gesitueerd.

Vaak vormen ze een geheel met de tuin en zijn zeer fraai van aanzien.

Helaas leent het weer in West Europa zich vaak niet zo voor het houden van tropische vogels in de buitenvolièrè.

Vanwege regen en wind die in voor- en najaar vaak West Europa teisteren moeten buitenvolièrès bij voorkeur voorzien zijn van een droog en verwarmd nachthok.

De zo genoemde buitenvlucht moet in ieder geval voor een deel overdekt zijn, zodat er geschild kan worden bij slechte weersomstandigheden.

Vluchten zijn vaak lange en smalle afgeschermdes ruimten waarin als regel slechts één koppel vogels wordt ondergebracht, al dan niet tijdelijk met hun jongen.

In het algemeen wordt nog van een vlucht gesproken als deze niet breder is dan 100 cm.

Als regel is een tocht en vorstvrij nachthok aan een dergelijke vlucht gekoppeld.



*Volière met aangebouwd nachthok.*

## Gaas

De afmetingen van volièregaas, zoals de maaswijdte, draaddikte en rolbreedte, lopen uiteen. Afhankelijk van de grootte van de vogelsoort, moeten de mazen fijner zijn.

De maaswijdte van parkietengaas ligt meestal rond de 19 mm, voor kanaries en kleinere zangvogels rond de 12,7 mm.

Dit zijn veelvoorkomende maaswijdtes per vogeltype:

Maaswijdte (mm)	Vogelsoort
8 x 8	O.a. Tropicen , kolibries
12,7x12,7	O.a. vinken, wevers
16x16	Grasparkieten en vogels van soortgelijke grootte
19x19	Kleinere parkietensoorten
25,4x25,4	Grote parkieten/papegaaien, kaketoos, ara's

## Draaddikte volièregaas per vogelsoort

Welke draaddikte moet je dan kiezen voor de volière?

Behalve de grootte verschilt ook de kracht van de snavel per vogelsoort.

Hierdoor verschilt ook de benodigde draaddikte.

Een volière voor een grote kaketoos moet een minimale draaddikte van 1,6 mm hebben, Parkietengaas minimaal 1,0 mm Kanaries, zebra-vinken e.d. 0,65 mm.

## **Kooien.**

Veel vogelsoorten worden in volièrès gehouden en zijn geen kooivogels. Afhankelijk van de buitentemperatuur gaan ze in de winter naar binnen in nachthokken. Deze vogelsoorten brengen ook hun broedseizoen door in volièrès door en broeden dan in eigen gemaakte nesten in de begroeiing van de volièrè, in prefab nestkastjes of in broedblokken die gemaakt worden uit stevige boomstammen.

Voor de wat kleinere vogelsoorten worden vaak in tijdelijke broedkooien gefokt. Aan het fokken van vogels in (broed) kooien zijn een aantal voordelen verbonden. Allereerst kun je als houder betere controle uitoefenen op je vogels. Immers de ruimte waarin ze verblijven is overzichtelijker. Daarnaast biedt huisvesting in kooien het paar geen mogelijkheid om excessief territoriumgedrag ten toon te spreiden. Als de man de pop achtervolgt en bedreigt, is een tussenwand snel geplaatst en kunnen de vogels aan elkaar wennen zonder elkaar te verwonden.

De volgende kwestie is de vraag hoe groot de kooi moet zijn. Dat hangt erg af van de lichaamsgrootte maar ook van het gedrag. Kleine vogels met een zeer actief gedrag hebben meer ruimte nodig dan grotere vogels welke zich rustig gedragen. Als er geen huisvestingsadviezen geschreven zijn voor een bepaalde soort of groep vogels dan zal vooral op basis van de grootte van de vogel bepaald moeten worden hoe groot de kooi moet zijn. Naast de grootte van een kooi speelt ook de afstand tot de vloer een rol. Het is af te raden om een kooi direct op de grond te plaatsen, dit omdat het vlak boven de vloer vaak tocht doordat onder de drempels van deuren de lucht circuleert. Voor de wat makkelijker te houden soorten is een afstand van 40 cm tot de vloer aan te bevelen, voor de moeilijker te houden soorten is 80 centimeter boven de vloer aan te raden.

## **Kooi uitvoeringen.**


### **Vluchtkooien of uitvliegkooien.**

Onder "vluchtkooien" of "uitvliegkooien" worden ruime kooien verstaan waarin vooral in de rustperiode tijdens de winterperiode en de rustperiode na het broedseizoen, de daarvoor in aanmerking komende vogelsoorten in ondergebracht worden.

De kooi is een kleine uitgave van de open vlucht, maar is alleen aan de voorzijde open. Een vluchtkooi kan worden opgesteld in een nachthok als vast onderdeel daarvan.

Vluchtkooien kunnen ook worden opgesteld in de binnenruimte van een vogelverblijf. Op die wijze is de temperatuur, de luchtkwaliteit, en het licht goed regelbaar.

In een vluchtkooi kunnen meerdere vogels geplaatst worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met niet alleen de grootte van de vogel, maar ook hun gedrag tegen soortgenoten en tegen andere, vooral kleinere, vogelsoorten.

VLUCHTKOOIEN			
	lengte (cm)	hoogte (cm)	diepte (cm)
	83	80	40
	103	80	40
	122	80	40
	124	80	40
	154	80	40
	182	80	40

*Uit het kooien programma 2020 van GEHU Kooien te Nijverdal,*

Vluchtkooien hebben rondom dichte wanden.

De voorzijde is voorzien van een metalen voorfront met verzinkte tralies en voorzieningen voor voerbakjes en waterflesjes.

De kooien worden als regel gebouwd met een of meer (kunststof) laden voor het schoonhouden van de vloer.

Vluchtkooien kunnen zelf door de vogelhouder gebouwd worden.

Sommige liefhebbers gebruiken kooien met afmetingen van 100 cm. lang, 100 cm. hoog en 50 cm. diep.

Ook een nachthok aan een volière of vlucht kan worden gerekend tot vluchtkooi.

Nederlandse fabrikanten van vogelkooien hebben de vluchtkooien soms in hun kooienprogramma opgenomen.

Die kooien kunnen afmetingen hebben van 80 tot 180 cm. lang, 80 cm. hoog en 40 cm. diep.

### **Broed – of kweekkooien.**

Vogelsoorten die niet in volières of vluchten broeden omdat ze bijvoorbeeld deelnemen aan een fokprogramma, worden na de winterse rustperiode tijdelijk ondergebracht in broed- of kweekkooien.

Al een aantal jaren terug waren deze van hout en werden soms door de liefhebber zelf gemaakt.

Ze werden ook wel fabrieksmatig vervaardigd en kwamen onder de naam “Bartels’s broedkooi” op de markt.



Foto © Chris van Hout, kooi uit de verzameling van de Culturele Vogelhouderij.

Dhr. A Bartels was in het midden van de 20<sup>e</sup> eeuw zangkanarie fokker en keurmeester. Vanuit zijn praktijkervaring met het fokken van zangkanaries ontwikkelde hij een voor dat doel zeer geschikte dubbele broedkooi.

De afmetingen waren, uitgaande van de twee afzonderlijke ruimtes 64x26x17 cm. (l x h x b) . Eén broedkooi had de afmeting 32x26x17 cm.

De kooi is aan drie zijden gesloten. Aan de voorzijde is een voorfront aangebracht dat is opgebouwd uit gegalvaniseerde metalen tralies.

Onder het voorfront was een houten zandlade aanwezig.

De kooi kon op vier pootjes staan.

De nestkastjes hingen buiten aan de zijkant van de broedkooi, evenals een (nu) antiek drinkflesje.

Aan de voorzijde zaten in het voorfront twee deurtjes en vier glaasjes voor het voer.

Daarnaast zijn twee porseleinen bakjes door de tralies gestoken voor eivoer.

In het voorfront waren ook twee metalen ruifjes aangebracht voor het geven van eventueel groenvoer of een sepia-schildje.

Door het verwijderen van het tussenschot kwam een grotere vliegruimte beschikbaar.

We zijn honderd jaar verder.

Het basisprincipe van de "Bartel's broedkooi" wordt nog steeds gehanteerd bij het fabrieksmatig vervaardigen van broedkooien.

De broedkooien zijn nu van kunststof, de voorfronten van iets dikkere gegalvaniseerde of chroom vernikkeld metaal.

De afmetingen zijn iets aangepast, maar zijn nu ook verkrijgbaar voor wat grotere vogelsoorten.

De huidige fabrieksmatig gemaakte broedkooien zijn gemaakt van kunststof.

Ze zijn aan drie zijden gesloten.

De voorzijde is voorzien van een metalen voorfront.

Daaronder is een zandlade aangebracht.

Broedkooien kunnen naast elkaar en boven elkaar gemonteerd worden, waardoor bijvoorbeeld blokken van 18 kooien ( 3 boven en 6 naast elkaar) samengesteld kunnen worden.

**Maatvoering van fabrieksmatig vervaardigde broedkooien.**

# **VAN KEULEN** kooien

Het totale kooienprogramma is enorm uitgebreid.

Het basisprogramma is opgebouwd uit kooien 40 cm. hoog en 40 cm diep.

De lengte per kooi is 40, 50, 60, 80, 100, of 120 cm.

Een tweede serie bestaat uit kooien 50 cm. hoog, 40 cm. diep.

De lengte per kooi is dan 40, 50, 60, 80, 100 of 120 cm.

Een derde serie bestaat uit kooien 60 cm. hoog en 60 cm. diep.

De lengte per kooi is dan 80, 100 en 120 cm.

Raadpleeg bij aankoop vooraf de prijslijst Kooienprogramma voor de juiste keuze van kooien en onderdelen.







Het kooienprogramma van GEHU KOOIEN kent drie series.

De eerste serie wordt gevormd door broedkooien met een afmeting: hoogte 40 cm. diepte 40 cm.

Een standaard model van 2 vakken kan als lente de afmetingen hebben van 83, 103, en 122 cm.

Een standaardmodel met 3 vakken heeft als lengte 124, 154 of 182 cm.

Ook hier kunnen tot 4 kooien op elkaar gestapeld worden.

Een tweede serie heeft een hoogte van 50 cm. en een diepte van 40 cm.

Een standaardmodel ( 1 kooi met 2 vakken) heeft dan de lengte van 83, 103 of 122 cm.

Een standaard model ( 1 kooi met 3 vakken) heeft de lengte van 124, 154 of 182 cm.

Ook hier is stapeling van 3 kooien mogelijk.

Een derde serie bestaat uit 1 kooi (dus 1 vak) met een hoogte van 50 cm. en een diepte van 40 cm.

De lengte bedraagt 83, 103, of 122 cm.

Raadpleeg voor aankoop het kooienprogramma voor de GEHU kooien, fronten en hulpmaterialen.





Onder de merknaam HENAVA brengt J.H. Bird Products Professional uit Erp, broedkooien op de markt die in hoofdzaak een hoogte van 40 cm. en een diepte van 40 cm. hebben. De lengte is afhankelijk van het aantal vakken per broedkooi.

1-delige kooien zijn leverbaar in de lengten van 41, 51, 61, 71, 83 en 102 cm.

2-delige kooien zijn leverbaar in de lengten van 61, 83, 102, 124 en 165 cm.

3-delige kooien zijn leverbaar in de lengten van 124, 142 en 165 cm.

4-delige kooi is leverbaar in de lengte van 165 cm.

In een tweede serie hebben de enkele kooien een hoogte van 50 cm.


De lengte van een 2-delige kooi is dan 83 cm.

Ook is in deze serie een 2-delige kooi beschikbaar met de afmetingen 165 x 50 x 50 cm.

De kooien kunnen worden voorzien van een grote verscheidenheid aan voorfronten.

Ook het tussen plaatsen van een "babykooi" is mogelijk. (rechter foto)

Raadpleeg voor aankoop steeds de website [www.jhbirdproducts.com](http://www.jhbirdproducts.com)



## **Inrichting van kooien en volières**

Hoe men zijn vogels ook onderbrengt iedere huisvesting heeft zo zijn eigen voordelen en beperkingen.

Waar u ook voor kiest, het uitgangspunt moet zijn dat de huisvesting van uw vogels voldoet aan de praktische eisen en de behoeftes van de door u te houden vogelsoort.

Grotere kooien, vluchten en volières zijn mogelijk te voorzien van beplanting.

Let er wel op dat u geen giftige planten of struiken kiest.

De meeste vogels mogen graag aan groene planten knabbelen en als ze dan giftig zijn laten de gevolgen zich wel raden.

Als u een grote vluchtkooi of volièrè inricht moeten er natuurlijk ook voer -, en waterbakken geplaatst worden.

Let bij de plaatsing op mogelijke verontreiniging van voer en water door ontlasting van de vogels.

Dit is een zeker recept voor allerlei ziektes.

Zorg er dan ook voor dat voer en waterbakken niet in de buurt van de zitstokken geplaatst worden.

Pas ook op voor verontreiniging van buitenaf.

Ook door wilde vogels kunnen allerlei ziektes (b.v. vogelgriep) over gebracht worden.

Zorg er voor dat uw vogels hun voedsel op een zo natuurlijk mogelijke wijze kunnen opnemen.

Let er ook op dat het voer zoveel mogelijk niet op de grond wordt aangeboden.

Dit met oog op verontreiniging en ongedierte.

Afhankelijk van het aantal vogels dat u in de volièrè of kooi wilt huisvesten moet u zitstokken ter beschikking stellen.

Zorg er wel voor dat deze ver van elkaar verwijderd worden opgebracht zodat uw vogels gedwongen worden te vliegen.

Bij buitenvolières zal een deel van de volièrè voorzien zijn van een natuurlijke bodem.

Zorg er voor dat fundatie voldoende diep gaat zodat ratten en muizen niet onder de fundering door graven en in uw volièrè terecht komen.

Een fundering moet zeker wel 40 cm diep zijn om dit tegen te gaan.

Wat ook helpt is gaas aanbrengen onder de bodem van uw vlucht.

Voor wat betreft het nachthok van uw volièrè moet u zorgen voor een droge betonnen vloer met als bodembedekking houtsnippers, hennepvezel of gemalen maïs kolven.

Dit zijn natuurlijke materialen die u zonder problemen kunt afvoeren via de groene container.

Ze zijn ook vrijwel stofvrij en binden het vocht uit de ontlasting goed.

Kattenbakkorrels absorberen vocht het beste maar hebben als nadeel dat ze vrijwel nooit stofvrij zijn. Dat stof is niet alleen nadelig voor de vogels maar ook voor de vogelhouder.

Schelpenzand zou eigenlijk niet gebruikt moeten worden daar het geen vocht kan absorberen en dus vochtig blijft en daardoor veel ziektes kan verspreiden.

Sommige vogelsoorten, zoals papegaaien en parkieten, willen ook buiten de broedtijd graag een nestkast ter beschikking hebben om in te slapen.

Deze dienen dan ook in de kooi, volièrè of nachthok beschikbaar te zijn.

## **Deel 3: Huisvestingsadviezen en de bijbehorende Huisvestingsmatrix.**

### **De jaarcyclus van een kooi- en volièrevogel.**

Om een vogel op een verantwoorde wijze te huisvesten, waarbij recht wordt gedaan aan de voorwaarde dat de normale, soortspecifieke gedragingen niet in het gedrang komen, is een min of meer gedegen kennis nodig van de levensbehoeften, de zintuigen, en de gedragingen.

Daarbij is kennis nodig van de verschillende stadia die een vogel jaarlijks doormaakt.

Juist deze stadia vragen een daaraan passende huisvesting.

Omdat die stadia aanwezig zijn en soms sterk van elkaar wisselen, ontstaat de noodzaak een meer dan minimale kennis te hebben van de bijbehorende huisvestingssystemen.

Een monotone huisvesting die gepaard gaat met te weinig aandacht leidt dan ook vaak tot dwanggedrag.

Dit is in alle gevallen een vorm van gedrag dat we op basis van het beleid van de NBvV ten aanzien van dierenwelzijn, dierenethiek en diergezondheid niet bij onze vogels wensen.

Een opsomming van de jaarcyclus kan het beste starten met de rustperiode.

Achtereenvolgens ondergaan onze vogels de volgende stadia:

1. de rustperiode vanaf de herfst;
2. de voorbereiding op de winterperiode;
3. de voorbereiding op het broedseizoen;
4. het broedseizoen;
5. een rustperiode;
6. de ruiperiode;
7. de voorbereiding voor een deelname aan keuringen, tentoonstellingen, zangconcoursen;
8. de deelname aan keuringen, tentoonstellingen, zangconcoursen;
9. een derde rustperiode die overgaat in de onder 1 genoemde periode.

Een niet onbelangrijk deel van de kennis die nodig is om verantwoord vogelsoorten te houden, verzorgen en er mee te fokken, is vastgelegd in de houderijrichtlijnen van de NBvV. De specifieke huisvestingsrichtlijnen per vogelsoort vormen een onderdeel van het totale kennispakket dat in een houderijrichtlijn is samengebracht.

Die richtlijnen zijn geschreven op basis van de praktijkervaringen die destijds zijn ingebracht door de leden van de NBvV, die gehoor hebben gegeven aan de oproep om een eenvoudige vragenlijst met betrekking tot de vogelsoorten die men zelf houdt, ingevuld beschikbaar te stellen aan de cie. DE&W van de NBvV.

## **De clustervorming**

Omdat onder anderen de huisvesting, maar bijvoorbeeld ook de voedingsbehoeften niet voor iedere vogelsoort uniform is, zijn de reeds geschreven houderijrichtlijnen opgedeeld in negen clusters.

1. Zaa-detende inheemse vogelsoorten;
2. Insecten en vruchtenetende inheemse vogelsoorten;
3. Zaa-detende uitheemse vogelsoorten;
4. Insecten en vruchtenetende uitheemse vogelsoorten
5. Papegaaiaachtigen, Lori's
6. Papegaaiaachtigen, Kaketoës en Papegaaien
7. Papegaaiaachtigen, Parkieten
8. Duiven en tortels;
9. Grondvogels

Deze indeling in clusters is nu ook toegepast bij het beschrijven van de huisvestingsadviezen.

Door de omvang van de vogelsoorten binnen een cluster is gekozen voor het opdelen van de verschillende families, waarvoor dus houderijrichtlijnen zijn geschreven.

Dat heeft geresulteerd in meerdere delen binnen een cluster.

In het totaal zijn op deze wijze 40 afzonderlijke delen geschreven.

Bij het opstellen van een huisvestingsmatrix zijn soms meerdere delen gecombineerd.

Veel vogelsoorten worden gehuisvest in kooien, anderen juist niet, maar dan in volières en vluchten.

*Zo ontstaat het verschil in "kooi- en volière" vogels.*

Het is geheel afhankelijk van de ruimte buiten en binnen het huis, hoe groot deze volières kunnen zijn.

Ook de indeling van de tuin is mede bepalend.

De geadviseerde afmetingen van kooien is vooral bepaald door de praktijkervaringen die we hebben ontvangen van de leden van de NBvV.

Mede bepalend zijn de afmetingen die door de verschillende Nederlandse fabrikanten in de handel worden gebracht.

*Als een vogelliefhebber een paar jaar vogels houdt, verzorgt en er mee fokt, kan het niet uitblijven dat hij/zij een bekwaam timmerman wordt.*

Zelfbouw volières en vluchten, maar ook kooien, blijven altijd mogelijk als de basis maar ligt om en nabij bij de geadviseerde afmetingen.

Ruimere afmetingen zijn altijd toe te juichen.

**Huisvestingsadviezen.**  
**Clusters 1.a, 1.b.**  
**Zaadetende inheemse vogelsoorten.**

Tot deze groep behoren de aantoonbaar gehouden vogelsoorten die vallen onder artikel 1 van de Vogelrichtlijn (richtlijn 2009/147 EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009, inzake het behoud van de vogelstand)

In de avicultuur spreken we over Europese Cultuurvogels.

Houderijrichtlijnen, inclusief huisvestingsadviezen zijn geschreven voor:

**Familie Emberizidae – gorzen.**

Geslacht Emberiza, grootte 15 – 18 cm. 17 soorten o.a. Grauwe gors, Geelgors, Ortolaan, Rietgors.

**Familie Fringillidae – vinken.**

Geslacht Carduelis , grootte 11,5 - 16 cm. 25 soorten o.a. Kneu, Putter, Groenling, Barmsijs Frater, Sijzen.

Geslacht Carpodacus, grootte 15,5 cm. 1 soort, Europese roodmus.

Geslacht Coccythrautis, grootte 18 cm. 1 soort, Appelvink.

Geslacht Fringilla, grootte 15 cm. 5 soorten, o.a. Vink, Keep.

Geslacht Loxia, grootte 14,5 – 17 cm, 4 soorten, o.a. Kleine kruisbek, Witband kruisbek, Grote kruisbek.

Geslacht Pinicola, grootte 19 – 22 cm. 1 soort, Europese haakbek.

Geslacht Serinus, grootte 11,5 – 13 cm. 4 Europese soorten, o.a. Wilde kanarie,

Roodvoorhoofd kanarie, Cini

**Familie Passeridae – mussen**

Geslacht Passer, grootte 14 – 15 cm. 15 soorten, o.a. Huismus, Spaanse mus, Ringmus.

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 1a en 1b.  
Zaadetende inheemse kooi- en volière vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Kooi 80 x 40 x 50 cm. Kooi 100 x 40 x 50 cm. Kooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Broedkooi 40 x 40 x 50 cm. Broedkooi 50 x 40 x 50 cm. Broedkooi 50 x 50 x 50 cm Of nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 40 x 40 x 50 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 50 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

In verband met het normaal en soorteigen gedrag van inheemse cultuurvogels is gekozen voor een kooihoogte van 50 cm.

## **Huisvestingsadviezen.**

### **Clusters 2a en 2b**

#### **Insecten en vruchtenetende inheemse vogelsoorten.**

Tot deze groep behoren de aantoonbaar gehouden vogelsoorten die vallen onder artikel 1 van de Vogelrichtlijn (richtlijn 2009/147 EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009, inzake het behoud van de vogelstand)

In de avicultuur spreken we over Europese Cultuurvogels.

Het bijzondere aan deze groep is dat het geen zaadeters zijn.

Daarnaast zijn het geen kooivogels, maar moeten gerekend worden tot volièrevogels.

Houderijrichtlijnen, inclusief huisvestingsadviezen, zijn geschreven voor:

#### **Familie Upupidae - hoppen**

Geslacht *Upupa epos*, grootte 26 – 28 cm. 1 soort, Hop

#### **Familie Charadiidae - plevieren**

Geslacht *Charadrius*, grootte 14 – 15 cm. 2 soorten, o.a. Kleine Plevier

#### **Familie Acrocephalida - rietzangers**

Geslacht *Acrocephalus*, grootte 12,5 – 19 cm. 3 soorten, o.a. Grote en Kleine Karekiet

Geslacht *Hippolais*, grootte 13 cm. 1 soort, Europese spotvogel

#### **Familie Aegithalidae - staartmezen**

Geslacht *Aegithalos*, grootte 14 cm. 1 soort, Europese staartmees

#### **Familie Alaudidae – leeuweriken**

Geslacht *Alauda*, grootte 18 cm. 1 soort, Veldleeuwerik

Geslacht *Galanda*, grootte 17 cm. 2 soorten, o.a. Kuifleeuwerik

#### **Familie Bombycillidae – pestvogels**

Geslacht *Bombycilla*, grootte 18 cm. 3 soorten, o.a. Europese pestvogel

#### **Familie Motacillidae – piepers en kwikstaarten**

Geslacht *Anthus*, grootte 15 – 16 cm. 3 soorten, o.a. Duinpieper, Graspieper

Geslacht *Motacilla*, grootte 16,5 – 18 cm. 5soorten, o.a. Witte kwikstaart,

Grote gele kwikstaart, Gele kwikstaart.

#### **Familie Muscicapidae – vliegenvangers**

Geslacht *Erithacus*, groote 14 cm. 5 soorten, o.a. Roodborst

Geslacht *Ficedula*, grootte 11,5 – 13 cm 3soorten, o.a. Bonte en Kleine vliegenvanger

Geslacht *Lucinia*, grootte 14 – 16,5 cm. 9 soorten, o.a. Roodkeel nachtegaal, Blauwborst

Witgesterde blauwborst, Europese

Nachtegaal

Geslacht *Phoenicurus*, grootte 14 – 15 cm. 4 soorten, o.a. Zwarte- en Gekraagde roodstaart

Geslacht *Saxicola*, grootte 12 – 12,5 cm. 3 soorten, o.a. Paapje, Roodborst tapuit

#### **Familie Oriolidae – wielewalen en vijgvogels**

Geslacht *Oriolus*, grootte 23 cm. 1 soort, Wielewaal



**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 2a en 2b  
Insecten- en vruchtenetende inheemse kooi- en volièrè vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolièrè met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièrè Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes in de volièrè, vlucht of nachthok.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volièrès en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièrè, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 40 x 40 x 50 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 50 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgescreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 2a t/m 2d.

Insecten- en vruchtenetende inheemse cultuurvogels worden gehouden in volièrès en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in kooien.

## **Huisvestingsadviezen.**

### **Clusters 2c en 2d**

#### **Insecten en vruchtenetende inheemse vogelsoorten.**

Tot deze groep behoren de aantoonbaar gehouden vogelsoorten die vallen onder artikel 1 van de Vogelrichtlijn (richtlijn 2009/147 EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009, inzake het behoud van de vogelstand)

In de avicultuur spreken we over Europese Cultuurvogels.

Het bijzondere aan deze groep is dat het geen zaadeters zijn.

Daarnaast zijn het geen kooivogels, maar moeten gerekend worden tot volièrevogels

Houderijrichtlijnen, inclusief Huisvestingsadviezen, zijn geschreven voor:

#### **Familie Panuridae – baardmannetje**

Geslacht Panurus, grootte 16,5 cm. 1 soort, Baardman

#### **Familie Paridae – echte mezen**

Geslacht Cyanistes, grootte 12 cm. 1 soort, Pimpelmees

Geslacht Parus, grootte 12 – 15 cm. 19 soorten. o.a. Zwarte mees, Kuifmees, Koolmees  
Matkop mees, Glanskopmees

#### **Familie Phylloscopidae – bos (loof) zangers**

Geslacht Phylloscopus, grootte 11 – 13 cm. 4 soorten. o.a. Fitis, Tjiftjaf, Fluiter

#### **Familie Prunellidae – heggenmussen**

Geslacht Prunella, 15 – 18 cm. 3 soorten, o.a. Alpen heggenmus, Heggenmus

#### **Familie Sittidae – boomklevers**

Geslacht Sitta, grootte 14 cm. 1 soort, Boomklever

#### **Familie Sturnidae – spreeuwen**

Geslacht Sturnus, grootte 19 – 22 cm. 15 soorten, o.a. Zwarte spreeuw, Spreeuw

#### **Familie Sylviidae – zangers van de oude wereld**

Geslacht Sylvia, grootte 13,5 – 14 cm. 8 soorten, o.a. Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus  
Braamsluiper

#### **Familie Troglodytidae – winterkoningen**

Geslacht Troglodytes, grootte 10 cm. 1 soort. Winterkoning

#### **Familie Turdidae – lijsters**

Geslacht Turdus, grootte 21 – 28 cm. 21 soorten. o.a. Koperwiek, Merel, Zanglijster,  
Beflijster, Grote lijster, Vale lijster

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 2c en 2d  
Insecten- en vruchtenetende inheemse kooi- en volière vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes in de volière, vlucht of nachthok.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 40 x 40 x 50 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 50 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 2a t/m 2d.

Insecten- en vruchtenetende inheemse cultuurvogels worden gehouden in volières en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in kooien.

## Huisvestingsadviezen.

### Cluster 3a

#### Zaadetende uitheemse vogelsoorten.

##### Familie Cardinalidae – kardinaal achtigen

Geslacht *Cardinalis*, grootte 20 – 22 cm. 3 soorten. o.a. Rode kardinaal

Geslacht *Cyanocampsa*, grootte 14 – 19 cm, 2 soorten. o.a. Blauwe bisschop

Geslacht *Passerina*, grootte 12 - 19 cm. 7 soorten. o.a. Nrd. Amerikaanse Blauwe Bisschop, Indigo vink.

Geslacht *Pheutiicus*, grootte 18 – 19 cm. 4 soorten. o.a. Rozenborst kernbijter

##### Huisvestingsmatrix voor vogels uit cluster 3a

#### Zaadetende uitheemse kooi- en volièrevogels.

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièrevogel Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Kooi 80 x 40 x 50 cm. Kooi 100 x 40 x 50 cm. Kooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Broedkooi 40 x 40 x 50 cm. Broedkooi 50 x 40 x 50 cm. Broedkooi 50 x 50 x 50 cm Of nestgelegenheid in vluchten, volièrevogels en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièrevogel, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 40 x 40 x 50 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 50 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 3a

In verband met het natuurlijk gedrag van inheemse cultuurvogels is gekozen voor een kooihoogte van 50 cm.

**Huisvestingsadviezen.  
Cluster 3a  
Zaadetende uitheemse vogelsoorten.**

**Familie Emberizidae – gorzen**

Geslacht *Coryphospingus*, grootte 13 – 14 cm. 1 soort. Rode kroonvink

Geslacht *Emberiza*, grootte 13,5 – 16 cm. 16 soorten o.a. Geelbuik ortolaan,  
Marokaanse huisgors

Geslacht *Melophus*, grootte 16 cm. 1 soort. Kuifgors

Geslacht *Tiaris*, grootte 9 -10 cm. 4 soorten. o.a. Kleine Cubavink

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièrè Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Kooi 80 x 40 x 40 cm. Kooi 100 x 40 x 50 cm. Kooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Broedkooi 40 x 40 x 40 cm. Broedkooi 50 x 40 x 50 cm. Broedkooi 50 x 50 x 50 cm Of nestgelegenheid in vluchten, volièrès en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièrè, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 40 x 40 x 40 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 50 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 3a.

**Huisvestingsadviezen.**  
**Clusters 3b, 3c, 3d, 3f, 3g.**  
**Zaadetende uitheemse vogelsoorten.**

**Familie Estrildidae – Afrikaanse prachtvinken**

Geslacht Amandava, grootte 9,5 – 11 cm. 3 soorten o.a. Tijgerastrilden

Geslacht Amadina, grootte 12,5 cm. 2 soorten o.a. Bandamadinen

Geslacht Estrilda, grootte 8 – 13,5 cm. 11 soorten o.a. Oranjekaakastrilde, Nonastrilde,  
Napoleonastrilde

Geslacht Euodice, grootte 11 cm. 2 soorten Zilverbekje, Loodbekje.

Geslacht Hypargos, grootte 12-13 cm. 1 soort Rode druppelastrilde

Geslacht Lagonostica, grootte 9,5 – 12 cm. 6 soorten Amaranten

Geslacht Mandingoa, grootte 11 cm. 2 soorten Druppelastrilden

Geslacht Nesocharis, grootte 10 cm. 1 soort Witwangastrilde

Geslacht Odontospiza, grootte 12 cm. 1 soort, Parelhalsamadine

Geslacht Ortygospiza, grootte 9 cm. 2 soorten. Patrijs- en Kwartelastrilde.

Geslacht Pyttila, grootte 11 – 13 cm. 3 soorten. Roodmaskerastrilde, Aurora astrilde.  
Roodvleugel roodmaskerastrilde.

Geslacht Spermester, grootte 9 – 12 cm. 4 soorten. Ekstertjes

Geslacht Spermophaga, 15 cm. 1 soort. Roodborstzaadkraker

Geslacht Stagonopleura, grootte 12 cm. 1 soort Diamandvink

Geslacht Uraeginthus, 12 – 15 cm. 5 soorten o.a. Blauwborstastrilde, Blauwkopastrilde

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 3b, 3c, 3d, 3f, 3g**  
**Zaadetende uitheemse kooi- en volière vogels.**  
**Afrikaanse Prachtvinken**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 9,5 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Kooi 100 x 40 x 40 cm. Kooi 100 x 40 x 50 cm. Kooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 9,5 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Broedkooi 50 x 40 x 40 cm. Broedkooi 50 x 40 x 50 cm. Broedkooi 50 x 50 x 50 cm Of nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 50 x 40 x 40 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 100 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 3b, 3c, 3d, 3f, en 3g.

**Huisvestingsadviezen.**  
**Clusters 3b, 3d,3f en 3g.**  
**Zaadetende uitheemse vogelsoorten.**

**Familie Estrildidae – Australische prachtvinken**

Geslacht *Cryptospiza*, grootte 12 cm. 2 soorten Bergastrilden.

Geslacht *Emblema*, grootte 11 cm. 1 soort. Geschilderde astrilde

Geslacht *Erythrura*, grootte 10,5 – 12 cm. 3 soorten Gouldamadine en Papegaaiamadinen

Geslacht *Neochmia*, grootte 10 – 14 cm. 4 soorten o.a. Ceresamqadine en Binsenastrilde.

Geslacht *Nigritta*, 11 – 14 cm. 2 soorten Bruinborstastrilde, Grijskopastrilde.

Geslacht *Poephila*, grootte 12 – 17 cm. 5 soorten o.a. Spitsstaartamadinen, Gordelgrasvink.

Geslacht *Stagonopleura*, 12 cm. 1 soort Diamantvink.

Geslacht *Taeniopygia*, grootte 8,5 – 14 cm. 4 soorten o.a. Zebravink , Bichenowastrilde.



**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 3b, 3d, 3f en 3g**  
**Zaadetende uitheemse kooi- en volière vogels.**  
**Prachtvinken**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 9,5 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Kooi 100 x 40 x 40 cm. Kooi 100 x 40 x 50 cm. Kooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 9,5 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Broedkooi 50 x 40 x 40 cm. Broedkooi 50 x 40 x 50 cm. Broedkooi 50 x 100 x 50 cm Of nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 50 x 40 x 40 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 100 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 3b, 3d, 3f, en 3g.

**Huisvestingsadviezen.**  
**Clusters 3e en 3f**  
**Zaadetende uitheemse vogelsoorten.**

**Familie Estrildidae –Overige prachtvinken**

Geslacht Lonchura, grootte 9.5 – 12 cm. 17 soorten. o.a. Rietvinken, Bronzemannen,  
, Muskaatvinken, Nonnen, Japanse meeuw/

Geslacht Padda, grootte 13,5 – 15 cm. 2 soorten Rijstvogels.



Voorbeeld van de beplanting van een volière voor Prachtvinken  
Foto: facebook Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 3e en 3f.  
Zaadetende uitheemse kooi- en volière vogels.  
Prachtvinken**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Jap. meeuwen Rijstvogels Bronzemannen Muskaatvinken, Nonnen, Rietvinken,	Vorbereiding broedseizoen	Kooi 100 x 40 x 40 cm. Kooi 120 x 50 x 50 cm. Kooi 100 x 50 x 50 cm Kooi 100 x 50 x 50 cm	
Jap. meeuwen Rijstvogels Bronzemannen Muskaatvinken, Nonnen, Rietvinken,	Broedseizoen	Broedkooi 50 x 40 x 40 cm. Broedkooi 60 x 50 x 50 cm. Broedkooi 50 x 50 x 50 cm Of nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel 1 koppel 1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
Jap. meeuwen Rijstvogels Bronzemannen Muskaatvinken, Nonnen, Rietvinken,	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 50 x 40 x 40 cm. Kooi 60 x 50 x 50 cm Kooi 50 x 50 x 50 cm	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 3e en 3f.

**Huisvestingsadviezen.  
Clusters 3h, 3i, 3j en 3k.  
Zaadetende uitheemse vogelsoorten.**

**Familie Fringillidae = vinkachtigen**

Geslacht *Carpodacus*, grootte 13 – 14 cm. 1 soort Mexicaanse Roodmus

Geslacht *Chloris*, grootte 14 cm. 1 soort Himalaya Groenling

Geslacht *Eophona*, grootte 20 cm. 1 soort Chinese appelvink

Geslacht *Mycerobas*, grootte 22 – 24 cm. 1 soort Affini appelvink

Geslacht *Pyrrhula*, grootte 15 cm. 1 soort Masker Goudvink

Geslacht *Serinus*, grootte 11 – 14 cm. 6 soorten o.a. Mozambique sijs en Kleurkanarie

Geslacht *Spinus*, grootte 9 – 14 cm. 11 soorten, Amerikaanse sizen

**Familie Passeridae = mussen**

Geslacht *Gymnoris*, grootte 15 – 16 cm. 1 soort geelgevlekte rotsmus

Geslacht *Passer*, grootte 11-16 cm. 6 soorten Mussen.

**Familie Ploceidae = wevers**

Geslacht *Euplectes*, grootte 13 – 16 cm. 3 soorten o.a. Vlammenwever

Geslacht *Ploceus*, grootte 13 – 17 cm. 2 soorten Kleine en grote textorwever

Geslacht *Quelea*, grootte 12 cm. 1 soort Zwartmasker roodbekwever

**Familie Thraupidae = zaadetende tangaren**

Geslacht *Oryzoborus*, grootte 13 – 17 cm. 2 soorten Dikbekvinken (Surinaamse zangvogels)

Geslacht *Paroaria*, grootte 18 – 18,5 cm. 1 soort Roodkuif kardinaal

Geslacht *Sicalis*, grootte 13 cm. 1 soort Pelzner saffraanvink

Geslacht *Sporophila*, grootte 10 – 13 cm. 8 soorten Surinaamse zangvogels

Geslacht *Volantina*, grootte 9 m. 1 soort Jacarrini vink

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 3h, 3i, 3j en 3k.  
Zaadetende uitheemse kooi- en volière vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Vluchtkooi 100 x 100 x 50 cm.	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding broedseizoen	Kooi 80 x 40 x 40 cm. Kooi 100 x 40 x 50 cm. In volière of vlucht	
Van 11 – 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm	Broedseizoen	Broedkooi 40 x 40 x 40 cm. Broedkooi 50 x 40 x 50 cm. Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
Van 11 - 14 cm Van 15 – 18 cm. Meer dan 18 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 40 x 40 x 40 cm. Kooi 50 x 40 x 50 cm Kooi 50 x 50 x 50 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 3h, 3i, 3j en 3k.

De soorten die behoren tot de families Fringillidae = vinken, Passeridae = mussen en Ploceidae = wevers worden bij voorkeur gehouden in volières of vluchten.

## Huisvestingsadviezen.

### Cluster 4a

#### Insecten en vruchtenetende uitheemse vogelsoorten.

Tot deze groep behoren de aantoonbaar gehouden vogelsoorten die we in de avicultuur Tropische Vogels noemen.

Het bijzondere aan deze groep is dat het geen zaadeters zijn.

Daarnaast zijn het geen kooivogels, maar moeten gerekend worden tot volièrevogels.

Houderijrichtlijnen, inclusief Huisvestingsrichtlijnen, zijn geschreven voor:

#### **Orde: Bucerotiformes**

##### **Familie Phoenicullidae = boomhoppen**

Geslacht Phoenicules, grootte 44 – 68 cm. 1 soort Roodsnavel boomhop

##### **Familie Upupidae = hoppen**

Geslacht Upupa, grootte 26 – 28 cm. 1 soort Hop

#### **Orde: Charadriiformes**

##### **Familie Charadriidae = plevieren**

Geslacht Chharadrius, grootte 4 – 15 cm. 1 soort Kleine Plevier

#### **Orde: Coliiformes**

##### **Familie Coliidae = muisvogels**

Geslacht Colius, grootte 30 – 40 cm. 1 soort Bruine muisvogel

#### **Orde: Coraciiformes**

##### **Familie Coraciidae = scharrelaars**

Geslacht Coracias, grootte 38 – 39 cm. 1 soort Vlagstaart scharrelaar

#### **Orde: Musophagiformes**

##### **Familie Musophagidae = toerako' s**

Geslacht Tauraco, grootte 40 – 43cm. 3 soorten o.a. Groenkuif toerako

#### **Orde Passeriformes**

##### **Familie Chloropseidae = bladvogels**

Geslacht Chlorosis, grootte 16 – 19 cm. 2 soorten Bladvogels

##### **Familie Cisticokidae = graszangers**

Geslacht Hypergerus, grootte 20 cm. 1 soort Wielewaal zanger.

##### **Familie Corvidae = kraaiachtigen**

Geslacht Urocissa, grootte 65 – 68 cm. 1 soort Roodsnavel Kitta.

##### **Familie Icteridae = troepialen**

Geslacht Xanthocephalus, grootte 24 – 27 cm. 1 soort Geelkop troepiaal

##### **Familie Irenidae = blauwruggen**

Geslacht Irena, vrootte 27 cm. 1 soort Irena buulbuul

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit cluster 4a**  
**Insecten- en vruchtenetende uitheemse kooi- en volièrè vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolièrè met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièrè Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrenge van nestkastjes of broedblokken in de volièrè, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volièrès en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièrè, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingsvolièrè	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 4a

Insecten- en vruchtenetende uitheemse vogels worden gehouden in volièrès en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in grote kooien.

## **Huisvestingsadviezen.**

### **Clusters 4b, 4c**

#### **Insecten en vruchtenetende uitheemse vogelsoorten.**

Tot deze groep behoren de aantoonbaar gehouden vogelsoorten die we in de avicultuur Tropische Vogels noemen.

Het bijzondere aan deze groep is dat het geen zaadeters zijn.

Daarnaast zijn het geen kooivogels, maar moeten gerekend worden tot volièrevogels.

Houderijrichtlijnen, inclusief Huisvestingsadviezen, zijn geschreven voor:

#### **Orde Passeriformes**

##### **Familie Leiotrichidae = gaailijsters**

Geslacht Garrulax, grootte 24 – 28 cm. 4 soorten o.a. Kastanjevleugel gaailijster

Geslacht Leiothrix, grootte 14 – 15 cm. 1 soort Japanse nachtegaal.

Geslacht Liocichla, grootte 17 – 20 cm. 1 soort Omei timalie

Geslacht Minta, grootte 14 cm. 1 soort Roodstaart minla

Geslacht Trochalopectera, grootte 28 cm. 1 soort Roodstaart gaailijster

##### **Familie Mimidae = spotlijsters**

Geslacht Minus, grootte 25 cm. 1 soort Grijs spotlijster

##### **Familie Muscicapidae = vliegenvangers**

Geslacht Copsychus, grootte 27 cm. 1 soort Shamalijster

Geslacht Cossypha, grootte 16 – 27 cm. 3 soorten o.a. Kaapse roodborsttapuit

Geslacht Monticola, grootte 23 – 25 cm. 1 soort Roodbuik rotslijster

##### **Familie Nectariniidae = honingzuigers**

Geslacht Nectarinia, grootte 12 – 25 cm. 2 soorten o.a. Emerald nektarvogel

##### **Familie Pachycephalidae = dikkoppen en fluiters**

Geslacht Pachycephala, grootte 16 – 18 cm. 1 soort Gouden fluits

##### **Familie Pellorneidae = timalies**

Geslacht Schoeniceps, grootte 11 cm. 1 soort Roodvleugel nontimalie

##### **Familie Platysteiridae = bosvogels in Afrika**

Geslacht Platysteira, grootte 12,5 cm. 1 soort Zwartkeel leloog vliegenvanger



**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 4b, 4c.  
Insecten- en vruchtenetende uitheemse kooi- en volièrè vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolièrè met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièrè Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volièrè, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volièrès en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièrè, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingsvolièrè	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 4b en 4c.

Insecten- en vruchtenetende uitheemse vogels worden gehouden in volièrès en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in grote kooien.

## **Huisvestingsadviezen.**

### **Clusters 4d, 4e en 4f.**

#### **Insecten en vruchtenetende uitheemse vogelsoorten.**

Tot deze groep behoren de aantoonbaar gehouden vogelsoorten die we in de avicultuur Tropische Vogels noemen.

Het bijzondere aan deze groep is dat het geen zaadeters zijn.

Daarnaast zijn het geen kooivogels, maar moeten gerekend worden tot volièrevogels.

Houderijrichtlijnen, inclusief Huisvestingsadviezen, zijn geschreven voor:

#### **Orde: Passeriformes**

##### **Familie Pycnonotidae = buulbuuls**

Geslacht Pycnonotus, grootte 17 – 20 cm. 4 soorten o.a. Kala buulbuul

Geslacht Spizixos, grootte 21 - 23 cm. 1 soort, Halsbandvinksnavel buulbuul

##### **Familie Sturnidae = spreeuwen**

Geslacht Acridotheres, grootte 23 – 26 cm. 2 soorten o.a. Treurmaina.

Geslacht Aplonis, grootte 19 – 20 cm. 1 soort Orpheus eilandspreeuw

Geslacht Cinnycinclus, grootte 19 cm. 1 soort Amethyst glansspreeuw.

Geslacht Lamprotoris, grootte 21 – 23 cm. 3 soorten o.a. Driekleur glansspreeuw

Geslacht Sturnus, grootte 20 – 30 cm. 2 soorten o.a. Pagode spreeuw

##### **Familie Sylviidae = zangers van de Oude wereld**

Geslacht Paradoxomis, grootte 16 – 20 cm. 1 soort Heudei diksnavelmees

##### **Familie Thraupidae = tangaren**

Geslacht Chlorophonia, grootte 10- 13 cm. 2 soorten o.a. Blauwnek rganist

Geslacht Cyanerpes, grootte 10 – 13 cm. 2 soorten o.a. Roodpoot honingzuiger

Geslacht Dacnis, grootte 11 – 13 cm. 2 soorten o.a. Blauwe pitpit

Geslacht Euphonia, grootte 11 – 14 cm. 2 soorten o.a. Cayenne organist

Geslacht Paroaria, grootte 16,5 – 18,5 cm. 2 soorten o.a. Roodkuifkardinaal

Geslacht Tachyphonus, grootte 18,5 cm. 1 soort Weduwe tangara

Geslacht Tangara, grootte 12 – 15 cm. 3 soorten o.a. Paradijs tangara

##### **Familie Timaliidae = timalies**

Geslacht Yuhina, grootte 14 cm. 1 soort Diadeem meestimalie

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 4d, 4e en 4f  
Insecten- en vruchtenetende uitheemse kooi- en volière vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volière, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingsvolière	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder clusters 4d, 4e en 4f

Insecten- en vruchtenetende uitheemse vogels worden gehouden in volières en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in grote kooien.

## **Huisvestingsadviezen.**

### **Cluster 4g.**

#### **Insecten en vruchtenetende uitheemse vogelsoorten.**

##### **Orde: Passeriformes**

##### **Familie Turdidae = lijsters**

Geslacht Turdus, grootte 23 – 29 cm. 4 soorten o.a. Kastanjelijster.

Geslacht Zoothera, grootte 23 cm. 1 soort Siberische lijster

##### **Familie Zosteropidae = brilvogels**

Geslacht Zosterops, grootte 10 – 11 cm. 2 soorten o.a. Ganges brilvogel

##### **Orde Piciformes**

##### **Familie Picidae = spechten en draaihalsen**

Geslacht Dendrocopus, grootte 16,5 cm. 1 soort Kleine bonte specht.

##### **Familie Ramphastidae = toekans**

Geslacht Andingina, grootte 51 cm. 1 soort Witwangbergtoekan

Geslacht Ramphastos, grootte 55 – 65 cm. 1 soort Reuzen toekan

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de cluster 4g.  
Insecten- en vruchtenetende uitheemse kooi- en volière vogels.**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volière, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 100 x 100 x 80 cm. of kleine volière	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi – of volière	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder cluster 4g.

Insecten- en vruchtenetende uitheemse vogels worden gehouden in volières en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in grote kooien, of in binnenhuis opgestelde kleine volières.

**Huisvestingsadviezen.  
Cluster 5a, 5b en 5c.  
Papegaaiachtigen**

**Orde Psittaciformes  
Familie Psittaculidae  
Subfamilie: Loriinae = Lori's**

**Subfamilie Loriinae**

Geslacht Chalcopsitta, grootte 29 – 31 cm. 5 soorten o.a. Zwarte Lori en Duivenbodes Lori

Geslacht Charmosyna, grootte 18 – 45 cm. 3 soorten o.a. Stella Lori en Roodflank Lori

Geslacht Eos, grootte 26 – 32 cm. 5 soorten o.a. Rode Lori, Violetnek Lori

Geslacht Glossopsitta, grootte 22 cm. 1 soort Muskuslori

Geslacht Lorius, grootte 26 – 31 cm. 6 soorten o.a. MolukkenLori en Zwartkop Lori.

Geslacht Neopsittacus, grootte 18 – 20 cm. 1 soort Emerald Lori

Geslacht Oreopsittacus, grootte 17 cm. 1 soort Arfak- of Berglori

Geslacht Phigys, grootte 20 cm. 1 soort Gekraagde Lori

Geslacht Pseudos, grootte 26 cm. 1 soort Witrug Lori

Geslacht Psitteuteles, grootte 20 cm. 2 soorten Viooltjeslori en Irislori

**Wigstaart lori's**

Geslacht Trichoglossus, grootte 23 – 30 cm. 8 soorten o.a. Lori van de Blauwe Bergen

## Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 5a, 5b en 5c.

### Lori's

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièr Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 120 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volièr, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volièr en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièr, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 120 x 100 x 80 cm. of kleine volièr	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi – of volièr	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de cluster 5a, 5b en 5c.

Lori's worden gehouden in volièr en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in grote kooien, of in binnenhuis opgestelde kleine volièr.

## Huisvestingsadviezen.

### Cluster 6a

### Papegaaiachtigen

### Orde Psittaciformes

### Familie Cacatuidae = kaketoos

Geslacht *Cacatua*, grootte 28 – 46 cm. 4 soorten o.a. Inca kaketoe, Kleine Geelkuifkaketoe

Geslacht *Eolophus*, grootte 30 – 35 cm. 1 soort Rosé kaketoe

### Huisvestingsmatrix voor vogels uit de cluster 6a

#### Kaketoos

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièrre Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 120 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volièrre, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volièrres en aangebouwde nachthokken.	1 koppel
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièrre, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 120 x 100 x 80 cm. of kleine volièrre	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi – of volièrre	1
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de cluster 6a.

Kaketoos worden gehouden in volièrres en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in grote kooien, of in binnenhuis opgestelde kleine volièrres.



**Huisvestingsadviezen.**  
**Cluster 6b**  
**Papegaaiachtigen**

**Orde Psittaciformes**  
**Familie Psittacidae = Agaporniden**

Geslacht Agapornis, grootte 13,5 – 17 cm. alle soorten

**Huisvestingsmatrix voor vogels uit de cluster 6b**  
**Agaporniden**

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièr Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 100 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volièr, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken. Of in een broedkooi van 80x40x40 cm.	
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièr, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	In kooien 80x40x40 cm.	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de cluster 6b.

Agaporniden worden gehouden in volières en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in kooien

**Huisvestingsadviezen.**  
**Clusters 6c, 6d, 6e**  
**Papegaaiachtigen**

**Orde Psittaciformes**  
**Familie Psittacidae = Echte papegaaien**

Geslacht Amazone, grootte 28 – 35 cm. 6 soorten o.a. Ecuador amazone, Finch amazone

Geslacht Ara, grootte 86 – 90 cm. 2 soorten Blauwgele ara, Groenvlegel ara

Geslacht Cyanoramphus, grootte 24 – 28 cm. 2 soorten, kakariki's

Geslacht Cyclopsitta, grootte 14 – 16 cm. 1 soort Dubbeloog vijgpapegaaai

Geslacht Diopsittaca, grootte 30 cm. 1 soort Hahn's dwergara

Geslacht Eclectus, grootte 31 – 38 cm. 1 soort Nw. Guinea edelpapegaaai

Geslacht Forpus, grootte 12,5 – 15 cm. 6 soorten o.a. Dwergpapegaaaien

Geslacht Pionites, grootte 23 cm. 3 soorten o.a. Caique's

Geslacht Pionus, grootte 28 – 29 cm. 2 soorten o.a. Bronsvleugel papegaaai

Geslacht Poiceophalus, grootte 21 – 30 cm. 5 soorten o.a. Bonte boertje, Kaapse papegaaai

Geslacht Primolius, grootte 30 cm. 1 soort Maracana ara.

Geslacht Psittaculirostris, grootte 18 cm. 4 soorten Vijgpapegaaaien

Geslacht Psittacus, grootte 40 cm. 1 soort Kongo Grijze Roodstaart

Geslacht Psittichas, grootte 46 cm. Borstelkoppapegaaai

Geslacht Tanygnathus, grootte 34 cm. 1 soort Muller's edelpapegaaai

Geslacht Ticlaria, grootte 28-29 cm. 1 soort Blauwbuikpapegaaai

## Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 6c, 6d en 6e Papegaaien

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièr Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 120 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrenge van nestkastjes of broedblokken in de volièr, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken. Forpus in broedkooien van bij voorkeur 80 x 40 x 40 cm.	
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièr, vlucht of vluchtkooi	
Vogels tot 23 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 120 x 100 x 80 cm. of kleine volièr	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi – of volièr	
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de clusters 6c, 6d en 6e

Papegaaien worden gehouden in volières en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de kleine vogels tot ca. 23 cm. ondergebracht in grote kooien,

De grote soorten in binnenhuis opgestelde kleine volières.

**Huisvestingsadviezen.  
Cluster 7a, 7b,7c,  
Papegaaiachtigen**

**Orde Psittaciformes  
Familie Psittacidae = Parkieten**

Geslacht Alisterus, grootte 36 – 42 cm. 2 soorten o.a. Koningsparkieten

Geslacht Aprosmictus, grootte 32 cm. 1 soort Roodvleugelparkiet

Geslacht Barnardus, grootte 33 – 38 cm. 2 soorten o.a. Port Lincoln parkiet

Geslacht Bolborhynchus, grootte 17 cm. 1 soort Catharina parkiet

Geslacht Brotogeris, grootte 16 – 23 cm. 5 soorten Tirica parkiet, Kobaltvleugel parkiet

Geslacht Cyanoliseus, grootte 43 -47 cm. 2 soorten o.a. Grote Patagonische rotsparkiet

Geslacht Eupsittula, grootte 24 – 26 cm. 2 soorten o.a. Mais parkiet, Goudvoorhoofd parkiet

Geslacht Guarouba, grootte 34 – 36 cm, 1 soort Goudparkiet

Geslacht Lathamus, grootte 25 cm. 1 soort Swiftparkiet

Geslacht Melopsittacus, 21 – 22 cm. 1 soort Grasparkiet

Geslacht Myiopsitta, grootte 29 – 30 cm. 1 soort Monniksparkiet

Geslacht Neophema, grootte 22 – 25 cm. 4 soorten o.a. Elegantparkiet, Splendid parkiet

Geslacht Neopsephotus, grootte 24 cm. 1 soort Bourke parkiet

Geslacht Northiella, grootte 29 cm. 2 soorten Redvented/Yellowvented Blue bonnet parkiet

Geslacht Nymphicus, grootte 34 cm. 1 soort Valkparkiet

Geslacht Platycercus, grootte 27 – 37 cm. 9 soorten Rosella's

Geslacht Polytelis, grootte 38 – 45 cm. 3 soorten o.a. prinses of Wales parkiet

## Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 7a, 7b en 7c. Parkieten

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volière Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 120 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volière, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken. Grasparkieten in broedkooien 60x40x40 of 80x40x40 cm.en Catharinaparkieten in bij voorkeur broedkooien van 80x40x40 cm.	
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volière, vlucht of vluchtkooi	
Vogels tot 24 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 120 x 40 x 50 cm. of kleine volière	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi – of volière	
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de clusters 7a, 7b, en 7c.

Parkieten worden gehouden in volières en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de kleine vogels tot ca. 24 cm. ondergebracht in grote kooien,

De grote soorten in binnenhuis opgestelde kleine volières.

**Huisvestingsadviezen.  
Cluster 7d en 7e.  
Papegaaiachtigen**

**Orde Psittaciformes  
Familie Psittacidae = Parkieten**

Geslacht Psephotus, grootte 27 cm. 1 soort Roodstuit parkiet

Geslacht Psephotellus, grootte 27 cm. 1 soort Hooded parkiet

Geslacht Psilopsiagon, grootte 18 – 20 cm. 2 soorten o.a. Aymara parkiet

Geslacht Psittacara, grootte 30 – 35 cm. 1 soort Ecuador aratinga

Geslacht Psittacula, grootte 42 – 56 cm. 2 soorten Halsbandparkiet en Grote Alexander

Geslacht Thectocercus, grootte 37 – 38 cm. 1 soort Blauwkop aratinga

Geslacht Pyrrhura, grootte 22 – 30 cm. 14 soorten o.a. Steenparkiet, Hoffman's parkiet

## Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 7d en 7e Parkieten

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièr Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 120 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volièr, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volières en aangebouwde nachthokken.	
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièr, vlucht of vluchtkooi	
Vogels tot 24 cm.	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 120 x 40 x 50 cm. of kleine volièr	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi – of volièr	
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de clusters 7d en 7e.

Parkieten worden gehouden in volières en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de kleine vogels tot ca. 24cm. ondergebracht in grote kooien,

De grote soorten in binnenhuis opgestelde kleine volières.

**Huisvestingsadviezen.**  
**Cluster 8a en 8b**  
**Duiven en tortels**

**Orde Columbiformes**  
**Familie Columbidae = duiven en tortels**

Geslacht Chacophaps, grootte 25 cm. 1 soort groenvleugelduif

Geslacht Columba, grootte 31 – 34 cm. 1 soort Rotsduif

Geslacht Columbina, grootte 15 – 17 cm. 2 soorten Peruduifje, Talpacoti duifje

Geslacht Ducula, grootte 35 – 42 cm. 2 soorten o.a. Witte Muskaatduif

Geslacht Gallicolumba, grootte 22 – 24 cm. 2 soorten o.a. Celebes grondduif

Geslacht Geopelia, grootte 20 – 24 cm. 2 soorten Diamantduif, vredesduifje

Geslacht Geophaps, grootte 19 – 23 cm. 1 soort Kuifduif

Geslacht Geotrygon, grootte 19 – 23 cm. 1 soort Kuifkwartelduif

Geslacht Goura, grootte 74 cm. 1 soort Victoria kroonduif

Geslacht Leptotila, grootte 25 cm. 1 soort Grijskopduif

Geslacht Metriopella, grootte 22 cm. Brilduifje

Geslacht Ocyphaps, grootte 31 – 35 cm. 1 soort Australische kuifduif

Geslacht Oena, grootte 25 cm. 1 soort Zwartmasker duifje

Geslacht Ptilinopus, grootte 24 cm. 3 soorten o.a. Karmjnkap jufferduif

Geslacht Spilopelia, grootte 26 cm. 1 soort Senegal tortel

Geslacht Streptopelia, grootte 28 cm. 1 soort Afrikaanse Lachduif

Geslacht Treron, grootte 21 – 30 cm. 3 soorten vruchrenduiven

Geslacht Turtur, grootte 20 – 25 cm. 5 soorten o.a. Staalvlekduifje

Geslacht Zenaida, grootte 28 – 30 cm. 1 soort Antiliaanse Treurduif



## Huisvestingsmatrix voor vogels uit de clusters 8a en 8b Duiven en tortels

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièr Binnen vlucht Inclusief broedblokken die ook gebruikt worden als slaapnesten Vluchtkooi 120 x 100 x 80 cm.	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrengen van nestkastjes of broedblokken in de volièr, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volièr en aangebouwde nachthokken.	
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièr, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 200x100x100 cm. of kleine volièr	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgeschreven Tentoonstellingskooi	
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de clusters 8a en 8b

Duiven en tortels worden gehouden in volièr en vluchten met, bij voorkeur, een aangebouwd nachthok.

Ter voorbereiding op de deelname aan een tijdelijke tentoonstelling worden de vogels ondergebracht in grote kooien of in binnenhuis opgestelde kleine volièr.

## **Huisvestingsadviezen.**

### **Cluster 9**

#### **Grondvogels**

#### **Orde Galliformes**

##### **Familie Ordontophoridae = kwartels van de Nieuwe Wereld.**

Geslacht Callipepla, grootte 25 cm. 1 soort Califormische kuifkwartel

Geslacht Colinus, grootte 25 cm. 1 soort Virginische boomkwartel

Geslacht Oreontyx, grootte 27 – 29 cm. 1 soort Bergkuifkwartel

##### **Familie Phasianidae = fazantachtigen**

Geslacht Cortunix, grootte 15 cm. 1 soort Harlekijnkwartel

Geslacht Perdicola, grootte 15 – 18 cm. 1 soort frankolijnkwartel

Geslacht Perdix, grootte 28 – 32 cm. 1 soort europese patrijs

Geslacht Rollulus, grootte 27 cm. 1 soort Roulroul

Geslacht Synoicus, grootte 12 cm. Chinese Dwergkwartel

#### **Orde Gruiformes**

##### **Familie Rallidae = rallen, koekoeken en waterhoenders**

Geslacht Crex, grootte 27 – 30 cm. 1 soort Kwartelkoning

#### **Orde Turniciformes**

##### **Familie Turnicidae = vechtkwartel**

Geslacht Turnix, grootte 15 – 18 cm. 1 soort geelpoot zwartborstvechtkwartel

## Huisvestingsmatrix voor vogels uit cluster 9 Grondvogels

Grootte van de vogel	Jaarcyclus	Huisvesting systeem	Aantal vogels
	Rustperiode	Buitenvolière met nachthok Buitenvlucht met nachthok Binnen volièrè Binnen vlucht	
	Vorbereiding broedseizoen	Het aanbrenge van afgedekte schuilplaatsen in de volièrè, vlucht of nachthok.	
	Broedseizoen	Nestgelegenheid in vluchten, volièrès en aangebouwde nachthokken.	
	Rustperiode Incl. ruiperiode	In volièrè, vlucht of vluchtkooi	
	Vorbereiding deelname aan evenementen	Kooi 120 x 40 x 60 cm. met bovenkant van canvasdoek of schuimplastic	
	Deelname aan tijdelijke evenementen	Voorgescreven Tentoonstellingskooi	
	Rustperiode	Zie start matrix	

Raadpleeg voor aanvullende huisvestingsadviezen de houderijrichtlijnen die zijn vermeld op de site van de NBvV onder de cluster 9

Grondvogels worden gehouden in volièrès en vluchten met, bij voorkeur, een droge ondergrond. Hun slaappleatsen zijn stevige takken boven in de volièrè.