

Standaard en herkenning omschrijvingen

Afrikaanse soorten.



Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Uitgave 2019

Inhoud opgave.

Inhoudsopgave

Inhoud opgave	2
Voorwoord 2019	4
BANDVINK, (AMANDAVA FASCIATA DOMESTICA)	5
Algemeen:	5
Ondersoorten:	5
Erfelijkheid en veerstructuur:	5
Fysieke standaard:	6
Tekeningpatroon:	6
Kleurstandaard Bandvink man:	7
Kleurstandaard Bandvink pop:	8
West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink: <i>Amadina fasciata alexanderie</i> :	12
ROODKOPAMADINE, (AMANDINA ERYTHROCEPHALA DOMESTICA)	14
Algemeen:	14
Ondersoorten:	14
Erfelijkheid en veerstructuur:	14
Fysieke standaard:	15
Tekeningpatroon:	15
Kleurstandaard Roodkopamadine man:	16
Kleurstandaard Geelkop roodkopamadine man:	17
Kleurstandaard Roodkopamadine pop:	18
Kleurstandaard Geelkop roodkopamadine pop:	18
Spermestes, de ekstertjes.	20
FYSIEKE STANDAARD EKSTERTJES:	21
Dwergkestertje, (<i>Lonchura nana</i>)	22
Wildkleur man en pop	22
Reuzenekstertje, (<i>Spermestes fringilloides</i>)	23
Wildkleur man en pop	23

Ekstertje, (<i>Spermestes c.cucullata</i>)	24
Wildkleur man en pop	24
Glanskestertje, (<i>Spermestes b. bicolor</i>)	25
Wildkleur man en pop	25
Zwartrugekstertje, (<i>Spermestes bicolor poensis</i>)	26
Wildkleur man en pop	26
Bruinrugekstertje, (<i>Spermestes bicolor nigriceps</i>)	27
Wildkleur man en pop	27
PYILLIA ASTRILDEN FAMILIE	28
Algemeen:	28
Aurora astrilde man:	29
Aurora astrilde pop:	29
Roodmasker astrilde man:	30
Roodmasker astrilde pop:	30
HERKENNING OMSCHRIJVING:	32
Roodmasker roodvleugel aurora astrilde man:	32
Roodmasker roodvleugel aurora astrilde pop:	32
HERKENNING OMSCHRIJVING:	34
Wiener astrilde man	34
Wiener astrilde pop	34
Melba astrilde man	34
Melba astrilde pop	34
URAEGINTHUS FAMILIE:	35
Algemeen:	35
Blauwfazantje roodwang	36
Blauwkop blauwfazantje	36
Angola blauwfazantje	36
Blauwkop blauwfazantje pastel	37
Blauwkop blauwfazantje Overgoten	37

Granaatastrilde man.....	38
Granaatastrilde pop.....	38
Purper granaatastrilde man.....	38
Purper granaatastrilde pop.....	38
LAGONOSTICA FAMILIE:	39
Senegal vuurvink man.....	40
Senegal vuurvink pop.....	40
Pracht amarant man.....	40
Pracht amarant pop.....	40
ESTRILDA FAMILIE:	41
Napoleonnetje.....	42
Sint-helenafazantje.....	42
Teugelastrilde.....	42
Elfenastrilde.....	42
Napoleonnetje.....	43
Sint-helenafazantje.....	43
Teugelastrilde.....	43
Elfenastrilde.....	43
Napoleonnetje.....	44
Sint-helenafazantje.....	44
Teugelastrilde.....	44
Elfenastrilde.....	44
Oranjekaakje.....	45
Zwartkap astrilde.....	45
Blauwgrijs roodstaartje.....	45
Blauwgrijs zwartstaartje.....	45
Abbessijnse astrilde.....	46
DE HYPARGOS FAMILIE:	47
Rode druppelastrilde man.....	48
Rode druppelastrilde pop.....	48
Bruine druppelastrilde man en pop.....	48

Voorwoord 2019

We hebben een aantal vogelsoorten die onderdeel uitmaakte van de standaardseisen Gedomesticeerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken verplaatst naar deze standaard. Dit betreft de ekstertjes, de bandvinken en de roodkopamadine.

De Roodkopamadine heeft inmiddels ook een grote mate van domesticatie ondergaan. De grijze en geelkop mutatie worden inmiddels regelmatig gekweekt.

Verder is het aangevuld met omschrijvingen van diverse veel tentoongestelde Afrikaanse soorten als herkenning richtlijn.

Deze standaard zal regelmatig aangevuld worden met eventuele mutaties van voornoemde soorten.

De Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten heeft dan ook besloten de Roodkopamadine op te nemen in deze standaard.

Utrecht voorjaar 2019

[Terug naar index](#)

Bandvink, (*Amadava fasciata domestica*)

Algemeen:

Wetenschappelijke naam:	<i>Amadina fasciata domestica</i>
Duits:	Bandfink.
Engels:	Cut-throat finch.
Frans :	Cou coupé.
Deens :	Båndfinke.
Italiaans:	Gola tagliata.

De bandvink leeft in de randgebieden van de woestijn, alsook in cultuurlandschappen. Ze zijn ook te vinden in de steppen in de directe nabijheid van mensen. In de broedtijd leven ze paarsgewijs. De nesten treffen we in struikgewas, hoge bomen of bouwwerken aan. Het nest heeft een bolvormige constructie van grashalmen en een korte buisvormige invliegopening. Buiten de broedtijd vormen ze grote groepen.

Ondersoorten:

Van de bandvink worden naast de nominaatvorm ,*Amadina fuscata fuscata* drie ondersoorten erkend:

- *Amadina fasciata fasciata*: Verspreidingsgebied Afrika; als een smalle streep van Senegal door Gambia, oost Somalië tot in zuid afrika.
- *Amadina fasciata alexanderie* Verspreidingsgebied; Djiboeti door oostelijk Ethiopië en Somalië tot noord Mozambique. Is bruiner van kleur en een intensievere golflijntekening. Ook de borst en buik zijn bruiner van tint dan de nominaatvorm.
- *Amadina fasciata meridionalis*: Verspreidingsgebied zuidelijk van Malawi en in zuid Rhodesië. Deze vogels hebben een zware en dieper gekleurde tekening dan de nominaatvorm. De boven- en onderstaart zijn zwartgrijs.
- *Amadina fasciata contigua* Wordt in de huidige literatuur niet meer gezien als zelfstandige ondersoort.

Erfelijkheid en veerstructuur:

In de bevedering van de bandvink is, naast het eumelanine en het phaeomelanine, ook rood carotenoïde te vinden.

Voor een diepgaande bijschrijving de verschillende mutaties bij de bandvink wordt naar de mutatiestandaard prachtvinken verwezen.. Bij de bandvink zijn de volgende mutaties bekend:

- | | |
|------------------|---|
| Bruin: | Is in de afgelopen decennia diverse keren vanuit wildvang voor de kweek beschikbaar gekomen, het laatst in 2006. |
| Opaal: | Is ontstaan in eind 20 ^{ste} eeuw. Een van de eerste kwekers was de Belg Paul d'Hamer. |
| Isabel: | Is begin jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd vanuit wildvang en waarschijnlijk niet meer beschikbaar. Wordt in deze standaard dan ook niet beschreven. |
| Pastel: | Is een mutatie die mogelijk is meegekomen met opaal mutatie. |
| Geelband: | In 1976 ontstaan. Een van de eerste kweekpogingen door A. van Mingeroet uit België. . Door een kwalitatieve reductie van het rode carotenoïde, in de praktijk blijkt dat deze mutatie autosomaal recessief te vererven. Het symbool voor deze factor = ge |
| NSL ino: | Is ontstaan 1992 bij de heer H.v.Waardenburg uit Neede. |
| Grijs: | Is zeer experimenteel in Nederland aanwezig en vindt begin 21 ^{ste} eeuw zijn oorsprong en Tsjechië. |

[Terug naar index](#)

Fysieke standaard:

Formaat:

De gedomesticeerde bandvink is ± 12,5 cm. Lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De bandvink is een volslanke, maar geen zwaar geblokte vogel. Van opzij gezien moet de borst-/buiklijn, vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren, van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken, dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De niet overdreven ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal t.o.v. de schedel. De staart is aan het uiteinde afgerond.

Houding:

Een bandvink dient rustig op stok te zitten. Hij hoort rechtop te zitten en het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

2,7 mm.

Snavel:

Relatief en kegelvormig snaveltje. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn. De bovensnavel mag niet overdreven hoog en rond zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningspatroon:

De tekening onderdelen van de gedomesticeerde wildkleur bandvink zijn:

- **Keelband:** Een helder rode keelband van minimaal 7 mm breed, welke onder de snavel iets minder breed is dan de zijkanten. De rode keelband loopt op de wangen iets omhoog en is aan de uiteinden, die duidelijk achter het oog zijn gesitueerd, afgerond. De keelband raakt aan de bovenzijde het oog en de onder snavel niet.. De pop mist deze rode keelband.
- **Keelbandstrepen:** Aan beide uiteinde aan de onderzijde van de keelband bevinden zich de aanzet van twee zwarte keelbandstrepen. Deze keelbandstrepen zijn aan de nekkant breder en lopen richting keel fijn uit . De keelbandstrepen zijn scherp van aftekening en helder zwart van kleur. De pop mist deze zwarte keelbandstrepen. Omdat dit een vooralsnog moeilijk te realiseren tekeningonderdeel betreft wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen.
- **Schedel-, nek- en manteltekening:** Vanaf de bovensnavel, richting schedel en nek, heeft iedere veer een zwarte dwarstekening met aan het uiteinde een crèmewitte punt. Richting bovenschedel is deze tekening fijner dan in het midden op de kop. Deze tekening sluit op de wangen aan op de keelband en wordt richting zadel weer iets fijner.
- **Vleugeldekkening:** De grote- en middelste vleugeldekveren tonen voor het uiteinde een duidelijk zwartbruine zoom. Aan het uiteinde van iedere dekveer bevindt zich een crèmebruine top, die duidelijk lichter is dan de mantel en de basis van de vleugeldekveren. Hierdoor toont het vleugeldek twee regelmatig gebogen zwartbruin-crèmebruine vleugelbanden
- **Omzoming binnenste vleugelpennen:** De buitenvlag van iedere vleugelpen toont een bruine omzoming.
- **Tekening bovenstaartdek:** Deze is overeenkomstig de kop en manteltekening maar is iets grover van patroon.
- **Staarttekening:** Op de onderzijde tonen de staartpennen aan het uiteinde een crème-wit gekleurde top, met witte punten. De 2 middelste staartpennen missen deze. Dwz dat de bovenzijde van de staart in gesloten toestand egaal zwartgrijs is en aan de onderzijde een crème-witte top toont.
- **Buikvlek:** Op de buik en onderbuik bevindt zich een zo uitgebreid mogelijk regelmatig afgetekende kastanjebruine vlek. De overgang van de buikvlek naar de flanken en borst wordt gevormd door een crème band, waarop zich een fijne zwartgrijze gebogen dwarstekening bevindt. De pop mist deze buikvlek.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Bandvink man:

Kleurslag:	Wildkleur man:	Bruin man:	Grijs man:	NSL ino man:	Opaal man:	Pastel man:
Kleur:						
Schedel.	Beigebruin.	Beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Beige.
Keel.	Crème-wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Crème, afgescheiden door de keelband en de ondersnavel.	Wit, afgescheiden door de keelband en de ondersnavel.	Wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Wit, met beige waas, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Beigewit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.
Nek.	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas,	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel,
Borst en Flanken	Van af de keelband donker beigebruin.	Van af de keelband donker beigebruin.	Van af de keelband crème-wit.	Van af de keelband wit.	Van af de keelband wit, met beige waas,	Van af de keelband donkerbeige.
Dijen en aarsstreek.	Crème-wit met een beige waas.	Crème-wit, met een beige waas.		Wit.	Wit, met beige waas,	Donkerbeige.
Rugdek/ mantel.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Stuit en bovenstaartdekveren.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Kleine vleugeldekveren en schouders.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas,	Donkerbeige.
Staart bovenzijde.	Zwartgrijs.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Grijs,	Donkergrijs, met een lichter veerhart.
Staart onderzijde.	Zeer donkergrijs.	Zeer donker beigebruin.	Zeer donkergrijs.	Wit.	Lichtgrijs,	Grijs.
Onderstaartdekveren.	Licht beigebruin.	Licht beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Lichtgrijs.
Poten.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Nagels.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Snavel.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen /Pupil.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Helderrood.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.
Tekeningskleur:						
Keelband.	Diep helderrood.	Diep helderrood.	Diep helderrood.	Diep helderrood.	Diep helderrood.	Diep helderrood.
Keelbandstrepen.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Schedel-, dek- en manteltekening.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Vleugeldektekening.	Zwart – crèmebruin.	Zwartbruin – crèmebruin	Zwartgrijs – crème-wit.	Wit.	Licht grijs – wit.	Grijs – crèmebeige.
Omzoming vleugelpennen.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Onderzijde staart.	Crème-wit.	Crème-wit.	Crème-wit.	Wit.	Wit.	Crème-wit.
Buikvlek.	Kastanjebruin.	Kastanjebruin.	Lichtcrème.	Wit.	Lichtcrème.	Licht kastanjebruin.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Bandvink pop:

Kleurslag:	Wildkleur pop:	Bruin pop:	Grijs pop:	NSL ino pop:	Opaal pop:	Pastel pop:
Kleur:						
Schedel.	Beigebruin.	Beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Beige.
Wangen en hals.	Beigebruin.	Beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Beige.
Keel.	Onder de ondersnavel crème, overgaand in beigebruin.	Onder de ondersnavel crème, overgaand in beigebruin.	Onder de ondersnavel crème, overgaand in crème-wit.	Wit.	Onder de ondersnavel crème, overgaand in wit met beige waas,	Onder de ondersnavel crème, overgaand in beige.
Nek.	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Beigebruin. Iets donkerder dan de schedel.
Borst en Flanken.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Buik.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Dijen en aarsstreek.	Crème-wit, met een beige waas.	Crème-wit, met een beige waas.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Rugdek/ mantel.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Stuit en bovenstaartdekveren.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Kleine vleugeldekveren en schouders.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Staart bovenzijde.	Zwartgrijs.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Grijs.	Donkerbeige, met een lichter veerhart.
Staart onderzijde.	Zeer donkergrijs.	Zeer donker beigebruin.	Zeer donkergrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Onderstaartdekveren.	Licht beigebruin.	Licht beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Lichtgrijs.
Poten.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Nagels.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Snavel.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen /Pupil.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Helderrood.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.
Tekeningskleur:						
Keelband.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.
Keelbandstrepen.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.	Ontbreekt.
Schedel-, dek- en manteltekening.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Vleugeldektekening.	Zwart – crèmebruin	Zwartbruin – crème bruin.	Zwartgrijs – crème-wit.	Wit.	Lichtgrijs – wit.	Grijs - crèmebeige.
Omzoming vleugelpennen..	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Onderstaarttekening.	Crème-wit.	Crème-wit.	Crème-wit.	Wit.	Wit.	Crème-wit.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Bandvink man en pop

Wildkleur:	<p>De standaardomschrijvingen van kleur en tekening betekenen, dat in de selectieve kweek, die ondermeer door Nederlandse kwekers is doorgevoerd, de meest in het oog springende onderdelen van de nominaatvorm A.f.f. en de ondersoorten A.f.a. en A.f.m. zijn samen gevoegd.</p> <p>In het verleden toonden veel ingevoerde bandvinken een relatief platte kop in combinatie met een sterk gebolde hoge bovensnavel. De domesticatie heeft ook bij de bandvink inmiddels tot een meer ronde kop en daarbij horende kegelvormige snavel gevormd. Tijdens de keuring dient hier goed op gelet te worden. Vogels met een platte kop en sterk gebogen hoge snavel dienen, al naar gelang de ernst van de fout, bestraft te worden.</p> <p>Veel invoer vogels tonen op de borst en flanken en bij de poppen ook op de buik, een fijne zeer onregelmatige zoomtekening. Door selectie is deze zoom tekening uitgeselecteerd. De voorkeur gaat dan ook uit naar de meest egaal donker beigebruin gekleurde borst buik en flanken. Hiermee wordt duidelijk gekozen voor een domestica vorm. Dit in afwijking tot de enige beschreven ondersoort de Amadina fasciata alexanderie, die juist op deze plaatsen een omzoming blijft tonen.</p> <p>De algemene beigebruine lichaamskleur dient zo diep en donker mogelijk te zijn. Vooralsnog zal het tonen van twee volledig zwarte scherp afgetekende keelbandstrepen een moeilijk te realiseren onderdeel zijn. Dit dient dan ook met de nodige souplesse beoordeeld te worden. Bij de man mag niet verwacht worden dat de keelbandstrepen elkaar raken. Wel moet gestreefd worden dat deze duidelijk egaal en strak afgelijnd aanwezig zijn. Onder keel band bevindt zich vaak nog een smalle lichte crèmekleurige band. Vogels die deze band niet tonen hebben de voorkeur, het tonen van deze band moet al naar gelang de ernst van de fout bestraft worden bij kleur. De kastanjebruine buikvlek bij de man dient intens van kleur en zo uitgebreid mogelijk te zijn. De overgang van borst en flanken enerzijds en de buikvlek anderzijds, mag geen lichte crème witte zone tonen, vooralsnog dient dit echter met enige souplesse beoordeeld te worden. De pop mag geen buikvlek of restanten daarvan tonen. Indien dit wel het geval is moet het bestraft worden bij kleur. De bandvink is een vogel die vaak snel groeiende nagels toont. Er dient streng op gelet te worden dat deze niet lang, gekruld of verkalkt zijn.</p>
Bruin:	<p>In algemene zin wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. De meest kenmerkende verandering, die de bruinmutatie te weeg brengt, is bij de bandvink gelegen in het feit, dat het zwarte eumelanine bezit voor een overgroot deel in de zoomtekening en in de staartpennen is waar te nemen. Deze tekening en de staartpennen zullen dan ook duidelijk zwartbruin van kleur moeten worden. Bij zeer diep gekleurde exemplaren zal dit ten koste gaan van het contrast van kleur en tekening. De bruine bandvink mag echter geen "egaal" gekleurde vogel worden. Om het onderscheid met pastel mutatie (die zich nog in een pril stadium bevindt) goed te kunnen zien, is het van belang dat de staartpennen bruin zijn en zeer egaal van kleuropbouw.</p>
Grijs:	<p>Ook bij de grijsmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Of er hier spraken is van een echte grijsmutatie is op dit moment nog een open vraag. Wel zijn de eerste exemplaren beschikbaar, waarvan de kastanjebruine (phaeomelanine) buikvlek volledig ontbreekt bij de mannen. Vooralsnog is gekozen om in ieder geval selectief de keus te maken voor een grijze kleurslag. Dit wil zeggen, dat op dit moment nog enige bruine aanslag in de grondkleur aanwezig zal zijn. Deze aanslag zal door verdere kweekselectie uitgeselecteerd moeten worden. Tijdens de keuring dient men er op dit moment nog soepel mee om te gaan. Dit laat echter onverlet, dat de bandvink met de minste bruin aanslag de voorkeur geniet.</p>
NSL ino:	<p>In algemene zin wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Daar de ino mutatie bij de bandvink gelegen is op het autosomaal chromosoom staat vast, dat ook het bruine eumelanine door de mutatie volledig gereduceerd wordt. We kunnen hier dus spreken van een volledig witte vogel, met enkel een helder rode keel band bij de mannen. Iedere pigmentaanslag in het verenkleed moet als fout beoordeeld worden. De ino moet van onberispelijke veerwaliteit zijn om voor hoge punten in aanmerking te kunnen komen.</p>
Opaal:	<p>Natuurlijk gelden de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm ook voor de opaalmutatie. Op dit moment toont de opaal vogel nog steeds enige bruine aanslag. Kweekselectie zal uiteindelijk kunnen leiden tot vogels in zuiver grijs nuances. Als totaalbeeld wordt hierbij verwezen naar de loodbek. Ook hier is inmiddels een fraai op grijstinten gebaseerd uiterlijk gerealiseerd.</p>
Pastel:	<p>Natuurlijk gelden de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm ook voor de pastelmутatie. De basis van de pastelmутatie is nog erg onduidelijk. Het vermoeden is, dat een seks-linked mutatie is. De vogels lijken vrij veel op de bruinmutatie, echter de zoomtekening bezit nog een aandeel zwart eumelanine en de staartpennen zijn grijs met een duidelijk minder diep gekleurd veerhart.</p>

Kleurslag:	Geelband wildkleur man:	Geelband bruin man:	Geelband grijs man:	Geelband NSL ino man:	Geelband opaal man:	Geelband pastel man:
Kleur:						
Schedel.	Beigebruin.	Beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas,	Beige.
Keel.	Crème-wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Crème, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Wit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Wit, met beige waas, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Beigewit, afgescheiden door de keelband en ondersnavel.
Nek.	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Beigebruin, iets donkerder dan de schedel.
Borst en Flanken	Van af de keelband donker beigebruin.	Van af de keelband donker beigebruin.	Van af de keelband crème-wit.	Van af de keelband wit.	Van af de keelband wit, met beige waas,	Van af de keelband donkerbeige.
Dijen en aarsstreek.	Crème-wit, met een beige waas.	Crème-wit, met een beige waas.		Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Rugdek/ mantel.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Stuit en bovenstaartdekveren.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Kleine vleugeldekveren en schouders.	Donker beigebruin.	Donker beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Donkerbeige.
Staart bovenzijde.	Zwartgrijs.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Grijs.	Donkergrijs, met een lichter veerhart.
Staart onderzijde.	Zeer donkergrijs.	Zeer donker beigebruin.	Zeer donkergrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Onderstaartdekveren.	Licht beigebruin.	Licht beigebruin.	Crème-wit.	Wit.	Wit, met beige waas.	Lichtgrijs.
Poten.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Nagels.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Snavel.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen /Pupil.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Helderrood.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.
Tekeningskleur:						
Keelband.	Diep warmgeel.	Diep warmgeel.	Diep warmgeel.	Diep warmgeel.	Diep warmgeel.	Diep warmgeel.
Keelbandstrepen.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Schedel-, dek- en manteltekening.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Vleugeldektekening.	Zwart – crèmebruin.	Zwartbruin – crèmebruin	Zwartgrijs – crème-wit.	Wit.	Lichtgrijs – wit.	Grijs – crèmebeige.
Omzoming vleugelpennen.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwartgrijs.	Wit.	Lichtgrijs.	Grijs.
Staarttekening onderzijde.	Crème-wit.	Crème-wit.	Crème-wit.	Wit.	Wit.	Crème-wit.
Buikvlek.	Kastanjebruin.	Kastanjebruin.	Lichtcrème.	Wit.	Lichtcrème.	Licht kastanjebruin.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Geelband bandvink man en pop.

Geelband :	<p>Ook bij de geelband bandvink wordt verwezen naar de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Specifiek voor de geelband is enkel de kleur van de keelband van de man. Geelband poppen worden niet beschreven, omdat deze niet als zodanig herkenbaar zijn en dus niet afwijken van de "roodband" poppen. De kleur van de gele band kent een behoorlijke variatiebreedte en wordt voor een deel ondersteund door het onderliggende bruine melanine, wat de bandkleur een warm, bijna goudgeel uiterlijk geeft. Een lichtere bandkleur komt zeker voor, echter de voorkeur gaat uit naar een diep warm gele bandkleur.</p> <p>Door een kwalitatieve reductie van het rode carotenoïde ontstaat de geelband mutatie. In de praktijk blijkt deze mutatie autosomaal recessief te vererven. Het symbool voor deze factor =ge.</p>
-------------------	--

[Terug naar index](#)

West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink: *Amadina fasciata alexanderie*:

Kleurslag:	Wildkleur man:	Wildkleur pop:
Kleur:		
Schedel.	Lichtbeige.	Lichtbeige.
Wangen en hals.	Nvt.	Lichtbeige.
Keel.	Crème-wit afgescheiden door de keelband en ondersnavel.	Onder de ondersnavel crème-wit overgaand in beige.
Nek.	Beige. iets donkerder dan de schedel.	Beige, iets donkerder dan de schedel.
Borst en flanken.	Beige.	Beige.
Buik.	Nvt.	Beige.
Dijen en aarsstreek.	Crème-wit, met een beige waas.	Crème-wit, met een beige waas.
Rugdek/ mantel.	Beige.	Beige.
Stuit en bovenstaartdekveren.	Beige.	Beige.
Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Beige.	Beige.
Kleine vleugeldekveren en schouders.	Beige.	Beige.
Staart bovenzijde.	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Staart onderzijde.	Zeer donkergrijs.	Zeer donkergrijs.
Onderstaartdekveren.	Lichtbeige.	Lichtbeige.
Poten.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Nagels.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Snavel.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen /Pupil.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.	Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand.
Tekening kleur:		
Keelband.	Diep helderrood.	Ontbreekt.
Keelbandstrepen.	Zwart.	Ontbreekt.
Schedel-, dek- en manteltekening, borst, flanken en bij de pop tevens buik	Zwart, wat prominenter dan bij de domestica vorm.	Zwart, wat prominenter dan bij de domestica vorm.
Vleugeldektekening.	Zwart – crèmebruin.	Zwart – crèmebruin.
Omzoming vleugelpennen.	Zwart.	Zwart.
Staarttekening onderzijde.	Crème-wit.	Crème-wit.
Buikvlek.	Kastanjebruin.	Ontbreekt.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink, man en pop.

Wildkleur:	Als enige ondersoort toont de West-Afrikaanse bandvink, de <i>Amandina fasciata</i> Alexanderie kenmerkende verschillen met de <i>domestica</i> vorm. Een aparte beschrijving in deze standaard is dan ook op zijn plaats. In algemene zin kan voor de fysieke keurtechnische aanwijzingen verwezen worden naar de <i>domestica</i> vorm. Wat tekening betreft, is de zoomtekening in het algemeen over het gehele lichaam prominenter dan bij de <i>domestica</i> vorm en is ook aanwezig op de borst en flanken bij de man en de borst buik en flanken bij de pop. De bruin nuances zijn lichter dan bij de <i>domestica</i> vorm en blijven steken in een beige kleur. Van de West-Afrikaanse bandvink wordt enkel de wildvorm beschreven. Kleurslagen worden (voorlopig) alleen in de <i>domestica</i> vorm gevraagd. De West-Afrikaanse bandvink wordt ook wel Alexanderbandvink genoemd.
-------------------	--

[Terug naar index](#)

Roodkopamadine, (*Amandina erythrocephala domestica*)

Algemeen:

Wetenschappelijke naam:	<i>Amandina erythrocephala domestica</i>
Duits:	Rotkopamadine
Engels:	Red-headed finch, paradise finch.
Frans :	L'amadine á tette rouge.
Italiaans:	L'amadina testarossa
Spaans:	Le estrilda cabecirroja.

De roodkopamadine leeft als een van de weinige prachtvinken in het semi – woestijngebied van zuidelijk Afrika. Wel zorgt de soort ervoor altijd in de buurt van water te zijn. De roodkopamadine komt voor in de rand Kalahari woestijn in Botswana en in droge zandige steppen met zeer incidenteel boom en struik groepen. In de Kalahari worden soms groepen roodkopamadines waargenomen in de nabijheid van drinkplaatsen, Deze groepen omvatten niet zelden enkele honderden vogels. In het resterende verspreidingsgebied kiest de roodkopamadine voor iets dichter begroeide bomen- struiken en steppen. Vaak komen de roodkopamadine voor op akkers. Tegenover de mens is de roodkopamadine schuw.

Ondersoorten:

Van de roodkopamadine wordt naast de nominaatvorm , *Amandina erythrophale* een ondersoort erkend:

1. *Amandina erythrophale*.
Het verspreidingsgebied strekt zich uit in Angola, Zimbabwe en Zuid-Afrika.
- 2 *Amandina e. dissita*
Het verspreidingsgebied is: de Kaapprovincie en Zuid-Natal. De ondersoort verschilt slecht zeer gering van de nominaatvorm en wordt niet altijd al zodanig apart genoemd.

In deze standaard wordt van de domestica vorm uitgegaan omdat in avicultuur de vertegenwoordiger van nominaat- en ondersoort met zekerheid vermengd zijn geraakt.

Erfelijkheid en veerstructuur:

In de bevedering van de roodkopamadine is, naast het eumelanine en het phaeomelanine, ook rood carotenoïde te vinden.

Voor een diepgaande bijschrijving van de verschillende mutaties bij de roodkopamadine wordt naar de mutatiestandaard gedomesticeerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken verwezen. Bij de roodkopamadine zijn de volgende mutaties bekend:

- Bruin:** Op experimentele schaal wordt op dit moment geprobeerd de bruin mutatie van de bandvink over te kweken naar de roodkopamadine.
- Opaal:** Op experimentele schaal is geprobeerd de opaal mutatie van de bandvink naar de roodkopamadine over te kweken dit heeft tot op heden zover bekend niet geleid tot een stam opaal roodkopamadinen.
- Geelkop:** Begin deze eeuw is de geelkop mutatie geïntroduceerd door hybride kweek met de bandvink. Door de heer Jansen uit Nijmegen is de laatste jaren hier een relatief stabiele stam mee opgebouwd.
- Grijs:** Nadat eerder al in de provincie Overijssel een grijze roodkopamadine was gesignaleerd werd door de heer Jansen uit Nijmegen in een handelaar partij enkele grijs gekleurde roodkopamadinen aangetroffen. De heer Jansen heeft met deze vogels een stabiele stam vastgelegd.

[Terug naar index](#)

Fysieke standaard:

Formaat:

De gedomesticeerde roodkopamadine is \pm 13,5 cm. Lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De roodkopamadine is een robuuste, geblokte vogel. Van opzij gezien moet de borst-buiklijn, vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren, van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken, dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De niet overdreven ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal t.o.v. de schedel. De staart is aan het uiteinde afgerond.

Houding:

Een roodkop dient rustig op stok te zitten. Hij hoort rechtop te zitten en het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

2,7 mm.

Snavel:

Relatief kort en kegelvormig snaveltje. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar aan te sluiten en moeten onbeschadigd zijn. De bovensnavel mag niet overdreven hoog en rond zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningspatroon:

De tekeningsonderdelen van de gedomesticeerde wildkleur roodkopamadine zijn:

- **Koptekening:**

De koptekening van de roodkopamadine man beslaat de hele kop. Aan de onderzijde is de koptekening scherp afgescheiden van de rest van het lichaam deze kleurscheiding loopt van de onderzijde van de keel onderlangs de wangen en rond de nek. Bij de wildkleur is deze tekening egaal donkerrood alleen de bevedering van de oogteugel is wat minder intens van kleur deze is meer grijs van kleur. De pop mist deze koptekening de kleur van de teugel is gelijk aan de kopkleur.

- **Vleugeldekkening:**

Aan de toppen van de middelste en grote vleugeldekveren bevindt zich een lichte uiteinde vooraf gegaan door een donkere dwarsband. Wanneer de roodkopamadine in goede conditie is vormen deze lichte veertoppen twee regelmatig gebogen lijnen op het vleugeldek. De kleine armpennen laten deze zelfde lichte veertoppen zien.

- **Tekening bovenstaartdek:**

Iedere veer van het bovenstaart dek heeft aan het uiteinde een donkere dwarsstreep met aan de top van de veer een lichte punt.

- **Borst-, buik-, en flanktekening:**

Direct onder de koptekening begint op de borst de opvallendste tekening die zich uitstrekt over de gehele borst-, buik en flanken. Iedere veer heeft hierbij een lichte gekleurd druppelvormig uiteinde welke is voorzien van een smalle donkere zoom aan de top van de veer. Op de borst waar de veren kleiner en korter zijn is deze tekening minder prominent dan midden op de buik en op de flanken waar de veren groter zijn. Ter hoogte van de aars vervaagt deze tekening. Bij de pop ontbreekt de lichte druppelvormige top De smalle donker zoom is bij de pop veel lichter van kleur

- **Tekening onderstaartdek:**

Iedere veer op het onderstaartdek heeft aan het uiteinde een donkere dwarsstreep.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Roodkopamadine man:

Kleurslag:	Wildkleur man:	Bruin man:	Grijs man:
Kleur:			
Rugdek/ mantel.	Egaal grijs met een minimale bruine waas.	Egaal bruin met een minimale bruingrijsachtige waas.	Egaal licht zilvergrijs
Stuit en bovenstaartdekveren.	Egaal grijs met een bruine waas	Egaal bruin	Egaal licht zilvergrijs
Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas	Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas	Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.
Kleine vleugeldekveren en schouders.	Egaal grijs iets donkerder dan de mantel	Egaal bruin iets donkerder dan de mantel	Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel
Staart bovenzijde.	Donkergrijs	Zwartbruin	Donkergrijs
Borst, buik en Flanken	Licht kastanjebruin	Licht kastanjebruin	Lichtgrijs
Dijen en aarsstreek.	Crème	Crème	Grijswit
Onderstaartdekveren.	Crème	Crème	Grijswit
Staart onderzijde.	Donkergrijs	Zwartbruin	Donkergrijs
Poten.	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Nagels.	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Snavel.	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Ogen /Pupil.	Zwart	Zwartbruin	Zwart
Tekening kleur:			
Koptekening.	Egaal donkerrood	Egaal bruinrood	Egaal donkerrood
Teugel.	Grijs.	Bruin	Grijs.
Vleugeldekkening.	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top	Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top	Donkergrijze dwarsband met witte top
Tekening bovenstaart dek	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top	Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top	Donkergrijze dwarsband met witte top
Borst buik en flanktekening.	Lichtgrijze zoom	Licht bruine zoom	Lichtgrijze zoom
Tekening onderstaartdek	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top	Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top	Donkergrijze dwarsband met witte top
Stuittekening	Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening	Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening	Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Geelkop roodkopamadine man:

Kleurslag:	Geelkop wildkleur man:	Geelkop bruin man:	Geelkop grijs man
Kleur:			
Rugdek/ mantel.	Egaal grijs met een minimale bruine waas.	Egaal bruin met een minimale bruine waas.	Egaal licht zilvergrijs
Stuit en bovenstaartdekveren.	Egaal grijs met een bruine waas	Egaal bruin	Egaal licht zilvergrijs
Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas	Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas	Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.
Kleine vleugeldekveren en schouwers.	Egaal grijs iets donkerder dan de mantel	Egaal bruin iets donkerder dan de mantel	Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel
Staart bovenzijde.	Donkergrijs	Zwartbruin	Donkergrijs
Borst, buik en Flanken	Licht kastanjebruin	Licht kastanjebruin	Lichtgrijs
Dijen en aarsstreek.	Crème	Crème	Grijswit
Onderstaartdekveren.	Crème	Crème	Grijswit
Staart onderzijde.	Donkergrijs	Zwartbruin	Donkergrijs
Poten.	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Nagels.	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Snavel.	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Hoornkleurig
Ogen /Pupil.	Zwart	Zwartbruin	Zwart
Tekeningskleur:			
Koptekening.	Egaal grauwegeel	Egaal grauwegeel	Egaal olijfgeel
Teugel.	Grijs.	Bruin	Grijs.
Vleugeldektening.	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top	Donkerbruin dwarsband met crème kleurige top	Donkergrijze dwarsband met witte top
Tekening bovenstaart dek	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top	Donkerbruin dwarsband met crème kleurige top	Donkergrijze dwarsband met wit
Borst buik en flanktekening.	Lichtgrijze zoom	Licht bruine zoom	Lichtgrijze zoom
Tekening onderstaartdek	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top	Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top	Donkergrijze dwarsband met witte top
Stuittekening	Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening	Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening	Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Roodkopamadine pop:

Kleurslag:	Wildkleur pop:	Bruin pop:	Grijs pop:
Kleur:			
Kop , rugdek/ mantel.	Egaal grijs met een minimale bruine waas.	Egaal bruin met een minimale bruingrijsachtige waas.	Egaal licht zilvergrijs.
Stuit en bovenstaartdekveren.	Egaal grijs met een bruine waas.	Egaal bruin.	Egaal licht zilvergrijs.
Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas.	Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De buitenvlag toont een bruine waas.	Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.
Kleine vleugeldekveren en schouders.	Egaal grijs iets donkerder dan de mantel.	Egaal bruin iets donkerder dan de mantel.	Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.
Staart bovenzijde.	Donkergrijs.	Zwartbruin.	Donkergrijs.
Borst, buik en Flanken	Licht crème met aan de flankzijde een bruin waas.	Licht kastanjebruin.	Lichtgrijs.
Dijen en aarsstreek.	Crème.	Crème.	Grijs-wit.
Onderstaartdekveren.	Crème.	Crème.	Grijs-wit.
Staart onderzijde.	Donkergrijs.	Zwartbruin.	Donkergrijs.
Poten.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Nagels.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Snavel.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen /Pupil.	Zwart.	Zwartbruin.	Zwart .
Tekening kleur:			
Koptekening.	Ontbreekt		
Teugel	Grijs.	Bruin.	Egaal licht zilvergrijs.
Vleugeldekkening.	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top.	Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top.	Donkergrijze dwarsband met witte top.
Tekening bovenstaart dekveren	Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top.	Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top.	Donkergrijze dwarsband met witte top.
Borst buik en flanktekening.	Wit met donkergrijze zoom.	Licht bruine zoom.	Wit met donkergrijze zoom.
Tekening onderstaartdekveren	Minimaal lichtgrijze dwarsband met crème kleurige top.	Donkerbruine dwarsband met crème kleurige top.	Minimale lichtgrijze dwarsband met witte top.
Stuittekening	Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening		

Kleurstandaard Geelkop roodkopamadine pop:

Kleurslag:	Geelkop wildkleur pop:	Geelkop bruin pop:	Geelkop grijs pop:
Kleur:	Het uiterlijk van de geelkop pop komt overeen met de wildkleur pop	Het uiterlijk van de geelkop pop komt overeen met de bruine pop	Het uiterlijk van de geelkop grijze pop komt overeen met de grijze pop

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Roodkopamadine man en pop.

Wildkleur:	<p>Fysiek: De standaardomschrijvingen van kleur en tekening betekenen, dat in de selectieve kweek, die ondermeer door Nederlandse kwekers is doorgevoerd, de meest in het oog springende onderdelen van de nominaatvorm A.e.e. en de ondersoort A.e.d. zijn samen gevoegd. In het verleden toonden veel ingevoerde roodkopamadinen een relatief platte kop in combinatie met een sterk gebolde hoge bovensnavel. De domesticatie heeft ook bij de roodkopamadine inmiddels tot een meer ronde kop en daarbij horende kegelvormige snavel gevormd. Tijdens de keuring dient hier goed op gelet te worden. Vogels met een platte kop en sterk gebogen hoge snavel dienen, al naar gelang de ernst van de fout, bestraft te worden.</p> <p>Kleur en tekening: De kopkleur van de man dient zo diep en egaal mogelijk van kleur te zijn, vaak is deze achter het oog en rond nek afscheiding wat minder intens van kleur hierdoor ontstaat ook een ongelmatige aftekening. De rode kleur mag niet uitlopen op de mantel. Bij de wildkleur man begint de licht kastanje bruine ondergrondkleur op de onderbuik voor de pootinplant. Deze ondergrondkleur is erg variabel en vaak onregelmatig van kleur. Het ideaal beeld is dat deze ondergrondkleur zo egaal mogelijk doorloopt over de flanken tot aan vleugelbochten en aansluit op de keel. De tekening op de borst dient zo regelmatig en zover mogelijk door te lopen richting buik. Op de buik ontstaat een deel met lichte toppen zonder dwarsband, hier overheerst de kastanjebruine kleur. De aangeboden vogels op de tentoonstelling vertonen een ruime variatie breedte betreffende deze ondergrondkleur en bijbehorende tekening. Vooralsnog dienen we hier met enige souplesse mee om te gaan. De wildkleur en geelkop man tonen op het lichtgrijze rugdek en mantel een bruine waas deze mag niet overheersen over de grijze kleur, hier streven we naar een minimale bruine waas. Door deze bruine waas zal de wildkleur ook altijd herkenbaar zijn t.o.v. de grijs mutant. Bij de Roodkopamadine man grijs is de kastanjebruine ondergrondkleur kleur niet aanwezig.</p>
Grijs:	<p>Algemeen: Bij de grijsmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.</p> <p>Kleur en tekening: De wildkleur en geelkop man tonen op het lichtgrijze rugdek en mantel een bruine waas deze mag niet overheersen over de grijze kleur, hier streven we naar een minimale bruine waas. Door deze bruine waas zal de wildkleur ook altijd herkenbaar zijn t.o.v. de grijs mutant. Bij de Roodkopamadine man grijs is de kastanjebruine ondergrondkleur kleur niet aanwezig.</p>
Geelkop wildkleur :	<p>Algemeen: Bij de geelkop wordt verwezen naar de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Specifiek voor de geelkop is enkel de kleur van de kop van de man. Geelkop poppen worden niet beschreven, omdat deze niet als zodanig herkenbaar zijn en dus niet afwijken van de "roodkop" poppen. De kleur van de gele kop kent een behoorlijke variatiebreedte en wordt voor een deel ondersteund door het onderliggende melanine, wat de kopkleur een warm, bijna olijfgel uiterlijk geeft. Een lichtere kopkleur komt zeker voor, echter de voorkeur gaat uit naar een diep olijf gele kopkleur.</p>
Geelkop bruin:	<p>Algemeen: Bij de bruinmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.</p> <p>Kleur en tekening: De bruine en de geelkopbruine mannen tonen op het bruine rugdek en mantel een lichte bruingrijsachtige waas deze mag niet overheersen over de bruine kleur, hier streven we naar een minimale waas.</p>
Geelkop grijs:	<p>Algemeen: Bij de geelkop grijs wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.</p>
Poppen algemeen:	<p>Goed in conditie zijnde poppen hebben in de nek vaak een roze gloed. Hier dient men soepel mee om te gaan tijdens de keuring.</p>

[Terug naar index](#)

Spermestes, de ekstertjes.

Het genus *Spermestes* bestaat uit vier vrij nauw verwante soorten met een aantal ondersoorten. Lange tijd is het reuzenekstertje, *Spermestes fringilloides*, als enige soort in het genus *Amanresthes* ondergebracht. Tegenwoordig wordt het dwergkestertje, *Spermestes nana*, door verschillende ornithologen nog wel gezien als de enige vertegenwoordiger van het genus *Lepidopygia*. Zonder in te gaan op ornithologische of morfologische argumenten wordt in deze standaard de plaatsing van alle soorten in het genus *Spermestes* gebruikt, gelijk aan de huidige algemene inzichten.

In het hoofdstuk *Spermestes* worden een viertal soorten en twee ondersoorten in standaardvorm omschreven, te weten:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Het dwergkestertje, | <i>Lonchura nana</i> . |
| 2. Het reuzenekstertje, | <i>Spermestes fringilloides</i> . |
| 3. Het ekstertje, | <i>Spermestes c. cucullata</i> . |
| Met de ondersoort | <i>Spermestes c. scutata</i> . |

Gezien het feit dat in alle voorkomende gevallen keurtechnisch de voorkeur uitgaat naar de meest contrastrijke vogel, is in de standaard de nominaat vorm, *Spermestes c. cucullata* beschreven. Wel zijn als aanvulling op de standaard de verschillen met de minder prominent getekende ondersoort

Spermestes c. scutata aangegeven. Op deze plaats is het goed te wijzen op de in het wild voorkomende populaties. In het leefgebied van de nominaatvorm en dat van de ondersoort komt een vrij groot overlappingsgebied voor. In noord Angola, zuid Zaïre, Oeganda, west Kenia en mogelijk zelfs zuidwest Sudan komen exemplaren voor van de nominaatvorm zowel als van de ondersoort. Een overgangs populatie welke door natuurlijke bastaardering is ontstaan laat een tussenvorm zien met een ruime variatiebreedte.

4. Het glansekstertje, *Spermestes b. bicolor*.

5. Het zwartrug ekstertje, *Spermestes b. poensis*.

In de standaard is gekozen voor de Nederlandse naamgeving zwartrug ekstertje. De ook wel gebruikte naam Fernando Po ekstertje wordt niet als juist gezien. Naast dat deze soort op Fernando Po voorkomt treft men hem ook aan in Kameroen, Gabon, Congo, Noord Angola, Zaïre, Burundi en Ruanda. In Kameroen komt een overgangs populatie voor van de ondersoort *Spermestes b. poensis* naar de nominaat vorm *Spermestes b. bicolor*.

6. Het bruinrug ekstertje, *Spermestes b. nigriceps*.

En de ondersoorten:

- Spermestes b. stigmatophora*.
- Spermestes b. woltersi*.
- Spermestes b. rufodorsalis*.
- Spermestes b. minor*.

In dit hoofdstuk wordt de ondersoort *Spermestes b. nigriceps* in standaardvorm beschreven, daarnaast worden de verschillen met de andere 4 ondersoorten omschreven. Naast het duidelijke afwijkende glansekstertje, *Spermestes b. bicolor*, is het verschil tussen het zwartrug ekstertje, *Spermestes b. poensis* en het bruinrug ekstertje *Spermestes b. nigriceps* het grootste. De namen zwartrug- en bruinrug ekstertje zijn dan ook goed gekozen. Binnen de groep bruinrug ekstertjes zijn de verschillen gering. Er bestaan in het wild diverse overgangspopulaties. De ondersoort *Spermestes b. stigmatophora* wordt wel gezien als overgangsvorm tussen *S. b. poensis* en *S. b. nigriceps*.

Bij de *Spermestes* soorten komt nauwelijks of geen geslachtsdimorfisme voor. Er is dan ook in de standaard geen afzonderlijke man- en popbeschrijving opgenomen.

[Terug naar index](#)

FYSIEKE STANDAARD EKSTERTJES:

Formaat:

De ekstertjes zijn ondanks hun geringe formaat geen iel ogende vogels en dienen minimaal het formaat te hebben zoals in de standaard is aangegeven. Het formaat en model van de vogels mogen niet storend op elkaar inwerken.

Model:

De ekstertjes moeten een robuuste indruk maken welke iets gedrongen overkomt. D.w.z. dat de ekstertjes geen slanke indruk mogen maken. Geaccentueerd door de tekening doen het ekstertje en het dwergekstertje zelfs iets geblokt aan. De onderlinge lichaamsverhoudingen dienen met elkaar in harmonie te zijn. Van opzij gezien moet de borstlijn vanaf de keel tot aan de inzet van de poten, regelmatig gebogen zijn. De rug moet vanaf de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Een puntige borst of uitgezakt achterlichaam worden als storend ervaren. De kop dient een ronde vorm te hebben zonder afplattingen. De staart is kort en de twee middelste staartpenen zijn minimaal langer, maar niet gespitst

Houding:

De ekstertjes dienen fier op stok te zitten waarbij het lichaam los blijft van de stok. Het doorzakken door de poten is fout. De vleugels moeten strak langs het lichaam gedragen worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie en een onbeschadigd verenpak is een eerste vereiste.

Snavel:

De snavel moet kegelvormig zijn, zonder beschadigingen. De onder en bovensnavel dienen natuurlijk te sluiten. De lijn snavel - schedel moet vloeiend zijn. Specifiek voor het reuzenekstertje geldt dat de snavel als fors en lang ervaren wordt.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, niet ruw en zonder vergroeiingen. De tenen moeten goed om de zitstok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan er drie naar voren en een naar achteren is gericht.

[Terug naar index](#)

Dwergkestertje, (*Lonchura nana*)

Algemeen:

Wetenschappelijk:	Spermester nana
Duits:	Zwergelsterchen.
Engels:	Bibfinch.
Frans:	Spermete naine.

Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9 cm.

Ringmaat : 2,3 mm

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

Dwergkestertje	Wildkleur man en pop
Kleur	
Kop, keel en nek	De schedel is donkergrijs. Op het achterhoofd gaat de kleur geleidelijk over in de grijsbruine kleur van de nek. De wangen zijn vanaf de ondersnavel lichtgrijs, richting oog gaat deze kleur langzaam over in de grijsbruine kleur van de nek.
Rug- en vleugeldek	Grijzig bruin. De vleugelpennen zijn zwartbruin. De vleugelpennen tonen een iets donkerder buitenvlag.
Staart	Zwartbruin
Borst, buik en onderstaartdekveren	De borst en buik zijn vanaf de zwarte bef licht bruin met een rossige gloed. De veerkernen zijn iets donkerder waardoor een zwakke hamertekening ontstaat. Richting buik en flank wordt de licht bruine kleur iets donkerder. De onderstaartdekveren zijn zwartbruin met beigeachtige omzoming.
Ogen	Bruin
Sanvel	De bovensnavel is zwart, de ondersnavel grijsig hoornkleurig.
Poten	Hoornkleurig, nagels grijsachtig.
Tekening	
Hamertekening kop	De schedel is voorzien van een hamertekening iets donkerder grijs dan de grondkleur
Teugel	De teugel is zwart welke richting bovensnavel iets uitloopt.
Bef	De keelstreek toont een kleine zwarte bef, welke begint aan de basis van de ondersnavel en aan de onderzijde is afgerond.
Stuit en bovenstaartdekveren	Bruin met enigszins glanzende beige-gele veereinden wat een gehamerde beige-gele stuit te zien geeft

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Dwergkestertje wildkleur	Het dwergkestertje dient een geblokt model te tonen. Dit mag echter geen vet ophopingen te zien geven. Is dit wel het geval dan is er sprake van een verstoring van het model. Als gevolg van het eenvoudige kleur- en tekeningpatroon is het dwergkestertje een vogel met weinig foutbronnen. Een scherpe aftekening van de bef mag verlangd worden. Bij de kleur van de borst is door de donkere veerkernen een lichte hamertekening te zien, welke regelmatig over de borst verdeeld moet zijn. Onregelmatige hamertekening doet vlekkelig aan en dient derhalve bij kleur bestraft te worden.
---------------------------------	---

[Terug naar index](#)

Reuzenekstertje, (*Spermestes fringilloides*)

Algemeen:

Wetenschappelijk:	Spermester fringikloides
Duits:	Rieseselsterchen.
Engels:	Magpie Mannikin.
Frans:	Spermete pie.

Fysieke eigenschappen:

Formaat: 12 cm.
Ringmaat 2,7 mm

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

Reuzeneksterje	Wildkleur man en pop
Kleur	
Kop, keel en nek	Zwart met blauwgroene glans. Op de wangen en de keel bevindt zich de glans in de veereinden waardoor een schubachtig geheel ontstaat.
Rug- en vleugeldek	Vanaf de zwarte nek gaat de kleur over in het donkerbruin van het rug- vleugeldek. De vleugelpennen zijn iets donkerder bruin.
Staart	Zwart.
Borst, buik en onderstaartdekveren	Vanaf de zwarte keelstreek zijn de borst en buik wit, richting aarsbevedering gaat de witte kleur over in een crème kleur.
Ogen	Bruin, ooglid geelbruin.
Sanvel	Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs met een zwarte punt.
Poten	Donkergrijs, nagels zwart.
Tekening	
Zwarte keel	De zwarte keel loopt door tot onder aan de keelstreek en wordt afgescheiden door een lijn welke loopt van vleugelaanzet tot vleugelaanzet. De afscheiding zwarte keelstreek witte borst dient scherp en regelmatig te zijn.
Tekening vleugeldek	De rugdekveren hebben lichter bruine veereinden. De kleine vleugeldekveren bezitten kleurloze schachten welke als een regelmatige rij crème-witte streepjes zichtbaar is. Deze dient op beide vleugels symmetrisch aanwezig te zijn.
Flanktekening	Op de zijkanten van de borst bevindt zich een zwarte wigvormige vlek met de top van de wig richting midden van de borst Deze tekening dient scherp te zijn. Deze wigvormige vlek vormt het begin van de zwarte flank welke aansluit op de zwarte stuit. In de achterste helft van de flank bevindt zich een min of meer ovale beige-bruine vlek.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Reuzenekstertje wildkleur	Specifiek voor de soort is de vrij zware kegelvormige snavel, welke voor het reuzenekstertje bijna te groot lijkt. Hier mag niet op gestraft worden. Zonder dat de vogel te slank is wordt de flank meestal onder de vleugels gedragen. De beige-bruine vlek wordt hierdoor niet altijd opgemerkt. Het weinig tonen van de flank tekening dient soepel te worden beoordeeld. De wigvormige tekening op de borst is strak, tijdens het keuren dient hierop gelet te worden. Indien de rugdekveren (zadel) een goudkleurige waas toont, wil dat zeggen, dat de vogel in een prima conditie is.
----------------------------------	--

[Terug naar index](#)

Ekstertje, (*Spermestes c.cucullata*)

Algemeen:

Wetenschappelijk:	Spermestes c.cucullata
Duits:	Klein elsterchen.
Engels:	Bronze Mannikin.
Frans:	Spermete a capuchon.

Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.
Ringmaat: 2,3 mm

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

Eksterje	Wildkleur man en pop
Kleur	
Kop, keel en nek	Zwart, met op de bovenschedel en wangen een groenachtige glans. Op de achterschedel gaat deze groene glans over in een meer paarse glans welke eveneens duidelijk zichtbaar is op de keel
Rug- en vleugeldek	De zwarte kleur van de nek gaat over in de mat bruinachtig grijze kleur van het rugdek. De vleugelpennen zijn donker grijsbruin met aan de buitenvlag een smalle lichtgrijze zoom.
Staart	Zwart.
Borst, buik en onderstaartdekveren	Zwarte borst met paarse glans en witte buik, aars-, broek- en onderstaartdekveren
Ogen	Donkerbruin.
Snavel	Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs.
Poten	Zwartgrijs
Tekening	
Schouderplek	Op de basis van de vleugels bevindt zich op de kleine vleugeldekveren een zwarte, groen glanzende schouderplek.
Stuit en boven- en onderstaartdekveren	De stuit is donker zwartbruin met witte dwarsbanden. Deze tekening gaat langzaam over in de tekening van de bovenstaartdekveren. Deze dekveren tonen een zwartbruine V-vormige tekening op een witte ondergrond. Op de aars-, broek- en onderstaartdekveren bevindt zich een zwarte V-vormige tekening.
Afscheiding borst-buik	De afscheiding zwarte borst met paarse glans en witte buik loopt vanaf de achterkant van de wangen in een diep gebogen regelmatige lijn over de borst.
Flank	De flank toont aan de voorzijde een zwarte, groen glanzende kleur. De achterste helft van de flank wordt gevormd door een witte zoomtekening op een zwarte basis. Deze eindigt in de V-vormige tekening van de broek. De dijen zijn zwartbruin met lichtere veerzomen

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Ekstertje wildkleur	<p>Veelvuldig komt het voor dat de overgangslijn tussen borst en buik een onregelmatig verloop heeft. Wanneer het ekstertje een compleet verenpak heeft zal deze lijn een strakke afscheiding tonen. De flanken zijn moeilijk strak getekend te showen. Dit komt doordat de overgang van het zwarte groen glanzende gedeelte naar de zwart-witte zoomtekening wat onregelmatig is. Het keuren met enige soepelheid is dan ook juist.</p> <p>Ondersoorten:</p> <p>Van het ekstertje, <i>Spermestes c. cucullata</i>, komt een ondersoort voor: <i>S.c. scutata</i>. De verschillen tussen de nominaatvorm en deze ondersoort zijn de volgende: (ondersoort t.o.v. nominaatvorm.)</p> <p>A: De tekening op de stuit is minder prominent.</p> <p>B: De paarse glans op de borst is niet aanwezig, de borstkleur is bruinzwart.</p> <p>C: De flank toont het zwarte groen glanzende deel niet of nauwelijks, en is geheel wit gezoomd. Gezien de nominaatvorm het meest contrastrijk is gaat hier de voorkeur naar uit.</p>
----------------------------	---

[Terug naar index](#)

Glanskestertje, (*Spermestes b. bicolor*)

Algemeen:

Wetenschappelijk:	Spermestes b. bicolor
Duits:	Glänzelsterchen.
Engels:	Black-and-white Mannikin.
Frans:	Spermete bicolore

Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.

Ringmaat: 2,3 mm

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

Glanskestertje	Wildkleur man en pop
Kleur	
Kop, keel en nek	Diep zwart met een minimale groene glans.
Rug- en vleugeldek	Gelijk aan kop en nek, diep zwart met een minimale groene glans waarbij de grote vleugeldekveren deze glans niet tonen.
Stuit, staart en bovenstaartdekveren	De zwaart is zwart. De stuit is zwart met een minimale groene glans, de bovenstaartdekveren zijn zwart.
Borst, buik en onderstaartdekveren	De borst is diep zwart, welke zijwaarts overloopt in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is zwart.
Ogen	Donkerbruin.
Snavel	Blauwgrijs, met zwarte snijranden welke de afscheiding tussen beide snavedelen accentueert.
Poten	Donkergrijs tot zwart.
Tekening	
Vleugeldekveren	Op de binnenste vleugelpennen treft men 2, 3 of 4 kleine witte stipjes aan welke zich op de buitenvlag van deze pennen bevinden en op beide vleugels symmetrisch aanwezig dienen te zijn
Flank	De flanken zijn diep zwart; hierop bevindt zich een witte aftekening, welke aan de buikzijde een wit-zwarte getande tekening vormt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Glanskestertje wildkleur	Het glanskestertje is, indien geshowd in een goede conditie, een vogel met erg weinig fout bronnen. De opbouw van de flankbevedering toont indien compleet een regelmatig zwart-witte getande tekening, hierop dient streng gelet te worden. De 2 tot 4 witte stippen in de vleugelbevedering dient symmetrisch aanwezig te zijn. Ook hier dient streng op gelet te worden.
---------------------------------	--

[Terug naar index](#)

Zwartrugekstertje, (*Spermestes bicolor poensis*)

Algemeen:

Wetenschappelijk:	Spermestes bicolor poensis
Duits:	Gitterflugelesterchen.
Engels:	Black-backed Mannikin.
Frans:	Spermete noir et blanc

Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.

Ringmaat: 2,3 mm

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

Zwartrugeksterje	Wildkleur man en pop
Kleur	
Kop, keel en nek	Diep zwart met een minimale groene glans.
Rug- en vleugeldek	Zwart met minimale groene glans.
Staart	Zwart.
Borst, buik en onderstaartdekveren	De borst is zwart en loopt zijwaarts over in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is zwart.
Ogen	Donkerbruin.
Sanvel	Blauwgrijs, met zwarte snijranden wat de afscheiding tussen de snavelhelften accentueert.
Poten	Zwartgrijs.
Tekening	
Vleugelpennen	De buitenvlaggen van de onderste helft van de hand- en armpennen zijn bezet met een rij witte stipjes. In rusttoestand vormen deze stippen een regelmatige tralietekening.
Stuit en bovenstaartdekveren	Zwart met witte dwarsstreepjes
Flank	De flankveren zijn zwart met witte zomen waardoor er een zwart-wit geschubde flanktekening ontstaat.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Zwartrugekstertje wildkleur	In goede conditie is het zwartrug ekstertje een vogel met weinig foutbronnen. Op de scherpte van de tekening op vleugels en flanken dient dan ook de aandacht gevestigd te zijn. Door het weinig verkrijgbaar zijn van het zwartrug ekstertje wordt zo nu en dan van het bruinrug ekstertje of glans ekstertje gebruik gemaakt om koppels te vormen. Deze hybriden zijn goed herkenbaar, maar mogen niet als bastaard worden gekeurd. Door het bruinrug ekstertje wordt de kleur van het rugdek van de F1 vogels bruinzwart, dit dient bij kleur gestraft te worden. Door gebruik van het glansekstertje worden de F1 vogels in de tekening aangetast. De vleugeltekening neemt af en is alleen nog in de basis van de pennen te vinden. De flanktekening laat een overgangsvorm van de zwarte zomen van het zwartrug ekstertje naar de getande tekening van het glansekstertje zien. Een afwijkende vleugel- en flanktekening dient bij tekening gestraft te worden.
------------------------------------	---

[Terug naar index](#)

Bruinrugkestertje, (*Spermestes bicolor nigriceps*)

Algemeen:

Wetenschappelijk:	Spermestes bicolor nigriceps
Duits:	Braunrucken elsterchen.
Engels:	Red-backed Mannikin.
Frans:	Spermete a dos brun

Fysieke eigenschappen:

Formaat: 9,5 cm.

Ringmaat: 2,3 mm

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:

Bruinrugkesterje	Wildkleur man en pop
Kleur	
Kop, keel en nek	Zwart .
Rug- en vleugeldek	Rug-, vleugeldek en armpennen roodbruin. De handpennen zijn zwart
Staart	Zwart.
Borst, buik en onderstaartdekveren	De borst zwart welke zijwaarts overloopt in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is zwart.
Ogen	Bruin.
Sanvel	Blauwgrijs, met zwarte snijranden wat de afscheiding tussen de snavelhelften accentueert.
Poten	Grijszwart.
Tekening	
Vleugeldek en vleugelpennen	De kleine vleugeldekveren bezitten kleurloze schachten welke als een regelmatige rij crème-witte streepjes zichtbaar zijn, en op beide vleugels symmetrisch aanwezig zijn. De buitenvlag van de onderste helft van de handpennen zijn bezet met een rij witte stipjes. In rusttoestand vormen deze stippen een regelmatige tralietekening.
Stuit en bovenstaartdekveren	Zwart met witte dwarsstreepjes
Flank	De flankveren zijn zwart met witte zomen waardoor er een zwart-wit geschubde flanktekening ontstaat.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:

Bruinrugkestertje wildkleur	<p>Wanneer het bruinrugkestertje in goede conditie geshouwd wordt, is het een vogel met weinig foutbronnen. Op de scherpte van de tekening op flank en vleugels dient dan ook streng gelet te worden.</p> <p>Ondersoorten:</p> <p>Onder de naam bruinrugkestertje worden diverse ondersoorten beschreven. Naast de bovenstaande S.b.nigriceps komen ook de S.b. woltersi, S.b.stigmatophora, S.b.rufodorsalis en S.b.minor voor. De belangrijkste verschillen in deze ondersoorten zijn te vinden in de kleur van het rugdek, te weten:</p> <p>A: S.b.stigmatophora, rugdek zwartbruin. B: S.b.woltersi, rugdek donkerbruin. C: S.b.rufodorsalis, rugdek warm roodbruin en het zwart rond de kop is minder uitgebreid terwijl de vogels iets kleiner zijn. D: S.b.minor, rugdek warm roodbruin, deze ondersoort is het kleinste van formaat.</p> <p>Gezien de Spermestes bicolor nigriceps de meest contrastrijke van de bruinrug groep is gaat naar deze ondersoort de voorkeur uit.</p>
------------------------------------	--

[Terug naar index](#)

Pytilia astrilden familie

Algemeen:

De groep van de Pytilia astrilden bestaat uit:

Aurora astrilde	Pytilia phoenicoptera
Roodmasker geelvleugel astrilde	Pytilia hypogrammica
Wiener astrilde	Pytilia afra
Melba astrilde	Pytilia melba
Gestreepte astrilde	Pytilia lineata
Roodmasker roodvleugel astrilde	

Er is voor gekozen om de roodmasker astrilde te hernoemen naar roodmasker geelvleugel astrilde.

De roodmasker roodvleugel astrilde is in de herkenning omschrijving opgenomen.

Voor zover bekend komt de streepjes astrilde niet meer in Nederland voor.

De overige soorten worden nog wel regelmatig gekweekt vandaar dat als herkenning ondersteuning deze soorten zijn opgenomen.

Aurora Astrilde

(*Pytilia phoenicoptera*) Crimson-winged pytilia is een prachtvink (Estrildidae),

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Ethiopië

Ringmaat: 2,5 mm

De soort telt 2 ondersoorten:

- *P. p. phoenicoptera*: van Senegal en Gambia tot noordelijk Nigeria.
- *P. p. emini*: van Kameroen tot zuidelijk Soedan en noordelijk Oeganda.

Roodroodmasker geelvleugel astrilde

Verspreidingsgebied: Sierra Leone tot Zaïre

Ringmaat: 2,5 mm

Mutaties: oranjemasker

Wienerastrilde / *Pytilia afra* / Orange-winged pytilia

Verspreidingsgebied: Soedan, Ethiopië tot Mozambique en Zuid Afrika

Ringmaat: 2,5 mm

Melba astrilde / *Pytilia melba* / Green-winged pytilia, Melba finch

Verspreidingsgebied: Senegal tot Ethiopië en Mozambique, Oost Zuid Afrika

Ringmaat: 2,5 mm

Mutaties: geelsnavel

Gestreepte astrilde / *Pytilia lineata* / Crimson-winged pytilia

Verspreidingsgebied: Ethiopië

Ringmaat: 2,3 mm

[Terug naar index](#)

Soort:	Aurora astrilde man:	Aurora astrilde pop:
	<i>Pytilia phoenicoptera</i> 12-13 cm	<i>Pytilia phoenicoptera</i> 12-13cm
Formaat:		
Kop, schedel en nek:	Loodgrijs.	Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.
Rug en vleugeldek:	Rug en zadel loodgrijs. Vleugeldekveren rood met doorschemerend loodgrijs.	Rug en zadel loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. Vleugeldekveren rood met doorschemerend loodgrijs.
Masker, wangen en keel:	Loodgrijs. Teugel is grijs.	Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. Teugel is grijs.
Vleugelpennen:	Loodgrijs met rode buitenvlag.	Loodgrijs met rode bruinrode buitenvlag.
Stuit:	Rood.	Rood.
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Rood.
Borst:	Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.	Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.
Onderlijf:	Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.	Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.
Flanken:	Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.	Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.
Broek en pootinplant:	Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping.	Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.
Onderstaart:	Grijs met lichtgrijze bestreping.	Grijs met lichtgrijze bestreping.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Iets donkerder vleeskleurig grijs.	Iets donkerder vleeskleurig grijs.
Snavel:	Zwartgrijs.	Zwartgrijs.
Ogen:	Iris zwart met grijze rand.	Iris zwart met grijze rand.
Oogranden:	Oogranden diep grijs.	Oogranden diep grijs.
Tekening:		
Vleugel:	Rood, vloeiende verloop naar het rugdek toe.	Rood met roodbruin, vloeiende verloop naar het rugdek toe.
Onderlijf en flanken:	Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.	Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd met lichtgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.

Aurora astrilde man:	<p>Algemeen: Gelet dient te worden op de raszuiverheid.</p> <p>Kleur: De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn met lichtgrijze tekening. De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een rode buitenvlag met een lichte bruinrode waas. Het rugdek dient schoon loodgrijs te zijn.</p> <p>Tekening: De flanktekening dient zo strak mogelijk te zijn met een goed contrast met de lichaamskleur. De flanken tonen een iets witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p>
Aurora astrilde pop:	<p>Algemeen: Gelet dient te worden op de raszuiverheid.</p> <p>Kleur: De borstkleur dient egaal loodgrijs met licht bruingrijze waas met daarop lichtgrijze vuilwitte tekening. De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een rode buitenvlag met een lichte bruinrode waas.</p> <p>Tekening: De flanktekening dient zo strak mogelijk te zijn met een goed contrast met de lichaamskleur.</p>

[Terug naar index](#)

Soort:	Roodmasker astrilde man:	Roodmasker astrilde pop:
	<i>Pytilia hypogrammica</i>	<i>Pytilia hypogrammica</i>
Formaat:	11 tot 12 cm	11 tot 12 cm
Kop, schedel en nek:	Loodgrijs met een iets donkerder grijze hamertekening	Loodgrijs met een iets grijze hamertekening
Rug en vleugeldek:	Rug en zadel loodgrijs. Vleugeldekveren zijn goudgeel met doorschemerend grijs.	Rug en zadel loodgrijs met iets bruinrijze waas, vleugeldekveren zijn opgebleekt goudgeel met doorschemerend grijs.
Masker, wangen en keel:	Rood. Teugel is grijs	Masker ontbreekt. Teugel is grijs
Vleugelpennen:	Loodgrijs met goudgele buitenvlag met licht wijnrode waas.	Loodgrijs met opgebleekt goudgele buitenvlag.
Stuit:	Rood.	Bruinrood.
Bovenstaartdekveren:	Rood.	Bruinrood.
Borst:	Egaal loodgrijs zonder tekening.	Egaal loodgrijs en wat lichte tekening.
Staat:	Bovenstaartdekveren rood.	Bovenstaartdekveren bruinrood.
Onderlijf:	Loodgrijs met witgrijze tekening.	Loodgrijs met witgrijze tekening.
Flanken:	Loodgrijs met vuilwitte tekening.	Loodgrijs met vuilwitte tekening.
Broek en pootinplant:	Loodgrijs met witgrijze tekening.	Loodgrijs met witgrijze tekening.
Onderstaart:	Loodgrijs met witte uiteinden.	Loodgrijs met witte uiteinden.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Donker hoornkleurig	Donker hoornkleurig
Snavel:	Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.	Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.
Ogen:	Iris zwart met bruine rand	Iris zwart met bruine rand
Oogranden:	Oogranden diep grijs	Oogranden diep grijs
Tekening:		
Masker:	Rood	N.v.t.
Vleugel:	Goudgeel , vloeiend verloop naar het rugdek toe.	Opgebleekt goudgeel, vloeiend verloop naar het rugdek toe.
Onderbuik:	Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.	Loodgrijs met grijsbruine-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

<p>Roodmasker astrilde man:</p>	<p>Algemeen: Gelet dient te worden op de raszuiverheid.</p> <p>Kleur: De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn zonder enige tekening. De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een goudgele buitenvlag met een lichte wijnrode waas. Gelet dient te worden dat deze niet te oranje-rood van kleur worden. Het rugdek dient schoon loodgrijs te zijn.</p> <p>Tekening: Het masker dient egaal rood en strak afgescheiden te zijn. De flanken tonen een iets witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p>
<p>Roodmasker astrilde pop:</p>	<p>Algemeen: Gelet dient te worden op de raszuiverheid. Roodmasker astrilde poppen zijn dieper grijs van kleur dan de Aurora astrilde poppen.</p> <p>Kleur: De borstkleur dient zo egaal mogelijk grijs met een vage tekening te zijn. De grote vleugelpennen zijn grijs met een licht goudgele buitenvlag, iets minder intens van kleur dan bij de man. Gelet dient te worden dat deze niet te oranje-rood van kleur worden.</p> <p>Tekening: De flanken tonen een loodgrijze met een vuilwitte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p>

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Roodmasker roodvleugel aurora astrilde man:	Roodmasker roodvleugel aurora astrilde pop:
Formaat:	11 tot 12 cm	11 tot 12 cm
Kop, schedel en nek:	Loodgrijs met een iets donkerder grijze hamertekening	Loodgrijs en een iets grijze hamertekening
Rug en vleugeldekk:	Rug en zadel loodgrijs. Vleugeldekkveren zijn rood met doorschemerend grijs.	Rug en zadel loodgrijs, vleugeldekkveren zijn opgebleekt goudgeel met doorschemerend grijs.
Masker, wangen en keel:	Rood, teugel is grijs	Masker ontbreekt. Teugel is grijs
Vleugelpennen:	Loodgrijs met diep rode buitenvlag.	Opgebleekt loodgrijs met opgebleekt goudgele buitenvlag.
Stuit:	Rood.	Rood.
Bovenstaartdekkveren:	Rood.	Rood.
Borst:	Egaal loodgrijs zonder tekening.	Egaal loodgrijs met wat lichte tekening.
Staat:	Bovenstaartdekkveren rood.	Bovenstaartdekkveren rood.
Onderlijf:	Loodgrijs met witgrijze tekening.	Loodgrijs met witgrijze tekening.
Flanken:	Loodgrijs met vuilwitte tekening.	Loodgrijs met vuilwitte tekening.
Broek en pootinplant:	Loodgrijs met witgrijze tekening.	Loodgrijs met witgrijze tekening.
Onderstaart:	Loodgrijs met witte uiteinden.	Loodgrijs met iets bruingrijze waas en witte uiteinden.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Donker hoornkleurig	Donker hoornkleurig
Snavel:	Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.	Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis.
Ogen:	Iris zwart met bruine rand	Iris zwart met bruine rand
Oogranden:	Oogranden diep grijs	Oogranden diep grijs
Tekening:		
Masker:	Rood	N.v.t.
Vleugel:	Rood, vloeiend verloop naar het rugdek toe.	Opgebleekt goudgeel, vloeiend verloop naar het rugdek toe.
Onderbuik:	Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart..	Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen:

Roodmasker roodvleugel man:	<p>Kleur: De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn zonder enige tekening. De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een diep rode buitenvlag.. Gelet dient te worden dat deze vrijwel gelijk van kleur is als het rode masker. Het rugdek (zadel) dient schoon loodgrijs te zijn, het rood van de vleugelpennen mag niet doorlopen over het rugdek heen, dit dient loodgrijs te zijn. De roodmasker roodvleugel is via transmutatie met de roodmasker astrilde gecombineerd. Deze combinatie komt in de overgangs gebieden tussen de Aurora- en de Roodmasker astrilde voor. Deze combinatie kwam vroeger tussen de importen voor en heeft enige tijd de naam pytilia lopezi gehad van de ornithologen.</p> <p>Tekening: Het masker dient strak egaal rood afgescheiden te zijn. Vooral te letten op de grootte van het masker deze dient halverwege op de nek te lopen achter het oog. De flanken tonen een vuil witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p>
Roodmasker roodvleugel pop:	<p>Algemeen: Roodmasker astrilde poppen zijn iets dieper grijs van kleur dan de Aurora astrilde poppen. Het zal lastig zijn om de poppen van de aurora en de roodmasker te onderscheiden. Gestreefd dient te worden naar meer helder grijze poppen met zo weinig mogelijk tekening op de borst.</p> <p>Kleur: De borstkleur dient zo egaal mogelijk met enige tekening die zo strak mogelijk dient te zijn . De grote vleugelpennen zijn grijs met een rode bruinrode buitenvlag, iets minder intens van kleur dan bij de man. Gelet dient te worden dat deze niet te oranje-rode waas tonen.</p> <p>Tekening: De flanken tonen een opgebleekte loodgrijze met een vuilwitte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn.</p>

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Wiener astrilde man	Wiener astrilde pop	Melba astrilde man	Melba astrilde pop
	<i>Pytilia afra</i>	<i>Pytilia afra</i>	<i>Pytilia melba</i>	<i>Pytilia melba</i>
Formaat:	11-12 cm	11-12 cm	12-13 cm	12-13 cm
Kop, schedel en nek:	Diep rood geleidelijk overgaand in grijs gehamerd	Schedel grijs licht gehamerd, masker en keel grijs	Schedel en wangen grijs	Schedel en wangen grijs
Rug en vleugeldek:	Grijs overgaand in okergeel	Grijs met lichtgroene schijn	Rug en zadel olijfgroen	Rug en zadel olijfgroen
Masker, wangen en keel:	Diep rood	Grijs	Rood	Grijs
Vleugelpennen:	Zwartbruin met oranjebruine buitenzijde	Zwartbruin met oranjebruine buitenzijde	Donkerbruin met olijfgroen gezoomd	Donkerbruin met olijfgroen gezoomd
Stuit:	Diep rood iets lichter dan het masker	Bruinrood	Diep rood	Grijs
Bovenstaartdekveren:	Diep rood	Bruinrood met zwartbruine schachtkleur	Rood	Rood
Staart:	Staartpennen zwartbruin met rode schijn	Zwartbruin	Bovenstaart roodbruin	Bovenstaart roodbruin
Borst:	Grijsgroen met gebroken witte dwarstekening	Grijs met lichte dwarstekening en groen waas	Olijfgroen met vage tekening	Grijs met vuilwitte dwarstekening
Onderlijf:	Grijsgroen met gebroken wit dwarstekening	Grijs met wat zwaardere dwarstekening	Vuil wit	Grijs met vuilwitte dwarstekening
Flanken:	Grijsgroen met gebroken wit dwarstekening	Grijs met dwarstekening en olijfgroene waas	Grijs gestreept	Grijs met vuilwitte dwarstekening
Broek en pootinplant:	Grijsgroen met gebroken wit dwarstekening	Grijs met dwarstekening	Grijs gestreept	Grijs met vuilwitte dwarstekening
Onderstaart:	Donkergrijs	Grijsbruin	Crème kleurig	Crème kleurig
Anus:	Anus gebroken wit	Anus gebroken wit	Vuil wit	Vuil wit
Poten:	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Licht loodgrijs	Licht loodgrijs
Nagels:	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Iets donkerder dan poot	Iets donkerder dan poot
Snavel:	Diep rood	Ondersnavel rood, bovensnavel naar de basis toe bruin	Rood	Rood
Ogen:	Diep bruin	Diepbruin	Zwart	Zwart
Oogranden:	Oogranden grijs	Oogranden grijs	Oogranden lichtgrijs	Oogranden lichtgrijs
Tekening:				
Masker en wangen	Diep rood	Grijs	Rood	Grijs
Vleugelbalk	Oranjebruin	Flets oranjebruin	N.v.t.	N.v.t.
Teugel		Grijs	Grijs	Grijs

[Terug naar index](#)

Uraeginthus familie:

Algemeen:

De uraeginthus familie bestaat uit:

Blauwfazantje roodwang	<i>Uraeginthus Bengalus</i>
Blauwkop blauwfazantje	<i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>
Angola blauwfazantje	<i>Uraeginthus Angolensis</i>
Granaatastrilde	<i>Uraeginthus granatina</i>
Purper granaatastrilde	<i>Uraeginthus lanthinogaster</i>

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort	Blauwfazantje roodwang	Blauwkop blauwfazantje	Angola blauwfazantje
Kleurslag	<i>Uraeginthus Bengalus</i>	<i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>	<i>Uraeginthus Angolensis</i>
Formaat:	12 tot 13 cm	12,5 tot 13,5 cm	13 cm
Kop, schedel en nek:	Bruin	Blauw	Bruin met licht grijze waas
Rug en vleugeldek:	Bruin	Lichtbruin	Bruin met licht grijze waas
Masker, wangen en keel:	Blauw	Blauw	Blauw
Vleugelpennen:	Donkerbruin met lichte opgebleekte randen.	Donkerbruin met lichte opgebleekte randen.	Donkerbruin
Stuit:	Blauw	Lichtblauw	Blauw
Bovenstaartdekveren:	Blauw	Blauw	Lichtblauw
Staart:	Donkerbruin met blauwe waas	Donkerbruin met blauwe waas	Donkerblauw met donkere nerf
Borst:	Blauw	Blauw	Blauw
Onderlijf:	Licht bruin overgaand in vuilwit naar de anus	Licht bruin overgaand in vuilwit naar de anus	Lichtbruin
Broek en pootinplant:	Lichtbruin met blauwe waas.	Blauw	Lichtbruin
Onderstaart: Onderstaartdekveren:	Donkerbruin, Lichtbruin	Donkerbruin, Lichtbruin	Donkerblauw, Bruin
Poten:	Vleeskleurig		Lichtbruin
Nagels:	Hoornkleurig		Lichtbruin
Snavel:	Licht wijnrood, met donkerbruine punt	Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin	Paarsrood met zwarte punt
Ogen: Oogranden:	Bruin, Oogranden wit.	Grijs, Oogranden wit	Roodbruin, Oogranden lichtblauw
Tekening:			
Wangvlek:	Rood	N.v.t.	N.v.t.
Algemeen pop:			
	Pop mist rode wangen, lichaamskleur wat lichter blauw	Pop wat lichter blauw en meer bruin van kleur,	Pop wat lichter van kleur, vaak moeilijk te onderscheiden van de man.

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort	Blauwkop blauwfazantje pastel <i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>	Blauwkop blauwfazantje Overgoten <i>Uraeginthus Cyanocephalus</i>
Kleurslag		
Formaat:	12,5 tot 13,5 cm	12,5 tot 13,5 cm
Kop, schedel en nek:	Opgebleekt lichtblauw	Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd
Rug en vleugeldek:	Opgebleekt licht beigebruin	Lichtgrijs licht bruin bewaasde omzoming
Masker, wangen en keel:	Opgebleekt lichtblauw	Opgebleekt lichtblauw lichtgrijs bewaasd
Vleugelpennen:	Opgebleekt beigebruin met lichte opgebleekte randen.	Sterk opgebleekt beigebruin met lichte opgebleekte randen.
Stuit:	Opgebleekt lichtblauw	Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd
Bovenstaartdekveren:	Opgebleekt lichtblauw met grijze waas	Opgebleekt lichtblauw met grijze waas
Staat:	Bruin met blauwgrijze waas	Zilvergrijs licht blauw bewaasd
Borst:	Opgebleekt lichtblauw	Opgebleekt lichtblauw met grijze waas
Onderlijf:	Licht beigebruin overgaand in vuilwit naar de anus	Licht beige grijs overgaand in vuilwit naar de anus
Broek en pootinplant:	Opgebleekt lichtblauw	Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd
Onderstaart:	Donkerbruin,	
Onderstaartdekveren:	Licht beigebruin	Zilvergrijs, licht blauw bewaasd
Poten:	Vleeskleurig	Vleeskleurig
Nagels:	Hoorncleurig	Hoorncleurig
Snavel:	Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin	Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin
Ogen:	Grijs,	Grijs,
Oogranden:	Oogranden wit	Oogranden wit
Tekening:		
Wangvlek:	N.v.t.	N.v.t.
	Pop op onderdelen wat lichter blauw en bruin van kleur, het blauw minder uitgebreid aanwezig op schedel en in de nek.	Pop op onderdelen wat lichter blauw en bruin van kleur, het blauw minder uitgebreid aanwezig op schedel en in de nek.

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort	Granaatastrilde man	Granaatastrilde pop	Purper granaatastrilde man	Purper granaatastrilde pop
Kleurslag	<i>Uraeginthus granatina</i>	<i>Uraeginthus granatina</i>	<i>Uraeginthus lanthinogaster</i>	<i>Uraeginthus lanthinogaster</i>
Formaat:	14 cm	14 cm.	14 cm	14 cm.
Kop, schedel en nek:	Roodbruin	Bruin	Kastanjebruin	Diep warm bruin
Rug en vleugeldek:	Roodbruin met licht grijze waas	Bruin	Kastanjebruin, zadel donkerbruin	Diep bruin
Masker, wangen en keel:	Keel en oogstreep zwart	Keel beigebruin, boven de snavel , tussen de wangen een blauwe band	Rond de ogen diepblauw, keel kastanjebruin	Rond de ogen en teugel lichtblauw
Vleugelpennen:	Donkerbruin, vleugeldekveren roodbruin	Donkerbruin, vleugeldekveren bruin	Donkerbruin	Donkerbruin met lichte zoom
Stuit:	Blauwachtig paars	Blauw	Diep blauw	Diep blauw
Bovenstaartdekveren:	Blauwachtig paars	Blauw	Diep blauw	Donkerbruin met blauwe waas
Staart:	Bovenstaart zwartbruin	Bovenstaart donkerbruin	Bovenstaart zwart met blauwe waas	Bovenstaart zwart met blauwe waas
Borst:	Roodbruin	Kaneelbruin	Blauw met een bruine waas.	
Onderlijf:	Roodbruin tot pootinplant, Anus is zwartbruin	Beigebruin, Anus licht beigebruin	Bruin, Anus blauw met bruine waas	Beigebruin, Anus licht beigebruin
Broek en pootinplant:	Roodbruin	Beigebruin	Blauw met een bruine waas.	Beigebruin
Onderstaart: Onderstaartdekveren:	Zwartbruin, Blauwachtig paars	Donkerbruin, Beigebruin	Zwart, Donkerbruin met blauwe waas	Donkerbruin, Beigebruin
Poten:	Zwartbruin	Donkerbruin	Donkergrijs tot zwart	Donkergrijs tot zwart
Nagels:	Zwart	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin
Snavel:	Rood	Licht rood	Rood	Bovensnavel licht rood met iets donkere basis, onder snavel licht rood
Ogen: Oogranden:	Bruin, Oogranden oranje	Bruin, Oogranden licht oranje	Rood met zwarte iris, Oogranden rood	Rood met zwarte iris, Oogranden rood
Tekening:				
Wangvlek:	Paarsblauw	Licht paars	N.v.t.	N.v.t.
Teugel:	Zwart	Zwart	Diep blauw	Lichtblauw

[Terug naar index](#)

Lagonostica familie:

De *Lagonostica* familie bestaat uit:

Senegal amarant (Vuurvink) / *Lagonosticta senegala senegala*

Kenmerken: bruine rug, kop en onderdelen rood, onderbuik bruin, witte stipjes op voorkant flanken, rose snavel

Geslachtsonderscheid: pop is bruin met rood vlekje tussen oog en snavel

Verspreidingsgebied: Mauritanië, Senegal tot Ethiopië en Somalië tot Angola en Zuid Afrika

Ringmaat: 2,3 mm

Prachtamarant / *Lagonosticta senegala ruberrima*

Kenmerken: bruine rug, kop en onderdelen rood, onderbuik bruin, witte stipjes op voorkant flanken, rose snavel

Geslachtsonderscheid: pop is bruin met rood vlekje tussen oog en snavel

Verspreidingsgebied: Uganda

Ringmaat: 2,3 mm

Zwartbuik amarant (Zwartbuik vuurvink) / *Lagonosticta rara rara*

Kenmerken: rood, buik zwart, bovensnavel grijs, ondersnavel rood met grijze punt

Geslachtsonderscheid: pop minder rood, kop grijs, bij man is de buik tot tussen de pootjes diep-zwart

Verspreidingsgebied: Sierra Leone en Liberië tot Soedan, Oeganda en Kenia

Ringmaat: 2,3 mm

Donkerrode amarant / *Lagonosticta rubricata*

Kenmerken: bruine rug, donkerrood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, witte stippen op voorkant flanken

Geslachtsonderscheid: pop minder rood

Verspreidingsgebied: Guinee-Bissau tot Ethiopië tot Zuid Afrika

Ringmaat: 2,3 mm

Grote puntamarant / *Lagonosticta nitidula*

Kenmerken: grijs, onderdelen lichter, gezicht en borst rozerood, zijkant borst wit bestippeld, snavel rood

Geslachtsonderscheid: grijze stippen op keel en borst van pop

Verspreidingsgebied: Angola tot Zambia tot Namibië en Botswana

Ringmaat: 2,3 mm

Kleine puntamarant / *Lagonosticta rufopicta*

Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en borst, witte stippen op zijkant borst en flanken

Geslachtsonderscheid: geen

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Soedan, Ethiopië tot Zaïre en Kenia

Ringmaat: 2,3 mm

Landana amarant / *Lagonosticta landanae*

Kenmerken: bruin, onderdelen licht rood, witte stipjes op achterkant flanken, stuit rood, onderstaartdekveren zwart, snavel roze met zwart

Geslachtsonderscheid: pop bleker

Verspreidingsgebied: Cabinda en Kongo tot Angola

Ringmaat: 2,3 mm

Mali amarant / *Lagonosticta virata*

Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken

Geslachtsonderscheid: matter van kleur

Verspreidingsgebied: Mali

Ringmaat: 2,3 mm

Rotsamarant / *Lagonosticta sanguinodorsalis*

Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken

Geslachtsonderscheid: pop matter van kleur

Verspreidingsgebied: Nigeria

Ringmaat: 2,3 mm

Roze amarant (Jameson vuurvink) / *Lagonosticta rhodopareia*

Kenmerken: bruine rug en bovenkop, donkerroze gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op voorkant flanken

Geslachtsonderscheid: pop heeft rood vlekje tussen oog en snavel en bruinroze onderdelen

Verspreidingsgebied: Tsjaad, Soedan, Ethiopië en Cabinda tot Zuid Afrika

Ringmaat: 2,3 mm

Tsjaad amarant / *Lagonosticta umbrinodorsalis*

Kenmerken: bruine rug, rood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken

Geslachtsonderscheid: pop veel bruiner van kleur

Verspreidingsgebied: Tsjaad

Ringmaat: 2,3 mm

Wijnrode amarant / *Lagonosticta larvata vinacea*

Kenmerken: gezicht zwart, lichaam wijnrood, rug bruiner, witte stipjes op flanken

Geslachtsonderscheid: pop mist zwart masker

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia

Ringmaat: 2,3 mm

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Senegal vuurvink man	Senegal vuurvink pop	Pracht amarant man	Pracht amarant pop
	<i>Lagonostica Senegala</i>	<i>Lagonostica Senegala</i>	<i>Lagonosticta senegala ruberrima</i>	<i>Lagonosticta senegala ruberrima</i>
Formaat:	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Kop, schedel en nek:	Donkerbruin met karmijnrode waas	Donkerbruin	Rood	Donkerbruin
Rug en vleugeldek:	Bruin met rode waas	Bruin	Rood, bruin doorschijnend	Bruin met rode gloed
Masker, wangen en keel:	Karmijnrood	Bruin	Rood	Bruin met rode gloed
Vleugelpennen:	Donkerbruin	Bruin, buitenste pennen iets donkerder	Bruin	Bruin, buitenste pennen iets donkerder
Stuit:	Karmijnrood	Karmijnrood	Karmijnrood	Karmijnrood
Bovenstaartdekveren:	Karmijnrood	Rood	Rood	Rood
Staart:	Staartpennen zwart	Staartpennen zwart	Staartpennen zwart	Staartpennen zwart
Borst:	Karmijnrood met aan beide zijden witte stippen	Bruin met aan beide zijden witte stippen	Karmijnrood met aan beide zijden witte stippen	Bruin met aan beide zijden witte stippen
Onderlijf:	Karmijnrood overgaand in bruin naar de aars.	Bruin iets lichter van kleur naar aars toe	Karmijnrood overgaand in bruin naar de aars.	Bruin iets lichter van kleur naar aars toe
Flanken:	Bruin met karmijnrode waas	Licht bruin met plaatselijk een licht rode waas	Rood, bruin doorschijnend	Licht bruin met plaatselijk een licht rode waas
Broek en pootinplant:	Bruin	Licht bruin	Licht bruin	Licht bruin
Onderstaart: Onderstaartdekveren:	Bruin, Zwartbruin.	Licht bruin, Licht bruin	Licht bruin, Licht bruin	Licht bruin, Licht bruin
Poten:	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig
Nagels:	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig
Snavel:	Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe	Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe	Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe	Bovensnavel rood, met aan de zijkanten zwarte basis, Ondersnavel rood , iets opgebleekt naar de snavel toe
Ogen: Oogranden:	Zwart, Oogranden geel geheel gesloten.	Zwart, Oogranden geel geheel gesloten.	Zwart, Oogranden geel geheel gesloten.	Zwart, Oogranden geel geheel gesloten.
Tekening:				
Stiptekening:	Wit, beide zijden gelijk	Wit, beide zijden gelijk	Wit, beide zijden gelijk	Wit, beide zijden gelijk
Teugel, wenkbrauw streep:	Karmijnrood	Karmijnrood	Karmijnrood	Karmijnrood

[Terug naar index](#)

Estrilda familie:

Napoleonnetje	<i>Estrilda troglodytus</i>
Sint-helanafazantje	<i>Estrilda astrild</i>
Teugelastrilde	<i>Estrilda rhodopyga</i>
Elfenastrilde	<i>Estrilda erythronotos</i>
Oranjekaakje	<i>Estrilda melpoda</i>
Zwartkapastrilde	<i>Estrilda atricappila</i>
Blauwgrijs roodstaartje	<i>Estrilda caerulescens</i>
Blauwgrijs zwartstaartje	<i>Estrilda perreini</i>
Abesijnse astrilde	<i>Coccygia quartinia</i>

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Napoleonnetje	Sint-helenafazantje	Teugelastrilde	Elfenastrilde
	<i>Estrilda troglodytes</i>	<i>Estrilda astrild</i>	<i>Estrilda rhodopyga</i>	<i>Estrilda erythronotos</i>
Formaat:	9 á 10 cm groot	10 à 12 cm	11 cm	12 á 13 cm
Kop, schedel en nek:	Bruin met licht roze waas	Bruin met dwarstekening	Bruin met beginnende dwarstekening	Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de snavel
Rug en vleugeldek:	Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas.	Bruin met dwarstekening	Bruin met duidelijke dwarstekening	Zwartbruin met fijne dwarstekening op bleek grijze ondergrond
Wangen en keel:	Crème met een roze waas	Licht grijsbruin met roze waas	Lichtbruin	Wangen zwart Keel zwartgrijs met fijne tekening
Vleugelpennen:	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin	Grove zebratekening op bleek grijze ondergrond
Stuit:	Zwart	Bruin met dwarstekening	Wijnrood	Rood
Bovenstaartdekveren:	Zwart	Bruin met dwarstekening.	Bruin met wijnrode buitenvlag	Rood
Staat:	Zwart, de buitenste veren hebben een witte zoom	Bruin met dwarstekening	Bruin met wijnrode buitenvlag	Zwart
Staartpennen:		Staartpennen donkerbruin	Staartpennen donkerbruin	Staartpennen zwart
Borst:	Licht bruin met zwakke dwarstekening en roze waas	Licht grijsbruin met een lichte dwarstekening en roze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Op de borst een vage zebratekening, naar de schouders toe komt er een rode roze gloed op liggen.
Onderlijf:	Lichtbruin met rozerood overgoten, anus is rood	Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt een rozerode buikstreep vanaf de borst tot aan de anus	Bruin	Voorste deel is rozerood overgaand in zwart
Flanken:	Lichtbruin met zwakke dwarstekening en roze waas	Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Rood
Broek en pootinplant:	Lichtbruin met een roze waas	Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Zwart
Onderstaartdekveren:	Crème met roze waas	Van donkerbruin tot zwartbruin	Bruin met dwarstekening en roze waas Staartpennen donkerbruin	Zwart met lichtgrijze waas
Poten:	Donkerbruin	Zwartbruin	Zwartbruin	Zwart
Nagels:	Donkerbruin	Zwartbruin	Zwartbruin	Zwart
Snavel:	Boven- en ondersnavel: rood.	Boven- en ondersnavel oranjerood	Zwart met rode snavelsnede	Loodkleurig naar snavelpunt toe zwart
Ogen:	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin	Zwarte iris met roodbruine rand
Tekening:				
Teugel:	Rood, loopt ver achter het oog	Rood, loopt ver achter het oog	Rood, loopt ver achter het oog	Zwart
Oogranden:	Grijsbruin	Grijs	Bruin	Zwart
Vleugeldekveren:	Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas	Licht grijsbruin met roze waas	Bruin met dwarstekening en wijnrode buitenvlag	Zwartbruin met zebratekening op bleek grijze ondergrond.

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Napoleonnetje	Sint-helenafazantje	Teugelastrilde	Elfenastrilde
	<i>Estrilda troglodytes</i>	<i>Estrilda astrild</i>	<i>Estrilda rhodopyga</i>	<i>Estrilda erythronotos</i>
Formaat:	9 à 10 cm groot	10 à 12 cm	11 cm	12 à 13 cm
Kop, schedel en nek:	Bruin met licht roze waas	Bruin met dwarstekening	Bruin met beginnende dwarstekening	Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de snavel
Rug en vleugeldek:	Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas.	Bruin met dwarstekening	Bruin met duidelijke dwarstekening	Zwartbruin met fijne dwarstekening op bleek grijze ondergrond
Wangen en keel:	Crème met een roze waas	Licht grijsbruin met roze waas	Lichtbruin	Wangen zwart Keel zwartgrijs met fijne tekening
Vleugelpennen:	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin	Grove zebratekening op bleek grijze ondergrond
Stuit:	Zwart	Bruin met dwarstekening	Wijnrood	Rood
Bovenstaartdekveren:	Zwart	Bruin met dwarstekening.	Bruin met wijnrode buitenvlag	Rood
Staart: Staartpennen:	Zwart, de buitenste veren hebben een witte zoom	Bruin met dwarstekening Staartpennen donkerbruin	Bruin met wijnrode buitenvlag Staartpennen donkerbruin	Zwart Staartpennen zwart
Borst:	Licht bruin met zwakke dwarstekening en roze waas	Licht grijsbruin met een lichte dwarstekening en roze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Op de borst een vage zebratekening, naar de schouders toe komt er een rode roze gloed op liggen.
Onderlijf:	Lichtbruin met rozerood overgoten, anus is rood	Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt een rozerode buikstreep vanaf de borst tot aan de anus	Bruin	Voorste deel is rozerood overgaand in zwart
Flanken:	Lichtbruin met zwakke dwarstekening en roze waas	Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Rood
Broek en pootinplant:	Lichtbruin met een roze waas	Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Zwart
Onderstaartdekveren:	Crème met roze waas	Van donkerbruin tot zwartbruin	Bruin met dwarstekening en roze waas Staartpennen donkerbruin	Zwart met lichtgrijze waas
Poten:	Donkerbruin	Zwartbruin	Zwartbruin	Zwart
Nagels:	Donkerbruin	Zwartbruin	Zwartbruin	Zwart
Snavel:	Boven- en ondersnavel: rood.	Boven- en ondersnavel oranje-rood	Zwart met rode snavelsnede	Loodkleurig naar snavelpunt toe zwart
Ogen:	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin	Zwarte iris met roodbruine rand
Tekening:				
Teugel:	Rood, loopt ver achter het oog	Rood, loopt ver achter het oog	Rood, loopt ver achter het oog	Zwart
Oogranden:	Grijsbruin	Grijs	Bruin	Zwart
Vleugeldekveren:	Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas	Licht grijsbruin met roze waas	Bruin met dwarstekening en wijnrode buitenvlag	Zwartbruin met zebratekening op bleek grijze ondergrond.

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Napoleonnetje	Sint-helenafazantje	Teugelastrilde	Elfenastrilde
	<i>Estrilda troglodytes</i>	<i>Estrilda astrild</i>	<i>Estrilda rhodopyga</i>	<i>Estrilda erythronotos</i>
Formaat:	9 à 10 cm groot	10 à 12 cm	11 cm	12 à 13 cm
Kop, schedel en nek:	Bruin met licht roze waas	Bruin met dwarstekening	Bruin met beginnende dwarstekening	Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de snavel
Rug en vleugeldek:	Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas.	Bruin met dwarstekening	Bruin met duidelijke dwarstekening	Zwartbruin met fijne dwarstekening op bleek grijze ondergrond
Wangen en keel:	Crème met een roze waas	Licht grijsbruin met roze waas	Lichtbruin	Wangen zwart Keel zwartgrijs met fijne tekening
Vleugelpennen:	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin	Grove zebratekening op bleek grijze ondergrond
Stuit:	Zwart	Bruin met dwarstekening	Wijnrood	Rood
Bovenstaartdekveren:	Zwart	Bruin met dwarstekening.	Bruin met wijnrode buitenvlag	Rood
Staart: Staartpennen:	Zwart, de buitenste veren hebben een witte zoom	Bruin met dwarstekening Staartpennen donkerbruin	Bruin met wijnrode buitenvlag Staartpennen donkerbruin	Zwart Staartpennen zwart
Borst:	Licht bruin met zwakke dwarstekening en roze waas	Licht grijsbruin met een lichte dwarstekening en roze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Op de borst een vage zebratekening, naar de schouders toe komt er een rode roze gloed op liggen.
Onderlijf:	Lichtbruin met rozerood overgoten, anus is rood	Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt een rozerode buikstreep vanaf de borst tot aan de anus	Bruin	Voorste deel is rozerood overgaand in zwart
Flanken:	Lichtbruin met zwakke dwarstekening en roze waas	Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Rood
Broek en pootinplant:	Lichtbruin met een roze waas	Lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas	Bruin met zwakke dwarstekening	Zwart
Onderstaartdekveren:	Crème met roze waas	Van donkerbruin tot zwartbruin	Bruin met dwarstekening en roze waas Staartpennen donkerbruin	Zwart met lichtgrijze waas
Poten:	Donkerbruin	Zwartbruin	Zwartbruin	Zwart
Nagels:	Donkerbruin	Zwartbruin	Zwartbruin	Zwart
Snavel:	Boven- en ondersnavel: rood.	Boven- en ondersnavel oranje-rood	Zwart met rode snavelsnede	Loodkleurig naar snavelpunt toe zwart
Ogen:	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin	Zwarte iris met roodbruine rand
Tekening:				
Teugel:	Rood, loopt ver achter het oog	Rood, loopt ver achter het oog	Rood, loopt ver achter het oog	Zwart
Oogranden:	Grijsbruin	Grijs	Bruin	Zwart
Vleugeldekveren:	Bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas	Licht grijsbruin met roze waas	Bruin met dwarstekening en wijnrode buitenvlag	Zwartbruin met zebratekening op bleek grijze ondergrond.

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Oranjekaakje	Zwartkap astrilde	Blauwgrijs roodstaartje	Blauwgrijs zwartstaartje
	<i>Estrilda melpoda</i>	<i>Estrilda atricapilla</i>	<i>Estrilda caerulea</i>	<i>Estrilda perreini</i>
Formaat:	10 cm	11 cm	10 cm	9 cm
Kop, schedel en nek:	Donkergrijs	Zwart	Grijs iets lichter naar de snavel toe	Grijs iets lichter naar de snavel toe
Kin:	Donkergrijs	Grijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs
Rug en vleugeldek:	Bruin	Asgrijs overgaand in donkergrijs met zwarte dwarstekening	Grijs	Grijs
Wangen en keel:	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Lichtgrijs
Vleugelpennen:	Donkerbruin	Zwartgrijs	Grijs	Grijs
Vleugeldekveren:	Bruin	Donkergrijs	Grijs	Grijs
Stuit:	Karmijnrood	Rood met zwarte rand	Karmijnrood	Karmijnrood
Bovenstaartdekveren:	Donkerbruin met karmijnrode buitenvlag	Rood	Karmijnrood	Zwart
Staat: Staatpennen:	Donkerbruin met karmijnrode buitenvlag	Zwart	Karmijnrood	Zwart
Borst:	Grijs	Asgrijs overgaand in donkergrijs		Lichtgrijs
Onderlijf:	Grijs, vanaf de anus gebroken wit met oranje gele vlek	Zwartgrijs	Grijs overgaand in zwartgrijs naar de aarsstreek toe	Grijs overgaand in zwartgrijs naar de aarsstreek toe
Flanken:	Grijs met bruine waas	Rood	Grijs	Grijs
Broek en pootinplant:	Grijs met bruine waas	Zwart met donkergrijze waas	Grijs overgaand in karmijnrood	Grijs overgaand in karmijnrood
Onderstaartdekveren:	Licht grijs	Zwart	Dekveren karmijnrood Onderstaart grijsbruin	Dekveren karmijnrood Onderstaart grijsbruin
Poten:	Bruin	Zwart	Donkerbruin	Donkerbruin tot zwart
Nagels:	Bruin	Zwart	Donkerbruin	Donkerbruin tot zwart
Snavel:	Rood	Bovensnavel zwart Ondersnavel zwart vanaf de inplant tot de snavelsnede rood	Zwart naar de snavelinplant toe karmijnrood	Blauwgrijs naar de snavelsnede zwart
Ogen:	Donkergrijs	Zwart	Donkerbruin	Donkerbruin
Tekening:				
Teugel:	Oranjerood	Zwart	Zwart tot achter het oog	Zwart tot achter het oog
Wangvlek:	Oranjerood	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Oogranden:	Grijs	Zwart	Grijs	Zwart iets opgebleekt rond het oog
Vleugeldekveren:	n.v.t.	Donkergrijs met zwarte gebogen dwarstekening	n.v.t.	n.v.t.
Broektekening:	n.v.t.		Minimaal twee witte stippen	n.v.t.

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Abbessijnse astrilde	Geelbuikastrilde		
	<i>Coccopygia melanotus quartinia</i>	<i>Coccopygia quartinia</i>		
Formaat:	10 cm	10cm		
Kop, schedel en nek:	Donkergrijs			
Rug en vleugeldek:	Olijfgroen met lichte dwarstekening			
Wangen en keel:	Wangen donkergrijs Keel lichtgrijs			
Vleugelpennen:	Grijsbruin met olijfgroene buitenvlag			
Vleugeldekveren:	Olijfgroen			
Stuit:	Bruinrood			
Bovenstaartdekveren:	Bruinrood,			
Staat:	Zwart			
Staatpennen:	Zwart			
Borst:	Grijs			
Onderlijf:	Dof okergeel en anus			
Flanken:	Licht olijfgroen met zwakke dwarstekening			
Broek en pootinplant:	Olijfgroen			
Onderstaartdekveren:	Dof okergeel			
Onderstaart:	Grijsbruin			
Poten:	Zwart			
Nagels:	Zwart			
Snavel:	Bovensnavel zwart, ondersnavel rood			
Ogen:	Bruin			
Tekening:				
Teugel:	n.v.t.			
Oogranden:	Lichtgrijs			
Vleugeldekveren:	n.v.t.			

[Terug naar index](#)

De Hypargos familie:

Rode druppelastrilde *Hypargos niveoguttatus*

Herkomst: Kenia, Tanzania, Rwanda, Burundi, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Z.W. Dem. Rep. Congo (Zaire), Zambia en Angola.

Grootte: 12-13 cm

Rose druppelastrilde *Hypargos margaritatus* (parelastrilde)

Herkomst: Z. Mozambique, O. Zimbabwe en O. Zuid-Afrika

Grootte: 12 – 13 cm

[Terug naar index](#)

Herkenning omschrijving:

Soort:	Rode druppelastrilde man	Rode druppelastrilde pop	Bruine druppelastrilde man en pop	
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	<i>Clytospiza monteiri</i>	
Formaat:	Grootte: 12-13 cm	Grootte: 12-13 cm	Grootte: 13 cm	
Kop, schedel en nek:	Bruin	Bruin	Grijs	
Rug en vleugeldek:	Warm bruin	Bruin	Grijsbruin	
Wangen en keel:	Rood	Bruin	Grijs met rood vlekje	
Vleugelpennen:	Warm bruin	Bruin	Donkerbruin	
Vleugeldekveren:	Warm bruin	Bruin	Bruin met licht grijze waas	
Stuit:	Rood	Rood	Scharlaken rood	
Bovenstaartdekveren:	Rood	Rood	Rood	
Staartpennen:	Zwart met rode zoom	Zwart met rode zoom	Donkerbruin	
Borst:	Rood	Bruinrood	Kastanjebruin met witte stippen	
Onderlijf:	Zwart	Zwartgrijs	Kastanjebruin met witte stippen	
Flanken:	Zwart met witte stippen	Zwart	Kastanjebruin met witte stippen	
Onderstaartdekveren:	Zwart	Bruin	Donkerbruin	
Poten:	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig	Hoornkleurig	
Nagels:	Donker vleeskleurig	Donker vleeskleurig	Donker hoornkleurig	
Snavel:	Loodgrijs	Loodgrijs	Donkergrijs bij inplant wat lichter grijs	
Ogen:	Donkerbruin	Donkerbruin	Donkerbruin	
Tekening:				
Keelvlak:	n.v.t.	n.v.t.	Man: rood Pop: wit	
Teugel:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Oogranden:	Wit	Wit	Lichtgrijs	
Flanktekening:	Witte ronde stippen	Witte ronde stippen	Witte ronde stippen	
Algemeen:			Pop is keurtechnisch gelijk aan de man m.u.v. het witte keelstipje.	

[Terug naar index](#)