

Standaard:

Europese Cultuurvogels

Deel 3: Zaadeters en VI-vogels

Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

© Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Uitgave: September 2015-2024

Revisie voorjaar 2024

INDEX

Inhoud

INDEX	2	Kleurkop Siamees	15	Pastel	31
Voorwoord	5	Witte zwartoog	15	Kleurstandaard: Spreeuw man en pop	33
Voorwoord 2018-2020	7	Gepareld	15	Pastel bruin	33
Voorwoord 2018-2020	7	Zanglijster (<i>Turdus philomelos</i>)	17	Satinet	33
Voorwoord 2024	7	Kleurstandaard: Zanglijster man en pop	19	Phaeo	33
Merel (<i>Turdus merula</i>)	9	Wildkleur	19	Wit (zwartoog)	33
Kleurstandaard: Merel man :	11	Bruin	19	Zwarte spreeuw (<i>Sturnus unicolor</i>)	35
Wildkleur	11	Satinet	19	Kleurstandaard Zwarte spreeuw man en pop: ..	36
Bruin	11	SL ino	19	Rose spreeuw (<i>Sturnus roseus</i>)	37
Agaat	11	Grote lijster (<i>Turdus viscivorus</i>)	21	Kleurstandaard Rose spreeuw man en pop:	38
Pastel	11	Kleurstandaard: Grote lijster man en pop	23	Ekster (<i>Pica pica</i>)	39
Kleurstandaard: Merel pop :	12	Wildvorm man en pop	23	Kleurstandaard: Ekster man en pop	40
Wildkleur	12	Koperwiek (<i>Turdus iliacus</i>)	24	Wildkleur	40
Bruin	12	Kleurstandaard: Koperwiek man en pop	25	Bruin	40
Agaat	12	Wildvorm man en pop	25	Pastel	40
Pastel	12	Kramsvogel (<i>Turdus pilarus</i>)	26	Gaai (<i>Garrulus glandarius</i>)	42
Kleurstandaard: Merel man :	14	Kleurstandaard: Kramsvogel man en pop	27	Kleurstandaard: Gaai man en pop	43
Satinet	14	Wildvorm man	27	Wildkleur	43
Albino	14	Wildvorm pop	27	Opaal	43
Kleurkop Siamees	14	Beflijster (<i>Turdus torquatus</i>)	28	Albino	43
Witte Zwartoog	14	Kleurstandaard: Beflijster man en pop	29	Bijeneter (<i>Merops apiaster</i>)	45
Gepareld	14	Wildvorm man	29	Kleurstandaard: Bijeneter man en pop	46
Kleurstandaard: Merel pop:	15	Wildvorm pop	29	Wildkleur	46
Satinet	15	Spreeuw (<i>Sturnus vulgaris</i>)	30	Hop (<i>Upupa epops upupiformes</i>)	47
Albino	15	Kleurstandaard: Spreeuw man en pop	31	Kleurstandaard: Hop man en pop	48
		Wildkleur	31	Wildkleur	48
		Bruin	31	Scharrelaar (<i>Coracias garrulus</i>)	49

Kleurstandaard Scharrelaar :	50	Italiaanse gele kwikstaart	68	Bonte vliegenvanger	84
Notenkraker (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	51	Iberische gele kwikstaart	69	Kleine vliegenvanger.....	84
Kleurstandaard Notenkraker man en pop:	52	Russische gele kwikstaart	69	Withals vliegenvanger	85
Pestvogel (<i>Bombycilla garrulus</i>).....)	53	Citroen kwikstaart	70	Grauwe vliegenvanger	85
Kleurstandaard: Pestvogel man en pop	54	Mezen	71	Klapeksters en klauwieren	86
Wildkleur.....	54	Algemene Informatie bij de mezen	71	86
Kauw (<i>Corvus m. monedula</i>).....)	56	Koolmees.....	71	Klapekster	86
Kleurstandaard: Kauw man en pop.....)	57	Zwarte mees	71	Kleine klapekster.....	86
Wildkleur.....	57	Pimpelmees	72	Grauwe klauwier	87
Bonte Kraai (<i>Corvus corone cornix</i>).....)	58	Azuurmees	72	Roodkop klauwier	87
Kleurstandaard: Bonte kraai.....)	59	Kuifmees.....	73	Rietzanger.....	88
Wildkleur.....	59	Glanskopmees.....	73	Waterrietzanger	88
Zwarte Kraai (<i>Corvus c. corone</i>)	60	Matkopmees	74	Bosrietzanger	89
Kleurstandaard: Zwarte Kraai	61	Staartmees	74	Kleine karekiet	89
Wildkleur.....	61	Baardman	76	Grote karekiet	90
Roek (<i>Corvus frugileus</i>)	62	Algemene Informatie Rood-, blauwborsten en		Cites rietzanger	90
Kleurstandaard: Roek man en pop	63	nachtegalen:	78	Sprinkhaan rietzanger.....	91
Wildkleur.....	63	Roodborst	78	Kleine sprinkhaan rietzanger	91
Kwikstaarten	64	Roodgesternde blauwborst.....	79	Snor.....	92
Algemene Informatie bij de kwikstaarten	64	Witgesternde blauwborst	79	Krekelzanger	92
Witte kwikstaart	64	Noorse nachtegaal	80	Waaierstaart rietzanger (Graszanger)	93
Rouwkwikstaart	65	Nachtegaal	80	Fitis.....	93
Grote gele kwikstaart	66	Roodkeel nachtegaal.....	81	Grauwe fitis	94
Gele kwikstaart.....	66	Roodstaarten	82	Tjiftjaf.....	94
Balkan gele kwikstaart	67	Algemene Informatie bij de roodstaarten	82	Fluiter	95
Engelse gele kwikstaart	67	Zwarte roodstaart	82	Zwartkop	95
Noorse gele kwikstaart.....	68	Gekraagde roodstaart.....	83	Kleine zwartkop (<i>Sylvia melanocephala</i>)	96
		Algemene Informatie bij de vliegenvangers	84		

Kleurstandaard Kleine zwartkop:	97	Grote pieper	107	Boomklever	119
Tuinfluiters	98	Graspieper	108	Boomkruiper	120
Spotvogel	98	Duinpieper	108	Leeuweriken	121
Orpheus spotvogel	99	Roodkeelpieper	109	Algemene Informatie bij de leeuweriken	121
Blauwstaartje (<i>Tarsiger cyanurus</i>)	100	Waterpieper	109	Kuifleeuwerik	121
Omschrijving Blauwstaartje:	101	Oeverpieper	110	Veldleeuwerik	122
Algemene Informatie heg- en grasmussen	102	Paapjes en Tapuiten	111	Boomleeuwerik	122
Heggemus	102	Algemene informatie paapjes en tapuiten	111	Strandleeuwerik	123
Alpen heggemus	103	Roodborst tapuit	112	Kalender leeuwerik	123
Grasmus	103	Tapuit (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	113	Kleine kortteen leeuwerik	124
Braamsluiper	104	Omschrijving Tapuit:	114	Wielewaal	125
Orpheus grasmus	104	Isabel tapuit (<i>Oenanthe isabellina</i>)	115	Draaihals (<i>Jynx linnaeus</i>)	126
Sperwer grasmus	105	Omschrijving Isabel tapuit	116	Kleurstandaard Draaihals:	127
Baardgrasmus	105	Europees paapje	117		
Gebilde grasmus	106	Goudhaantje	118		
Algemene informatie bij de piepers	107	Vuurgoudhaantje	118		
Boompieper	107	Winterkoning	119		

[Terug naar index](#)

Voorwoord

Bij het verschijnen van de standaard Europese Cultuur Vogels in 1984

Tot voor kort zagen wij in Nederland maar sporadisch Europese wildzangvogels op de tentoonstellingen. Voor het verkrijgen van eigendomsbewijzen, tevens vervoersvergunning, kwamen in hoofdzaak alleen de liefhebbers in aanmerking, die laatstelijk in 1955 hun bij de Vogelwetgeving toegestane "kooivogels" hadden laten voorzien van een speciale daartoe bestemde vaste pootring.

Door natuurlijk verloop werd de 'groep 1955' steeds kleiner en daarmee in overeenstemming het aantal inzendingen op de tentoonstellingen. Een allesbehalve bevredigende toestand. Dit niet alleen voor de liefhebber/kweker, maar ook voor de tentoonstellingsbezoeker, die ook wel eens een Europese vogel van dichtbij wilde zien.

Door een wat soepeler beleidsvoering met betrekking tot het verstrekken van een vergunning door het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, thans Landbouw en Visserij, hebben we op de grotere tentoonstellingen al kunnen constateren, dat we niet meer over een sporadisch voorkomen behoeven te spreken. Te verwachten is, dat het aantal inzendingen jaarlijks zal toenemen.

De gunstige ontwikkeling in deze tak van sport in aanmerking nemende, is het te voorzien, dat de keurmeesters -ook op de afdelingstentoonstellingen- steeds meer Europese "kooivogels" ter beoordeling aangeboden krijgen. Op grond daarvan heeft de Technische Commissie gemeend voor de betreffende toegestane "kooivogels" standardeisen op te stellen, met de daarbij behorende keurtechnische gegevens. Ook voor wat betreft de keuring van hun bastaarden worden de benodigde richtlijnen gegeven. In de standaard worden tevens enkele andere wildzangsoorten opgenomen, die in Nederland niet, doch in de ons omringende landen wel toegelaten zijn. We beperken ons echter tot de daar meest voorkomenden. De opname daarvan is noodzakelijk omdat de Nederlandse C.O.M. keurmeesters ter gelegenheid van een Wereldtentoonstelling in het buitenland ook die vogels ter keuring aangeboden krijgen.

De Technische Commissie Tropische vogels. Maart 1984.

[Terug naar index](#)

Bij het verschijnen van de standaard Europese Cultuurvogels in 1996

Bij het goed functioneren van een standaard hoort een periodieke herziening. Niet alleen de vogelliefhebberij is voortdurend in beweging. Er komen nieuwe kleurslagen bij, dan wel blijkt in de praktijk, dat al beschreven kleurslagen niet geheel juist zijn omschreven of zich verder hebben ontwikkeld. Ook de wetgeving is aan verandering onderhevig.

Enkele jaren geleden werd de "K-ringen regeling" door het huidige Ministerie van Landbouw en Visserij opnieuw door een voor ons zeer acceptabele regeling vervangen. Iedere bonafide liefhebber, boven de 18 jaar, kan thans onder bepaalde voorwaarden voor de in zijn bezit zijnde eigen kweek "Cultuurvogels"

Vink, Putter, Sijs, Kneu, Groenling, Geelgors, Merel

Mits geringd met een van bondswege verstrekte, goed passende, gesloten voetring waarop is vermeld:

- het kweeknummer van de betrokken vogelhouder,
- het jaartal
- een volgnummer

Een vervoersvergunning verkrijgen. De nieuwe vervoersvergunning dekt niet alleen het vervoer van de daarop vermelde vogels naar en van de tentoonstellingen, maar ook het vervoer van één of meerdere van de daarop vermelde vogels naar een nieuwe eigenaar. Een voor de "Europese Cultuurvogel", voorheen "wildzangvogel" genoemd, zeer positief uitgevallen wijziging dus.

Bij de indiening van de wijzigingsvoorstellen voor de "Vogelwet '36" is er bij de overheid op aangedrongen het woord "kooivogel" te vervangen door het woord "Cultuurvogel". Met Cultuurvogel wordt namelijk beter aangegeven dat het hier handelt om vogels die afwijken van hun soortgenoten uit de natuur.

Via een motie van D'66 is dat ook gebeurd en ook de N.B.v.V. is er al eerder toe overgegaan op advies van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels in haar artikelen, aanduidingen en vraagprogramma het woord "kooivogel" te vervangen door "Cultuurvogel".

We spreken dan ook over de nieuwe standardeisen voor Europese Cultuurvogels.

In september 1994 ging een aantal wetswijzigingen met betrekking tot de Europese Cultuurvogels in. Zo werd het aantal vogels, dat men mocht houden, uitgebreid met

de Goudvink, Barmsijs, Ringmus en Zanglijster. Ook de destijds voorwaardelijk onbeschermde Spreeuw en de onvoorwaardelijk onbeschermde Huismus werden gerekend tot de Europese Cultuurvogels. Tevens werd bepaald, dat alle Europese Cultuurvogels moeten zijn voorzien van een vaste voetring van een bepaalde maat, met daarop een letter, die de maat van de ring weergeeft. Daarnaast dient de ring een kweeknummer van de kweker, een volgnummer en het jaartal weer te geven.

Europese Cultuurvogels, die van een dergelijke ring zijn voorzien, mag men houden, vervoeren, tentoonstellen etc. Hieraan is verder geen vergunningseis verbonden.

Volledigheidshalve zijn tevens standaardbeschrijvingen gemaakt van veel soorten Europese Cultuurvogels, die in Nederland niet, maar in het buitenland wel als Cultuurvogel zijn toegestaan. Deze zijn in deze standaard opgenomen.

De behandeling daarvan is noodzakelijk, omdat de Nederlandse C.O.M.-keurmeester ter gelegenheid van een wereldtentoonstelling in het buitenland ook deze vogels naar waarde moet kunnen beoordelen. Deze standaard wil echter meer zijn dan louter een beschrijving van vogelsoorten. Vandaar dat ook een overzicht wordt gegeven van de ondersoorten, van elke soort en de opgetreden mutaties, voor zover die bekend zijn. Verder is aandacht besteed aan de vogelterminologie, waardoor het eenvoudiger wordt geconstateerde afwijkingen tijdens de keuring bij de juiste naam te noemen.

Zoals elke standaard zal ook deze van tijd tot tijd herzien en/of aangevuld moeten worden, wat geen bezwaar mag zijn, aangezien de uitgave geschiedt in een losbladig systeem.

Deze geheel herziene standaard voor de Europese cultuurvogels is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Technische Commissie van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels, die op haar beurt samenwerkt met de Werkgroepen Europese Vogels (W.E.V.) in België. Voor deze inbreng willen wij genoemde TC langs deze weg hartelijk dank zeggen.

Tenslotte spreekt de TC. de hoop uit, dat deze (herziene) standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen in de kweek van de Europese Cultuurvogels.

Bergen op Zoom, Januari 1996.

De Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten.

Bij het verschijnen van de standaard Europese Cultuurvogels in 2006

Amper 10 jaar na het verschijnen van de volledig herziene versie "Europese Cultuurvogels" is het goed om opnieuw een volledig aangepaste versie te publiceren.

De wetgeving rond het houden van Europese Cultuurvogels is op 1 april 2002 met de inwerkingtreding van de nieuwe Flora en Fauna wet verder versoepeld. Alle in Europa voorkomende vogels mogen gehouden, gekweekt, verhandeld en geshowd worden, mits voorzien van een voor de soort bestemde passende gesloten voetring uitgegeven door ondermeer de N.B.v.V. Deze versoepeling van de wetgeving is voor de houders van Europese Cultuurvogels een geweldige stimulans geweest. Tal van soorten die tot nu toe niet of nauwelijks gehouden en gekweekt werden, worden de laatste jaren door kwekers geshowd. Door de veelvuldige kweek heeft ook een verdere uitbreiding van mutaties en de daarmee verbonden kleurkweek plaatsgevonden. In 2006 verschijnt dan ook een nieuwe standaard Europese Cultuurvogels, in drie delen.

Het steeds verder uitbreiden van de standardeisen heeft de KMV-TP (Keurmeester Vereniging Tropische vogels en Parkietachtige) doen besluiten de standardeisen een andere lay-out te geven. In afwijking tot eerder uitgebrachte standardeisen zullen kleurslagen niet langer afzonderlijk worden beschreven maar worden vanaf heden opgenomen in een overzichtelijke matrixvorm.

Ook wordt niet langer in iedere standaardeis uitgebreid ingegaan op de erfelijkheid gedragingen en uiterlijke gevolgen van mutaties. Voor deze aspecten wordt verwezen naar een speciaal opgestelde Mutatiestandaard die voor alle soorten gaat gelden.

Ook nu weer is deze geheel herziene standaard voor de Europese cultuurvogels is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Technische Commissie van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels, die onder de bezielende drive van keurmeester Piet de Dreu de inhoudelijke informatie heeft verstrekt voor deze nieuwe versie. Voor deze inbreng willen wij genoemde TC. langs deze weg hartelijk dank zeggen.

Tenslotte spreekt de KMV de hoop uit, dat deze (herziene) standaard stimulerend mag blijven werken op de ontwikkelingen in de kweek van de Europese Cultuurvogels.

In dit tweede deel treft u de standardeisen aan van de Sijs, Barmsijs, Putter, Groenling en Goudvink.

Juli 2006.

De Keurmeester Vereniging Tropische vogels en Parkieten.

[Terug naar index](#)

Bij het verschijnen van de standaard Europese Cultuurvogels in 2012

De lay-out in matrixvorm zoals deze met het verschijnen van de standaard in 2006 werd ingevoerd heeft geleid tot een meer detaillistische zienswijze. Daarnaast waren ook enkele fouten in de versie 2006 geslopen. In de versie 2012 is aan beide aspecten volop aandacht gegeven. Ook zijn ook een aantal kleurslagen toegevoegd aan de standaard zo maken bij de goudvink de combinaties met geel nu deel uit van de standaard. Bij de putter is de mutatiennaam aminet doorgevoerd. De topaas mutatie bij de sijs die nog zeer beperkt gekweekt wordt is nog niet opgenomen in de standaard. Ook de beoordeling van de sijs man zonder beftekening is aangepast. Tenslotte is de wetenschappelijk naam van de citroensijs aangepast aan de huidige zienswijze.

Ook nu weer is de standaard voor de Europese cultuurvogels tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Technische Commissie van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels, die informatie heeft verstrekt voor deze nieuwe versie. Voor deze inbreng willen wij genoemde T.C. langs deze weg hartelijk dank zeggen.

Tenslotte spreekt de KMV de hoop uit, dat deze (herziene) standaard stimulerend mag blijven werken op de ontwikkelingen in de kweek van de Europese cultuurvogels.

December 2012.

De Keurmeester Vereniging Tropische vogels en Parkieten.

Voorwoord 2018-2020

De lay-out in matrixvorm is nu in het zgn. tablet vorm gemaakt zodat op een scherm alle benodigde informatie op een pagina te lezen is.

Hyperlinks aangebracht, index aangepast.

Ringmaten verwijderd met verwijzing naar de vogelindex op de website NBvV.

De TC Tropische vogels en Parkieten

Utrecht voorjaar 2020

Voorwoord 2018-2020

Toegevoegd matrix man en pop merel gaat kleurslag.

Utrecht zomer 2023

Voorwoord 2024

Toegevoegd kleuromschrijvingen van:

Zwarte spreeuw

Rose spreeuw

Blauwstaartje

Kleine zwartkop

Tapuit

Isabel tapuit

Draaihals

Scharrelaar

Notenkraker

In samenwerking met de speciaalclub SEC

TC Tropen en Parkieten

Utrecht Zomer 2023

[Terug naar index](#)

Merel (*Turdus merula*)

Algemene Informatie

De merel hoort tot het geslacht **Turdidae**, de grote familie der lijsterachtigen. Van de 16 ondersoorten die de merel telt, wordt alleen de nominaatvorm (***Turdus merula merula***) in onze omgeving aangetroffen. De merel is in Nederland een algemene broedvogel. De hier broedende merels zijn grotendeels standvogels. Een klein deel trekt in de herfst naar het zuiden. Ook in de wintermaanden komen verplaatsingen, onder invloed van de koude voor. De uit het noorden wegtrekkende merels zijn hier wintergast en overwinteraars.

Ondersoorten

De ondersoorten zijn:

Merel (*Turdus merula*)

Algemene Informatie

De merel hoort tot het geslacht Turdidae, de grote familie der lijsterachtigen. Van de 16 ondersoorten die de merel telt, wordt alleen de nominaatvorm (*Turdus merula merula*) in onze omgeving aangetroffen. De merel is in Nederland een algemene broedvogel. De hier broedende merels zijn grotendeels standvogels. Een klein deel trekt in de herfst naar het zuiden. Ook in de wintermaanden komen verplaatsingen, onder invloed van de koude voor. De uit het noorden wegtrekkende merels zijn hier wintergast en overwinteraars.

Ondersoorten

De ondersoorten zijn:

T. m. merula:	West-Europa.
T. m. caberae:	Madera en West-Canarische eilanden.
T. m. aterrimus:	Zuidoost Europa en Kaukasus.
T. m. insularum:	Kreta, Rhodos en Mytilene eilanden.
T. m. syriacus:	Zuid-Turkije, Midden-Oosten en Iran.
T. m. intermedius:	Centraal Azië. Afghanistan en Zuid-Irak.
T. m. maximus:	Pakistan, India, Zuid-Oost en Tibet.
T. m. bourdilloni:	Zuid India. .
T. m. azorensis:	Azoren.
T. m. marueticus:	Marokko tot Tunesië.
T. m. sowerbyi:	Szechwan.
T. m. mandarinus:	weichow.
T. m. nigropileus:	Zuid-Centraal India.
T. m. spenceri:	Oost India.
T. m. simillimus:	Zuid-Oost India.
T. m. kinnisii:	Sri-Lanka

Erfelijkheid en veerstructuur

In de gehele bevedering van de merel treffen wij eumelanine en phaeomelanine aan. Bij de man heeft het eumelanine de overhand, terwijl dat bij de pop het phaeomelanine is. In de bevedering van de merel bevindt zich geen carotenoïde, dit wordt wel aangetroffen in de snavel en oogringen.

Fysieke standaard

Formaat:

De ideale merel moet een forse indruk geven en moet 25 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De merel is een robuuste vogel, vol van type. Van opzij gezien moet de borst-buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:

Een goed getrainde merel dient rustig op stok te zitten. De stand van het lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45° en iets gedrukt. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp te worden gedragen, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Smalle, 3 cm lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

[Terug naar index](#)

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen.
Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

De tekeningonderdelen bij de merel man zijn beperkt, de merel man wordt daarom gekeurd in schaal 2 van het gele keurbriefje. Tekeningonderdelen van de merel man zijn:

- Vleugelpennen: De vleugelpennen tonen een smalle omzoming.
- Vleugeldekveren: De vleugeldekveren tonen een smalle omzoming.
- Staartpennen: De buitenvlag van de staartpennen laten een omzoming zien.
- Oogring: een gesloten ring rond het oog.
-

Naast deze tekening toont de merel pop ook nog de volgende tekeningonderdelen.
Waardoor de pop in schaal 1 van het gele keurbriefje wordt gekeurd.

- Kin: Op de kin bevindt zich een onderbroken lengtebestreping.
- Keel en borst: Op de keel en borst een onderbroken lengtebestreping, w
wat het aanzien heeft van schubben.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de gehele bevedering van de merel treffen wij eumelanine en phaeomelanine aan.
Bij de man heeft het eumelanine de overhand, terwijl dat bij de pop het phaeomelanine is.
In de bevedering van de merel bevindt zich geen carotenoïde, dit wordt wel aangetroffen
in de snavel en oogringen.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Merel man :

Kleurslag	Wildkleur	Bruin	Agaat	Pastel
Kleur:			Herkenning omschrijving	
Kop en masker	Diep glanzend zwart	Diep warmbruin	Diep glanzend zwart	Grijs, kin lichtgrijs
Nek, mantel, rugdek stuit, keel, borst, buik, en aarsstreek	Diep glanzend zwart	Diep warmbruin	Diep glanzend zwart	Lichtgrijs
Vleugelpennen	Zwart	Bruin	Donkergrijs	Lichtgrijs
Vleugeldekveren	Zwart	Bruin	Donkergrijs	Lichtgrijs
Staartpennen	Zwart	Bruin	Donkergrijs	Lichtgrijs
Bovenstaart dekveren	Zwart	Warmbruin	Donkergrijs	Lichtgrijs
Onderstaart dekveren	Zwart	Warmbruin	Zwart	Lichtgrijs
Poten	Zwart	Bruin	Zwart	Vleeskleurig
Nagels	Zwart	Bruin	Zwart	Hoornkleurig
Snavel	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwartbruin	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:				
Omzoming alle vleugelpennen	Grijze buitenvlag	Crème	Lichtgrijze buitenvlag	Kleurloos
Smalle omzoming Vleugeldekveren	Grijs	Licht crème	Lichtgrijs	Kleurloos
OmzomingBuitenvlaggen staartpennen	Grijs.	Crème	Lichtgrijs	Grijs
Oogring	Geel	Geel	Geel	Geel

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Merel pop :

Kleurslag	Wildkleur	Bruin	Agaat	Pastel
Kleur:			Herkenning omschrijving	
Kop en masker	Donkerbruin	Lichtbruin	Leigrijs	Grijsbruin
Kin	Crème	Crème	Vuilwit	Lichtgrijs, op lichtcrème ondergrond.
Nek	Mat donkerbruin	Lichtbruin	Leigrijs	Grijsbruin
Mantel / rugdek	Donkerbruin	Lichtbruin	Leigrijs	Grijsbruin
Borst, buik, flanken, dijen en aarsstreek	Donkerbruin, iets lichter dan het rugdek	Warmbruin bewaasd Buik, flanken en dijen: Crèmekleurig Aarsstreek: Diepbruin	Vuilwit	Lichtgrijs, op crème ondergrond Aarsstreek: Opgebleekt bruin, met grijze waas
Stuit	Mat donkerbruin	Bruin	Leigrijs	Grijsbruin
Vleugelpennen	Mat donkerbruin	Bruin	Donkergrijs	Grijsbruin
Vleugeldekveren	Matbruin	Warm diepbruin	Donkergrijs	Grijsbruin
Staartpennen	Bruin	Bruin	Donkergrijs	Grijsbruin
Bovenstaart dekveren	Mat donkerbruin	Bruin	Donkergrijs	Grijsbruin
Onderstaart dekveren	Mat donkerbruin	Bruin	Grijs	Grijsbruin
Poten	Donkerbruin	Donker vleeskleurig	Zwart	Vleeskleurig
Nagels	Zwartbruin	Donker hoornkleurig	Zwart	Hoornkleurig
Snavel	Aan de basis geel, overgaand in bruin	Aan de basis geel, overgaand in bruin	Aan de basis gebroken wit, overgaand in grijs	Aan de basis geel, overgaand in lichtbruin
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwartbruin	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:				
Lengtebestreping kin	Donkerbruin, op een crème ondergrond	Lichtbruin, op een crèmekleurige ondergrond	Donkergrijs, op een vuilwitte ondergrond	Bruingrijs, op een licht crèmekleurig ondergrond met lichtgrijze waas
Oogstreep	Licht kastanjebruin	Crèmekleurig	Vuilwit	Lichtgrijs
Keel- en borstbevedering omzoomt, wat een geschubd aanzien geeft	Kastanjebruin	Roodbruin	Donkergrijs	Opgebleekt bruingrijs
Omzoming vleugelpennen	Grijs	Crème	N.v.t.	Kleurloos
Omzoming vleugeldekveren	Grijs	Crème	N.v.t.	Kleurloos
Omzoming Staartpennen	Grijs	Crème	N.v.t.	Lichtgrijs
Omzoming buitenvlaggen staartpennen	Grijs	Crème	N.v.t.	Lichtgrijs
Oogring	Vaag geel	Vaag geel	Vaag geel	Vaag geel

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Merel man en Pop:

Wildkleur	Jonge merels, die nog het jeugdkleed bezitten, zijn lichter van kleur en duidelijker gevlekt dan de volwassen pop. Jonge merel mannen bezitten het eerste jaar nog niet de diep zwarte lichaamskleur, vooral in de vleugelpennen zien we nog een bruine waas. De diepste gekleurde merel mannen genieten de voorkeur. De schubtekening bij de poppen, op keel en borst, moet duidelijk aanwezig zijn. Vage of zwakke tekening dient gestraft te worden bij tekening. De snavelkleur kan zowel bij de poppen als bij de mannen variëren. In de broedtijd is de snavel en oogring dieper van kleur dan in de rusttijd. Hier dienen we tijdens de kleuring rekening mee te houden. De snavel moet eenkleurig zijn. De oogring moet zowel bij de man als bij de pop compleet zijn, deze mag niet onderbroken zijn. De pootkleur moet zo donker mogelijk zijn, bleke poten straffen bij kleur. Ook moet de merel vol van model zijn vaak zien we, vooral bij slecht afgerichte vogels, dat we tussen de vleugelbochten kunnen kijken. Deze vogels tonen dan duidelijk erg smal. Wanneer een merel in goede conditie is toont hij de zogenaamde snorharen. Door het verstrekken van korrelvoeding zien we, vooral bij de poppen, kleurverlies op de keelstreek. De keelstreek wordt erg licht en is dan ook een kleurfout die bestraft moet worden.
Bruin	Bij de man dient men te letten op een diepe kleur en kleuregaliteit. Bij de pop dient men erop te letten dat de borsttekening scherp en duidelijk aanwezig is. Ondanks dat de vleugeldekveertjes iets warmer van tint zijn dan de vleugelpennen en de mantel, mag dit zeker geen groot contrast geven, maar moet zo egaal mogelijk zijn. De oogring moet zowel bij de man als bij de pop compleet gesloten zijn. De poten mogen iets donkerder zijn als ze maar egaal van kleur zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.
Agaat	De agaat merel moet een egaal gekleurde grijze vogel zijn zonder bruine aanslag in de bevedering. Bij de pop moet de tekening zichtbaar blijven. Verder gelijk aan de wildkleur
Pastel	Een ideale pastel merel is een vogel welke, ten aanzien van de wildkleur, op alle plaatsen voor 70% is opgebleekt. Deze zienswijze wijkt af van de geldende norm welke stelt dat de pastel voor 50% moet zijn opgebleekt. Een merel die voor meer dan 50% is opgebleekt heeft echter de voorkeur gekregen omdat dit een opvallende verschijning genoemd mag worden. Er moet op gelet worden dat alle veervelden zo gelijkmatig mogelijk van kleur zijn. Egaliteit is dan ook een eerste vereiste voor een pastel, maar toch zal er voorlopig rekening mee gehouden moeten worden dat er kleurverschillen kunnen zijn. De kop is door de korte bevedering meestal donkerder dan de vleugelpennen. Ook zien we regelmatig dat de uiteinden van de staartpennen donkerder zijn. Voorlopig dient men ten aanzien van de kleuregaliteit enige soepelheid te betrachten. Duidelijk afstekende veervelden dienen bestraft te worden. De pop van de pastel onderscheidt zich van de bruine pop door de duidelijk aanwezige grijze waas, ook is de mantel en het rugdek vaak vlekkelig van kleur. De tekening moet, ook bij een pastel, duidelijk waarneembaar zijn, maar ook hier zou bij de beoordeling enige soepelheid betracht kunnen worden. De oogring moet compleet aanwezig zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Merel man :

Kleurslag	Satinet	Albino	Kleurkop Siamees	Witte Zwartoog	Gepareld
Kleur:					
Kop en masker	Warmcrème	Helder wit	Donkerbruin	Helder wit	Donkergrijs
Nek, mantel, rugdek stuit, keel, borst, buik, en aarsstreek	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Zilvergrijs, met streep-tekening en lichtgrijze vlekjes
Vleugelpennen	Crème, de schachten zijn lichter	Helder wit	Crème	Helder wit	Grijsbruin, met lichte en donkere streep-tekening
Vleugeldekveren	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Lichtgrijs, met lichte en donkere streepjes
Staartpennen	Crème	Helder wit	Crème	Helder wit	Lichtgrijs, met lichte en donkere streepjes
Bovenstaart dekveren	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Grijs, met lichte en donkere streepjes
Onderstaart dekveren	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Grijs
Poten	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Bruin
Nagels	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Donkerbruin	Hoornkleurig	Bruin
Snavel	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje	Geeloranje
Ogen	Helderrood, pupil pruimrood	Helderrood, pupil rood	Bruin, pupil zwart tot zeer donkerrood	Bruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:					
Omzoming alle vleugelpennen	Lichtcrème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Smalle omzoming Vleugeldekveren	Lichtcrème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Omzoming Buitenvlaggen staartpennen	Lichtcrème, de schachten zijn een tint lichter	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Oogring	Geel	Geel	Geel	Geel	Geel

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Merel pop.:

Kleurslag	Satinet	Albino	Kleurkop Siamees	Witte zwartoog	Gepareld
Kleur:					
Kop en masker	Warmcrème	Helder wit	Lichtbruin	Helder wit	Donkergrijs
Kin	Iets licht warmcrème	Helder wit	Lichtbruin	Helder wit	Zilvergrijs
Nek	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Zilvergrijs, met streeptekening
Mantel / rugdek	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Zilvergrijs, met streeptekening
Borst, buik, flanken, dijen en aarsstreek	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Zilvergrijs
Stuit	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Zilvergrijs
Vleugelpennen	Warmcrème	Helder wit	Crème	Helder wit	Grijsbruin, met lichte en donkere streeptekening
Vleugeldekveren	Warmcrème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Lichtgrijs, met lichte en donkere streepjes
Staartpennen	Warmcrème	Helder wit	Crème	Helder wit	Lichtgrijs, met lichte en donkere streepjes
Bovenstaart dekveren	Crème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Grijs, met lichte en donkere streepjes
Onderstaart dekveren	Crème	Helder wit	Warmcrème	Helder wit	Grijs
Poten	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Bruin
Nagels	Hoornkleurig	Hoornkleurig	Donkerbruin	Hoornkleurig	Bruin
Snavel	Aan de basis geel, overgaand in hoornkleurig	Okergeel	Aan de basis geel of oranje, overgaand in bruin	Okergeel	Aan de basis geel of oranje, overgaand in bruin
Ogen	Helderrood, pupil pruimrood	Helderrood, pupil rood	Bruin, pupil zwart of zeer donkerrood	Bruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:					
Lengtebestreping kin	Beige, op lichtcrème ondergrond	N.v.t.	Warmcrème	N.v.t.	Grijs
Oogstreep	Crème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Crème
Keel- en borstbevedering omzoomt, wat een geschubd aanzien geeft	Warmcrème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Omzoming vleugelpennen	Lichtcrème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Omzoming vleugeldekveren	Lichtcrème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Omzoming Staartpennen	Lichtcrème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Omzoming buitenvlaggen staartpennen	Lichtcrème	N.v.t.	Crème	N.v.t.	Grijs
Oogring	Vaag geel	Geel	Geel	Geel	Geel

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Merel pop

Satinet	Bij de satinet merel zien we praktisch geen verschil in uiterlijk tussen man en pop. De pop heeft een vagere oogring en is doordat ze op de borst nog iets schubtekening toont, daar vaak iets donkerder en vlekkeriger. Een veel voorkomende fout is dat de lichaamskleur flets of zwak is. De diepst en egaalst gekleurde satinet merel verdient de voorkeur. De wangen en de vleugelpennen zijn vaak wat lichter, dit moet soepel beoordeeld worden. De oogring moet compleet zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.
Albino	Een albino merel moet smetteloos wit zijn, zonder enige aanslag of onreinheid. Vaak ziet men albino's met een crème waas, omdat deze uit de selectiekwiek van de satinet komen. Het ligt voor de hand dat deze vogels voor kleur bestraft moeten worden. De oogring moet compleet en gesloten zijn. De vogels moeten voldoende dik bevederd zijn op de wangen en vleugelbochten. Verder gelijk aan de wildkleur.
Kleurkop siamees	De donkerbruine kopkleur kan van merel tot merel verschillen, de diepte van de kopkleur is afhankelijk van de periode waarin de vogel geruid heeft. Hoe kouder het weer tijdens de rui hoe dieper de kopkleur. De diepst gekleurde kopkleur verdient de voorkeur. Het rugdek kleur moet egaal zijn en de tekening bij de pop moet zichtbaar zijn. Verder gelijk aan de wildkleur
Witte zwartoog	De witte zwartoog merel lijkt op de albino merel alleen de oogkleur is zwart en niet helder rood.
Gepareld	De beschrijving van de geparelde merel is vooral opgenomen om de vogel te kunnen herkennen, er zijn nog niet veel vogels voorhanden om een goede beschrijving te maken.
Grizzle	Alle grizzle merels hebben wit aan de kop, variërend van een geheel witte kop tot een witte wenkbrauwstreep. Ook hebben alle vogels een aantal witte slagpennen in iedere vleugel. De variatiebreedte is nog zo groot bij deze vogels dat een goede beschrijving maken niet mogelijk is.

[Terug naar index](#)

Zanglijster (*Turdus philomelos*)

Algemene Informatie

De zanglijster behoort tot het grote geslacht *Turdinae*, de familie der lijsterachtige. Van de 3 ondersoorten, die de Zanglijster kent, komt de nominaatvorm (*Turdus p. philomelos*) in praktisch geheel Europa en een groot deel van het aangrenzende Azië voor. De ondersoort *T. p. clarkey* komt voor in West-Europa en in Groot Brittanië, terwijl de ondersoort *T. p. hebridensis* op de Buiten-hebriden en Skye voorkomt. In zijn verspreidingsgebied mijdt de zanglijster zowel de droge en erg warme gebieden, als zeer koude en besneeuwde gebieden. Zijn voorkeur gaat uit naar gebieden met bomen en struiken, met een behoorlijke laag humus, waarin hij zijn voedsel zoekt. De zanglijster komt dan ook zowel in natuurgebieden, als in parken en tuinen voor. Op geschikte plaatsen is de zanglijster een standvogel, maar in die gebieden, waar strenge winters kunnen zijn trekt de zanglijster in de winter naar meer gunstig gelegen gebieden om te overwinteren.

Ondersoorten

De nominaatvorm en de drie ondersoorten zijn:

- ***T. p. philomelos*:** Europa en aangrenzend Azië. Is meer bruingrijs van kleur.
- ***T. p. clarkey*:** West-Europa en Groot Brittanië. Is meer roestbruin van kleur.
- ***T. p. hebridensis*:** Buiten-Hebriden en Skye. Is donkerder en meer aardekleurig.
- ***T. p. nataliae*:** Centraal Azië en Iran.
-

Erfelijkheid en veerstructuur

Hoewel de bevedering van de zanglijster nog niet is onderzocht mogen wij aannemen dat de zanglijster in het bezit is van eumelanine en phaeomelanine, waarbij het phaeomelanine duidelijk de overhand heeft. Niets wijst er op dat zich ook carotenoïde in de bevedering van de zanglijster zal bevinden.

Fysieke standaard

Formaat:

De ideale zanglijster moet een forse indruk geven en moet 23 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De zanglijster is een robuuste vogel, vol van type. Van opzij gezien moet de borst-buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet

vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:

Een goed getrainde zanglijster dient rustig op stok te zitten. De stand van het lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45° en iets gedrukt. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp te worden gedragen, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Smalle, 3 cm lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de zanglijster zijn:

Oogring:

Rond het oog bevindt zich een gesloten ring.

Wenkbrauwstreep:

Vanaf de snavel loopt boven langs het oog een wenkbrauwstreep.

Teugelstreep:

De teugelstreep loopt vanaf de snavelinplant tot het oog.

Wangen:

Op de wang bevindt zich een fijne streeptekening, die vanaf het oog in een gebogen lijn loopt langs de onderkant van de wangen tot aan de keel.

Baardstrepen:

Op de keel bevinden zich baardstrepen die beginnen bij de snavelinplant.

Onderlichaamtekening:

Op het onderlichaam bevindt zich een druppeltekening die op de borst fijn is en grover uitloopt.

Flanken:

Op de flanken wordt een druppeltekening aangetroffen.

Middelste en grote vleugeldekveren: De toppen van de vleugeldekveren wijken af in kleur hierdoor ontstaan er twee banden op de vleugels die, indien volledig aanwezig, een tweetal regelmatige gebogen halve manen over de vleugels vormen.

Vleugelpennen:

De buitenvlag van de vleugelpennen toont een omzoming.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Zanglijster man en pop

Kleurslag	Wildkleur	Bruin	Satinet	SL ino
Kleur:				Albino
Schedel en achterhoofd	Warmbruin, iets roodbruin bewaasd	Beigebruin, achter schedel meer roodbruin	Wit, met een beige waas	Helder wit
Wangen	Iets lichter bruin, dan de schedel	Iets lichter, dan de schedel	Wit, met een beige waas	Helder wit
Nek	Warmbruin	Beigebruin	Wit, met beige waas	Helder wit
Buik en aarsstreek.	Gebroken wit	Crèmewit	Wit, met een lichtbeige waas	Helder wit
Keel en borst	Roomkleurig	Licht beige bruin	Wit, met een lichtbeige waas	Helder wit
Flanken	Roomkleurig, met bruine waas	Beigebruin	Wit, beige	Helder wit
Rugdek / mantel	Warmbruin	Warmbruin	Wit, met beige waas	Helder wit
Stuit	Bruin	Lichtbruin	Wit, met beige waas	Helder wit
Vleugelpennen	Donkerbruin	Warmbruin	Wit, met beige waas	Helder wit
Vleugeldekenen	Warmbruin	Bruin	Wit, met beige waas	Helder wit
Onderzijde vleugels	Beigebruin	Beigebruin	Wit /crème	Helder wit
Staartpennen	Donkerbruin	Warmbruin	Wit, met beige waas	Helder wit
Bovenstaartdekveren	Warmbruin	Bruin	Wit, met beige waas	Helder wit
Onderstaartdekveren	Crèmewit	Crème	Wit	Helder wit
Poten	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig
Nagels	Donkerbruin	Bruin	Hoornekleurig	Hoornekleurig
Snavel	Zwartbruin, ondersnavel geelachtig met bruine punt	Lichtbruin, ondersnavel geelachtig met bruine punt	Geelachtig, met bruine punt	Geelachtig
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart	Bruin, pupil donkerbruin	Rood, pupil bruin	Helderrood, pupil iets donkerder rood
Tekeningkleur:				
Oogring	Wit crèmeachtig	Lichtcrème	N.v.t.	N.v.t.
Wenkbrauwstreep	Crèmebeige	Beigebruin	N.v.t.	N.v.t.
Teugelstreep	Zwartbruin, met crème stipjes	Bruin, met lichtcrème stipjes	N.v.t.	N.v.t.
Wangen, met een fijne streeptekening	Zwartbruin	Warm bruin	N.v.t.	N.v.t.
Baardstrepen keel	Zwartbruin	Beigebruin	N.v.t.	N.v.t.
Lichaam, vanaf de kop om de keel tot de onderbuik een druppeltekening	Donkerbruin	Bruin	Zwak beigebruin	N.v.t.
Flanken druppeltekening	Donkerbruin	Bruin iets minder sprekend	Zwak beigebruin	N.v.t.
Toppen middelste- en grote vleugeldekenen	Donkerbruin, dit geeft twee dwarsbanden op de vleugels	Diepbruin, dit geeft twee dwarsbanden op de vleugels	N.v.t.	N.v.t.
Vleugelpennen, omzoming op de buitenvlag	Geelbruin	Crèmebruin	N.v.t.	N.v.t.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Zanglijster man en pop

Wildkleur	<p>Een goede conditie en een strakke bevedering is een eerste vereiste. De borst moet vol zijn, smalle zanglijsters moeten bij model worden gestraft. De zanglijster dient ook rustig op stok te zitten. Onrustige vogels worden bestraft bij houding. De kop-, rugdek-, vleugel- en staartkleur dient zo diep en egaal mogelijk warmbruin te zijn. De borst- en flankkleur zo licht mogelijk. Verder dient er op gelet te worden dat de druppeltekening zo regelmatig mogelijk is verdeeld. De oogringen en de vleugeltekening mogen niet onderbroken zijn. De wangtekening, een hoefijzervorm, moet scherp afgetekend zijn. In de keelvlak mag geen stipvorming zichtbaar zijn. De flanktekening is minder sprekend door de ondergrondkleur. Doordat de toppen van de middelste- en grote vleugeldekveren donkerbruin zijn ontstaat de vleugeltekening als twee halve maanvormige dwarsstrepen.</p>
Bruin	<p>De bruine zanglijster dient egaal warmbruin te zijn op de rug- en vleugeldek met een crème beige waas. De tekening dient duidelijk aanwezig te zijn.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
Satinet	<p>Bij de satinet zanglijster dient de tekening nog zichtbaar aanwezig te zijn.</p>
SL ino (Albino)	<p>De SL ino (albino) zanglijster dient een smetteloos witte vogel te zijn zonder enige zichtbare aanslag. Wangen en vleugelbochten dienen voldoende dik bevederd te zijn.</p>

[Terug naar index](#)

Grote lijster (*Turdus viscivorus*)

Algemene Informatie

De grote lijster lijkt op de zanglijster maar doet zijn naam eer aan en is duidelijk groter dan de andere lijsters. Komt voor in geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. Vrij algemeen in bossen en parken. 's winters regelmatig in het open veld in kleine groepjes, vaak met andere lijsters. De grote lijster is schuw en waakzaam.

Ondersoorten

De grote lijster behoort tot de familie der lijsterachtige. De soorten van het geslacht **Turdus** in Europa zijn;

T. obscurus:	Vale Lijster.	19 cm.	Siberië, zeldzame Aziatische herfstgast.
T. eunomus:	Bruine Lijster.	24 cm.	Azië, zeldzame Aziatische herfstgast.
T. naumanni:	Naumann's Lijster.	24 cm.	Azië, zeldzame Aziatische herfstgast.
T. sibiricus:	Siberische Lijster.	23 cm.	Azië, herfstgast.
T. dauma:	Goudlijster.	27 cm.	Azië, herfstgast.
T. migratorius:	Roodborst Lijster.	25 cm.	Noord-Amerika, dwaalgast.
T. torquatus:	Beflijster.	24 cm.	Zuid en midden Europa.
T. merula:	Merel.	25 cm.	West-Europa.
T. ruficollis:	Zwartkeel Lijster.	23 cm.	Oost-Rusland en Azië.
T. iliacus:	Koperwiek.	21 cm.	Noord-Europa en Azie.
T. philometos:	Zanglijster.	22 cm.	Engeland en West-Europa.
T. viscivorus:	Grote Lijster.	27 cm.	Noord- en Midden-Europa.
T. pilaris:	Kramsvogel.	25 cm.	Noord- en Oost-Europa.

Erfelijkheid en veerstructuur

Hoewel de bevedering van de grote lijster nog niet is onderzocht mogen we aannemen dat de grote lijster in het bezit is van eumelanine en phaeomelanine. Van de grote lijster zijn 3 mutaties bekend te weten de bruine-, de ino- en de opaalmutatie. Hier wordt echter zo weinig mee gekweekt dat deze nog niet in de standaard zijn opgenomen.

Fysieke standaard

Formaat:

Het formaat van de grote lijster is ± 28 cm., gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De grote lijster is een forse, volslanke vogel. Van opzij gezien moet de borst-/buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

[Terug naar index](#)

Houding:

Een grote lijster dient rustig op stok te zitten. De stand van het lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45°, een meer opgerichte houding. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Smalle, ± 3 cm. lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de grote lijster zijn:

- Teugel: Loopt vanaf de snavel inplant tot het oog.
- Wangen: Met een fijne streeptekening.
- Wangen: Vanaf het oog loopt een gebogen lijn langs de onder kant van de wangen tot aan de keel.
- Borst, buik, onderbuik en flanken: Een druppelvormige tekening. Op de bovenborst is deze fijner, meer pijlvormig.
- Slagpennen: Buitenvlag een smalle omzoming.
- Grote vleugeldekveren: Hebben crème toppen, dit geeft een crème dwarstekening op de vleugel.
- Kleine vleugeldekveren: Hebben crème toppen, dit geeft een crème dwarstekening op de vleugel.
- Staart: De buitenste pennen hebben een witte zoom.
- Onderstaartdekveren: Hebben een V-vormige tekening.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Grote lijster man en pop

	Wildvorm man en pop
Kleur:	
Kop	Schedel en nek grijsbruin. Wangen grijsbruin met witte omzoming. Keel gebroken wit tot roomkleurig.
Lichaam	Nek, rug en mantel bruin tot bruingrijs, licht omzoomt. Stuit bruingrijs lichter dan de rug, borst vanaf keel tot en met de aarsstreek roomkleurig, inclusief de flanken.
Vleugels	Slagpennen donkerbruin, langs de buitenvlag met een smalle grijsachtige zoom. Vleugeldeken donkerbruin. Onderzijde vleugels grijswit.
Staart	Staart bruingrijs, de buitenste pen is iets korter. Bovenstaartdekveren bruin tot bruingrijs. Onderstaartdekveren donker roomkleurig, donkerder wordend.
Snavel	Geelbruin, nagels donker hoornkleurig.
Poten	Donker hoornkleurig, worteldeel ondersnavel geel.
Ogen	Oogring bruin, pupil zwart. Met om het oog een witgrijze ring.
Tekeningkleur:	
Kop en nek	De teugels grijswit. Wangen fijn bruin gestreept. Om de wangen een grijswitte rand tot net even onder het oog.
Lichaam	Vanaf de kop, om de keelvlak tot de onderbuik, een donkerbruine tekening, bij de kop zeer fijn overgaand in pijlvormig op de borst. Meer druppelvormig op buik en flank.
Vleugels	Aan het uiteinde van de slagpennen een witgrijze omzoming. Ook de vleugeldeken zijn op het uiteinde lichtcrème omzoomd.
Staart	De staartpennen tonen een lichte buitenzoom. Onderstaartdekveren een bruine V-vormige tekening.

Keurtechnische aanwijzingen: Grote lijster man en pop

Grote lijster	<p>Een goede conditie en een strakke bevedering is een eerste vereiste.</p> <p>Er dient op gelet te worden dat naast de egale kleur ook de lichaamstekening een regelmatig verloop vertoont en dat deze niet onderbroken is.</p> <p>De jonge Grote Lijster is fletser van kleur en bezit een meer vlekkerige (gezoomde) mantel en de buitenste grote dekveren zijn korter.</p>
----------------------	--

[Terug naar index](#)

Koperwiek (*Turdus iliacus*)

Algemene Informatie

De koperwiek is de kleinste van de regelmatig voorkomende lijsters in Europa. Lijkt op de zanglijster maar is direct herkenbaar aan de roomkleurige wenkbrauwstrepen en de roodbruine flanken. Het verspreidingsgebied van de koperwiek is Scandinavië en Noord-Rusland. In Nederland vooral wintergast, vaak samen met de kramsvogel. De koperwiek bewoont minder dichte bossen dan de zanglijster, in het algemeen berkenbossen en soms parken. Het nest ligt meestal op de grond of in lage struiken. Buiten de broedtijd in open landschappen, moerasgebieden en in het open veld.

Ondersoorten

Voor de *Turdus* ondersoorten wordt naar de grote lijster verwezen.

Specifiek voor de koperwiek is echter een ondersoort:

***Turdus iliacus coburni*:** Deze komt voor op IJsland en in Groot-Brittannië, heeft een krachtiger gestreepte borst en is iets groter.

Erfelijkheid en veerstructuur

Hoewel de bevedering van de koperwiek nog niet is onderzocht mogen we aannemen dat de koperwiek in het bezit is van eumelanine en phaeomelanine. Van de koperwiek zijn 2 mutaties bekend te weten de bruine- en de oopaalmutatie. Hier wordt echter zo weinig mee gekweekt dat deze nog niet in de standaard zijn opgenomen.

Fysieke standaard

Formaat:

Het formaat is van de koperwiek is ± 21 cm., gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model: De koperwiek is een volslanke vogel. Van opzij gezien moet de borst-/buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:

Een koperwiek dient rustig op stok te zitten. De stand van het lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45° , ietwat gedrukt. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Smalle, ± 3 cm. lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningpatroon

- Tekeningonderdelen van de koperwiek zijn:
- Schedel: Deze toont een fijne puntvormige tekening.
- Wenkbrauwstreep: Deze loopt boven het oog tot op de achterschedel.
- Oogstreep: De oogstreep is sikkelvormig en loopt om het oog.
- Baardstreep: De baardstreep loopt vanaf de ondersnavel in een gebogen lijn onder de wangen door tot in de nek.
- Borst, buik, flanken en aarsstreek: Hierop is een korte grove onderbroken streep-tekening aanwezig.
- Keel en aarsstreek: Hierop is een fijne streep-tekening aanwezig.
- Vleugeldek: De vleugeldekveren zijn aan de buitenvlag omzoomd.
- Staartpennen: De pennen zijn aan de buitenvlag omzoomd.
- Onderstaart: Deze toont een V-vormige tekening.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Koperwiek man en pop

	Wildvorm man en pop
Kleur:	
Kop	Donkerbruin, kin gebroken wit.
Lichaam	Nek, rug, mantel en stuit donkerbruin. Borst crèmewit, buik en aarsstreek gebroken wit. Flanken roestkleurig roodbruin.
Vleugels	Vleugelpennen donkerbruin, de buitenvlag geelbruin. Vleugeldekveren grijsbruin. De onderzijde van de vleugels is roodbruin.
Staart	Staartpennen donkerbruin, bovenstaartdekveren grijsbruin en onderstaartdekveren crèmewit.
Snavel	Bovensnavel aan basis geel, overgaand in zwartbruin. Ondersnavel geelachtig met bruine punt.
Poten	Geelbruin, nagels donker hoornkleurig.
Ogen	Donkerbruin, met een roomkleurige oogring om het oog. Pupil zwart.
Tekeningkleur:	
Kop en nek	De schedel zwartbruine punttekening. De wenkbrauwstreep wit. De oogstreep, is roomkleurig. De baardstreep wit.
Lichaam	Op de borst, buik, flanken en aarsstreek donkerbruine lengtestreepjes. Net onder de kinvlek en bij de aarsstreek fijne donkerbruine lengtestreepjes.
Vleugels	De veren van vooral de middelste vleugeldekveren zijn crème omzoomd.
Staart	De staartpennen zijn crème omzoomd. Onderstaart een bruine V tekening.

Keurtechnische aanwijzingen: Koperwiek man en pop

Koperwiek	<p>Een goede conditie en een strakke bevedering is een eerste vereiste.</p> <p>De koptekening moet scherp, strak en symmetrisch zijn.</p> <p>De lichaamstekening moet zo scherp mogelijk zijn en zo ver mogelijk doorlopen.</p> <p>De pop koperwiek is iets matter van kleur en tekening.</p> <p>Een jonge koperwiek mist de roodbruine flankkleur en de crème omzoming in de vleugeldekveren.</p>
-----------	--

[Terug naar index](#)

Kramsvogel (*Turdus pilarus*)

Algemene Informatie

Het verspreidingsgebied van de kramsvogel is geheel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In Nederland doortrekker en wintergast, een zeldzame broedvogel. Nestelt in kolonies in open bos, tuinen en parken van steden en dorpen, ook solitair. Buiten de broedtijd in grote zwermen op velden en weiden, vaak samen met de koperwiek. De kramsvogel is direct te herkennen aan de blauwgrijze kop en stuit en de bijna zwarte staart.

Voor de Turdus ondersoorten wordt naar de grote lijst verwezen.

Erfelijkheid en veerstructuur

Hoewel de bevedering van de kramsvogel nog niet is onderzocht mogen we aannemen dat de kramsvogel in het bezit is van eumelanine en phaeomelanine.

Fysieke standaard

Formaat:

Het formaat is van de kramsvogel is ± 25 cm., gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De kramsvogel is een volslanke vogel. Van opzij gezien moet de borst-/buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen, met iets nekinval. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:

De kramsvogel dient rustig op stok te zitten. De stand van het lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45° , ietwat gedrukt. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Smalle, ± 3 cm. lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de kramsvogel zijn:

- Schedel: Op de schedel vanaf de snavel tot op de achterschedel zwartbruine lengtestreepjes.
- Wenkbrauw: Deze loopt vanaf de bovensnavel boven het oog tot de achterschedel.
- Masker: Het masker loopt vanaf de snavel tot achter het oog tot tegen de wenkbrauwstreep.
- Kinvlék: Deze is licht bestreep.
- Kin: Vanaf de kin, kop een onderbroken streep-tekening.
- Flanken: Op de flanken en een deel van de onderbuik tot aan de stuit is deze tekening pijlvormig.
- Stuit: Op de stuit een zwartbruine, halvemaanvormig, tekening.
- Onderstaartdekveren: Op de onderstaartdekveren een V-vormige tekening
- Vleugels: Op de vleugelslagpennen een grijze driehoek.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Kramsvogel man en pop

	Wildvorm man	Wildvorm pop
Kleur:		
Kop	Blauwgrijs, kin crèmekleurig.	Blauwgrijs, bruin bewaasd. Kin crèmekleurig.
Lichaam	Nek, blauwgrijs. Rugdek / mantel kastanjebruin met grijze omzoming. Stuit grijs met lichtgrijze omzoming. Borst gelig beige tot warm roestbruin, iets bleker rond de kinvlek. Buik en aarsstreek gebroken wit. Flank iets donkerder.	Nek blauwgrijs, bruin bewaasd. Rugdek / mantel kastanjebruin met grijze omzoming. Stuit lichtgrijs met lichtgrijze omzoming. Borst gelig beige tot warm roestbruin iets bleker rond de kinvlek. Buik / aarsstreek vuil wit. Flank bruin.
Vleugels	Vleugelpennen zwartbruin, buitenvlag grijs omzoomt. Vleugeldekveren kastanjebruin met grijze omzoming.	Vleugelpennen zwartbruin, buitenvlag grijs omzoomt. Vleugeldekveren kastanjebruin met grijze omzoming.
Staart	Staartpennen zwartbruin, buitenste paar pennen buitenvlag bleker. Uiteinde binnenvlag gebroken wit. Boven- en onderstaartdekveren grijs.	Staartpennen zwartbruin, buitenste paar pennen buitenvlag bleker. Uiteinde binnenvlag gebroken wit. Boven- en onderstaartdekveren grijs, bruin bewaasd.
Snavel	Aan basis flets geel overgaand in de zwartbruine snavelpunt en snavelstreep.	Aan basis flets geel, overgaand in de donkerbruine snavelpunt.
Poten	Zwartbruin, iets lichter toegestaan. Nagels zwartbruin.	Donkerbruin, iets lichter toegestaan. Nagels donkerbruin.
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart.	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekeningkleur:		
Kop en nek	Op de blauwgrijze schedel bevinden zich, korte zwartbruine lengtestreepjes. De wenkbrauwstreep is grijswit. Masker zwart. De kinvlek zwartbruin bestreept.	Gelijk aan de man, alleen korter van vorm.
Lichaam	Vanaf kin / kop zwartbruine tekening. Flank / deel onderbuik tot aan de stuit pijlvormige zwartbruine tekening, iets minder scherp dan in de borst. Op de stuit een minimale zwartbruine halve maanvormige tekening. Onderstaarttekening zwartbruin.	Gelijk aan de man.
Vleugels	Op de slagpennen een grijze driehoek. Op het bovenste deel van de vleugel een zwarte schubtekening.	Gelijk aan de man.

Keurtechnische aanwijzingen: Kramsvogel man en pop

Kramsvogel	<p>In de eerste plaats is een goede conditie en een goede bevedering een eerste vereiste. Speciaal dient men erop te letten, dat de lichaamstekening en koptekening niet onderbroken is. Ook komt het regelmatig voor, dat de borstkleur erg flets is.</p> <p>Jonge kramsvogels zijn herkenbaar aan lichte vlekken op de dekveren en een grijze hals met een bruine waas.</p>
-------------------	---

[Terug naar index](#)

Beflijster (*Turdus torquatus*)

Algemene Informatie

Deze op een merel lijkende lijstersoort is direct te herkennen aan de witte borstband en is ook over de gehele bevedering "gezoomd". Zijn verspreidingsgebied is de Scandinavische landen, Schotland, de Alpen, de Balkan en Spanje / Portugal. Vrij algemeen op rotsterrein met struiken en verspreide bomen. In ons land alleen als trekvogel waarneembaar.

Ondersoorten

De beflijster kent een ondersoort.

Turdus t. alpestris: Deze komt voor in Midden en Zuid-Europa en heeft een erg sprekend wit schubpatroon op de flanken, buik en onderborst.

Voor de Turdus ondersoorten wordt naar de zanglijster verwezen.

Erfelijkheid en veerstructuur

Hoewel de bevedering van de beflijster nog niet is onderzocht mogen we aannemen dat de Beflijster in het bezit is van eumelanine en phaeomelanine.

Fysieke standaard

Formaat:

Het formaat van de beflijster is ± 24 cm., gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De beflijster is een geblokte, volslanke vogel met een volle borst. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:

Een beflijster dient rustig op stok te zitten. De stand van het lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45°. Van rechtop zittend tot een ietwat gedrukte houding. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBvV website

Snavel:

Smalle, ± 3 cm. lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de beflijster zijn:

Man:

- Acherschedel: Vanaf de achterschedel lopen tot over de mantel zeer fijne grijswitte lengtestreepjes.
- Kin: Vanaf de ondersnavel tot aan de borstband fijne lengtestreepjes. Ter hoogte van de borstband meer geschubd.
- Flanken en buik: Op de flanken en buik tot aan de stuit een zwakke witgrijze schubtekening.
- Borst: Op de bovenborst een witte halvemaaanvormige band, die loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht.
- Omzoming vleugelveren: Alle vleugelveren tonen een omzoming.

Pop:

- Acherschedel: Vanaf de achterschedel tot over de mantel een zwartbruine schubtekening.
- Kin: Vanaf ondersnavel tot aan de borstband fijne lengtestreepjes. Ter hoogte van de borstband meer geschubd.
- Flanken en Buik: Op de flanken en buik tot aan de stuit een zwartbruine schubtekening.
- Borst: Op de bovenborst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een, vaag zichtbare, beigebruine halvemaaanvormige band.
- Omzoming vleugelveren: Alle vleugelveren tonen een omzoming.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Beflijster man en pop

	Wildvorm man	Wildvorm pop
Kleur:		
Kop	Zwart.	Vanaf snavelinplant zwartbruin, overgaand in de donkerbruine achterschedel. De kin is gebroken wit.
Lichaam	Mantel, rugdek, bef, bovenborst, buik, anaalstreek en stuit zwart, tot roetkleurig bruinzwart.	Nek, mantel, rug, stuit, bovenborst, onderlijf, buik, anaalstreek en stuit bruin.
Vleugels	De vleugelpennen zijn zwartbruin, met een smalle witgrijze buitenvlag. De vleugeldekveren zijn zwartbruin, met een grijswitte omzoming.	De vleugelpennen zijn matbruin, met een crèmewitte buitenvlag. De vleugeldekveren zijn mat bruin, met een brede crèmewitte omzoming.
Staart	Boven- en onderstaartdekveren zijn zwart. De staartpennen zijn zwartbruin, met een smalle grijze omzoming.	De boven- en onderstaartdekveren zijn matbruin. De staartpennen zijn matbruin, met een smalle crème buitenvlag.
Snavel	Okergeel, met donkere punt.	Aan de basis geel, overgaand in bruin.
Poten	Zwartbruin, nagels zwart.	Donkerbruin, nagels zwartbruin.
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart. Met om het oog een minimale grijswitte oogring.	Donkerbruin, pupil zwart. Met om het oog een minimale grijswitte oogring.
Tekeningkleur:		
Kop en nek: en lichaam	Vanaf de achterschedel tot de mantel grijswitte lengtestreepjes. Vanaf de ondersnavel tot aan de borstband fijne lengtestreepjes. Ter hoogte van de borstband meer geschubd. Op de flanken / buik, tot aan de stuit, een zwakke witgrijze schubtekening. Op de bovenborst een witte band.	De wangen zijn minimaal getekend. De borstband is beigebruin de nek, mantel, rug, bovenborst en buik een zwartbruine schubtekening. Op de bovenborst een vaag zichtbare beigebruine band
Vleugels:	Alle vleugeldekveren hebben een grijswitte omzoming. Toppen slagpennen zwart.	Alle vleugeldekveren hebben een grijswitte omzoming. Toppen slagpennen zwartbruin

Keurtechnische aanwijzingen: Beflijster man en pop

Beflijster	<p>Een jonge beflijster is zwaarder en grover van tekening en toont een lichtere keelvlak ten opzichte van de jonge merel. De lichtbruine halvemaantekening is bij jonge vogels nauwelijks zichtbaar.</p> <p>Bij de man wordt ernaar gestreefd om een zo diep mogelijke lichaamskleur en een zo scherp mogelijke omzoming te verkrijgen, wat een duidelijk contrast laat zien. De borstband moet strak aangelijnd zijn.</p>
------------	---

[Terug naar index](#)

Spreeuw (*Sturnus vulgaris*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd Noordoost Europa. Behoort tot de spreeuwenfamilie **Sturnidae**. Het is een alom bekende vogel en in ons land een algemene broedvogel. De hier broedende vogels en hun jongen zijn gedeeltelijk standvogels. Een gedeelte trekt naar België, Noord-Frankrijk en Engeland. In de winter hebben talrijke trekkers uit Oost-Europa hun winterkwartier in Nederland. Zij vervangen als het ware de hier broedende en wegtrekkende spreeuwen.

Ondersoorten

Er zijn 11 ondersoorten. Enkele soorten hiervan leven in Europa, de meeste echter hebben hun verspreidingsgebied buiten Europa.

S. v. laroensis:	Faroër eilanden.	S. v. caucasicus:	Noord-Iran.
S. v. zetlandicus:	Hebriden, Shetland eilanden.	S. v. tauricus:	Zuidoost Europa, Irak en West-Iran.
S. v. pupurasceus:	Zuid-Rusland, Irak en Egypte.	S. v. poltaratskyi:	Centraal-Siberië, Oost-Iran en India.
S. v. porphyronotus:	Turkistan, Nepal, Noord-India.	S. v. minor:	Sind.
S. v. nobilior:	Transcaspia, Noordoost-Iran, Noord-India.		
S. v. poltaratskyi:	Centraal-Siberië, Oost-Iran en India.		
S. v. humii:	Himalayagebied, Noord-India.		
S. v. roseus:	Zuidoost Europa. (roze spreeuw).		
S. v. unicolor:	Neemt op het Iberisch schiereiland de plaats in van de spreeuw. (zwarte spreeuw).		

Erfelijkheid en veerstructuur

In de gehele bevedering van de spreeuw treft men eumelanine en phaeomelanine aan maar daarnaast is onder invloed van het Tyndall-effect in het licht de metaalglans zichtbaar. Met de spreeuw wordt inmiddels vrij frequent gekweekt, door deze domesticatie zijn verschillende mutaties ontstaan en vastgelegd. Van de spreeuw zijn naast de beschreven mutaties ook nog de volgende mutaties bekend, opaal, agaat, bruin-agaat en de zilver of blauwe. Daar er van deze vogels nog niet veel bekend is zijn ze nog niet in de omschrijving opgenomen.

Fysieke standaard

Formaat:

De ideale spreeuw moet een forse indruk geven en moet 22 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De spreeuw is volslank met een korte brede staart. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren toch van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Van voren gezien dient de borst vol en redelijk rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de spreeuw niet de indruk maken uitgezakt te zijn. De kop is vrij breed en de schedel is nogal plat, met centraal ten opzichte van de schedel het oog.

Houding:

De spreeuw is een vrij nieuwsgierige vogel, die vrij hoog op de poten staat. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit

Conditie: Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de spreeuw zijn:

- Kop: Een fijne stiptekening.
- Lichaam: Een pijlvormige tekening die op de borst fijn is en grover uitloopt.
- Rugdek / mantel: Een pijlvormige tekening.
- Vleugeldekveer: Pijlvormig stiptekening.
- Handpennen: Omzoming aan buitenvlag.
- Bovenstaartdekveren: Omzoming aan de buitenvlag.
- Staartpennen: Omzoming aan buitenvlag.
- Onderstaartdekveren: Een V-vormige tekening

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Spreeuw man en pop

Kleurslag	Wildkleur	Bruin	Pastel
Kleur:			
Schedel tot de nek	Glanzend zwart	Glanzend donkerbruin	Glanzend donker zwartgrijs
Wangen, keel en kin	Zwart, met groene en purperen weerschijn	Bruin, met groene tot purperachtige glans	Donker zwartgrijs, met groene tot purperachtige glans
Borst, buik, flanken, dijen, aarsstreek	Glanzend zwart, met groene en purperen weerschijn	Glanzend donkerbruin, met groene en purperen weerschijn	Glanzend donkergrijs, met groene en purperen weerschijn
Rugdek / mantel	Glanzend zwart, met groene en purperen weerschijn	Glanzend donkerbruin, met groene en purperen weerschijn	Glanzend donkergrijs, met groene en purperen weerschijn
Hand, armpennen, middelste- en grote-vleugeldekken	Glanzend zwart, op een zwartbruine grondkleur	Glanzend bruin, op een bruine grondkleur.	Glanzend donkergrijs, op een grijze ondergrond
Kleine vleugeldekken en schouders	Glanzend zwart	Glanzend bruin	Glanzend donkergrijs
Staart bovenzijde	Zwartbruin	Bruin	Opgebleekt donkergrijs,
Staart onderzijde	Donkergrijs	Bruin	Grijs
Bovenstaartdekken	Glanzend zwart	Glanzend bruin	Glanzend donkergrijs
Onderstaartdekken	Glanzend zwart	Glanzend bruin	Glanzend donkergrijs
Poten	Donkerbruin	Bruin	Donker bruingrijs
Nagels	Zwart	Hoornkleurig	Donkergrijs
Snavel	Bovensnavel donkergrijs. Ondersnavel aan de basis hoornkleurig, overgaand in donkergrijs	Bovensnavel bruin. Ondersnavel aan de basis hoornkleurig, overgaand in bruin	Bovensnavel donkergrijs. Ondersnavel aan de basis hoornkleurig, overgaand in donkergrijs
Pupil	Zwart	Zwartbruin	Bruin
Tekeningkleur:			
Kop	Veerpunten van de gehele kopbevedering zijn bruin	Veerpunten van de gehele kopbevedering zijn bruin	Veerpunten van de gehele kopbevedering zijn bruin
Wangen stiptekening	Wit, crème bewaasd	Wit, bruin bewaasd	Wit, crème bewaasd
Lichaam, pijlvormige stippen	Wit	Wit	Bruin
Rugdek / Mantel, pijlvormige stippen	Wit, iets bruin bewaasd	Crème bewaasd	Crème, bruin bewaasd
Vleugeldekken, pijlvormige stiptekening	Wit, met bruine waas	Bruin	Lichtbruin
Vleugeldekken omzoming	Geelbruin	Bruin	Bruin
Buitenvlag handpennen omzoomd	Grijs	Lichtbruin	Bruin
Bovenstaartdekken gespikkeld	Wit	Bruin	Crème, bruin bewaasd
Buitenvlag staartpennen omzoomd	Geelbruin	Bruin	Bruin
Onderstaartdekken V-tekening	Zwart	Donkerbruin	Zwartgrijs

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Spreeuw man en pop

<p>Wildkleur</p>	<p>Een goede conditie en een strak glanzend verenpak is een eerste vereiste bij de spreeuw. Gelet dient er op te worden, dat het model goed gevuld is. Een scherpe borst wordt gestraft bij model. De witte stiptekening dient een regelmatig en scherp verloop te hebben en mag niet onregelmatig verdeeld zijn. Vaak zien we dat vooral tussen de poten richting de aars de tekening volloopt tot een grote witte vlek, dit dient gestraft te worden bij tekening. De stiptekening dient zo helder mogelijk wit te zijn, ook op de rug en de vleugeldekveren. De meest heldere kleur geniet de voorkeur. Spreeuwen hebben een zomer- en een winterkleed. In de herfst en winter zijn de veertoppen vrijwel wit. In de zomer meer bruinachtig en minder talrijk. Aangezien het tentoonstellingsseizoen in het najaar valt, wordt de voorkeur gegeven aan een witte stiptekening, zoals in de standaard staat vermeld. Een spreeuw in zomerkleed mag niet bestraft worden, maar geniet niet de voorkeur. Een bleke of tweekleurige pootkleur is een kleurfout. Een pop is vaak wat matter van kleur en de stiptekening is vaak wat grover en loopt op de buik en tussen de poten vaak dicht als een grote witte vlek. Ook dit is fout. Poppen hebben in de broedtijd een oogring. De ondersnavel, is in de broedtijd, aan de basis witachtig lichtroze. Die van de man is aan de basis licht blauwgrijs. Jonge vogels zijn voor de rui door het missen van de stippen volledig mat zwart van kleur.</p>
<p>Bruin</p>	<p>Bij de bruine spreeuw dient speciaal op een diepe en egale bruine kleur gelet te worden. Vooral in de vleugel- en staartpenen dient de bruine kleur duidelijk aanwezig te zijn. Vaak ziet men dat de vleugelpennen opgebleekt en vlekkelig zijn. Dit is vaak het gevolg van direct zonlicht. Poppen zijn lichter bruin van kleur.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur</p>
<p>Pastel</p>	<p>Bij de pastel spreeuw moet gelet worden dat de kleur egaal is en niet vlekkelig, de tekening bleekt niet op en moet dus net zo duidelijk aanwezig zijn als bij de wildkleur. Poppen zijn lichter van kleur.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p>

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Spreeuw man en pop

Kleurslag	Pastel bruin	Satinet	Phaeo	Wit (zwartoog)
Kleur:				
Schedel tot de nek	Glanzend bruin	Wit, met beige waas	Crème beige	Zuiver wit
Wangen, keel en kin	Lichtbruin, met groene tot purperachtige glans	Wit, met beige waas	Lichtbeige	Zuiver wit
Borst, buik, flanken, dijen, aarsstreek	Glanzend bruin, met groene en purperen weerschijn	Wit, met beige waas	Crème, met een beige waas	Zuiver wit
Rugdek / mantel	Glanzend bruin, met groene en purperen weerschijn	Glanzend wit, met lichtbeige waas	Crème, met een beige waas	Zuiver wit
Hand, armpennen, middelste- en grote- vleugeldeken	Glanzend lichtbruin, op een beigebruine grondkleur.	Glanzend crème, met lichtbeige waas	Glanzend crème, met beige waas	Zuiver wit
Kleine vleugeldeken en schouders	Glanzend lichtbruin	Glanzend crème, met lichtbeige waas	Glanzend crème, met beige waas	Zuiver wit
Staart bovenzijde	Lichtbruin	Crème, met lichtbeige waas	Crème, met beige waas	Zuiver wit
Staart onderzijde	Lichtbruin	Crème	Crème, met beige waas	Zuiver wit
Bovenstaartdekken	Glanzend lichtbruin	Wit, met lichtbeige waas	Crème, met beige waas	Zuiver wit
Onderstaartdekken	Glanzend lichtbruin	Wit, met lichtbeige waas	Crème, met beige waas	Zuiver wit
Poten	Bruin	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Hoornkleurig
Nagels	Hoornkleurig	Vleeskleurig	Vleeskleurig	Hoornkleurig
Snavel	Bovensnavel bruin. Ondersnavel aan de basis hoornkleurig, overgaand in bruin	Wit	Wit	Hoornkleurig
Pupil	Zwartbruin	Rood	Zwart	Zwart
Tekeningkleur:				
Kop	Veerpunten van de gehele kopbevedering zijn beigebruin	Veerpunten van de gehele kopbevedering zijn Crème	Veerpunten van de gehele kopbevedering zijn beigebruin	N.v.t.
Wangen stiptekening	Wit, bruin bewaasd	crème	Crème, beigebruin bewaasd	N.v.t.
Lichaam, pijlvormige stippen	Wit	Crème	Beige	N.v.t.
Rugdek / Mantel, pijlvormige stippen	Crème bewaasd	Crème	Wit, crème bewaasd	N.v.t.
Vleugeldeken, pijlvormige stiptekening	Bruin	Crème	Wit, met bruine waas	N.v.t.
Vleugeldeken omzoming	Lichtbruin	Beige	Bruin tot donkerbruin	N.v.t.
Buitenvlag handpennen omzoomd	Crème	Beige	Bruin tot donkerbruin	N.v.t.
Bovenstaartdekken gespikkeld	Lichtbruin	Crème	Lichtbeige	N.v.t.
Buitenvlag staartpennen omzoomd	Lichtbruin	Beige	Bruin tot donkerbruin	N.v.t.
Onderstaartdekken V-tekening	Donkerbruin	Crème	Beige	N.v.t.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Spreeuw man en pop

Pastel bruin	<p>Bij pastel bruine spreeuw dienen we er vooral op te letten dat de kleur van het rug- en vleugeldekk egaal is. Vaak ziet men dat de pastelfactor op de schouders en kleine vleugeldekkveren niet gelijkmatig heeft gewerkt. Dit is een kleurfout. De poppen zijn in totaal lichter en fletser van kleur.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
Satinet	<p>De lichaamstekening van de satinet spreeuw dient nog zichtbaar te zijn.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
Phaeo	<p>De tekening op de borst en buik van de phaeo spreeuw is erg sprekend, de omzoming van de vleugelpennen is bij de mannen donkerbruin en bij de poppen lichtbruin poppen zijn in totaal lichter van kleur dan de mannen.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
Wit (zwartoog)	<p>De witfactor ontstaat door een totale verhindering van het melanine, wanneer dit plaatselijk zou zijn, dan ontstaat er een bonte spreeuw. Er dient op te worden gelet, dat een witte (zwartoog) spreeuw smetteloos wit is, zonder enige aanslag of bevulling. Door de vederstructuur lijkt het of er nog bestreping aanwezig is op het lichaam.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p> <p>Keuren in Schaal 2.</p>

[Terug naar index](#)

Zwarte spreeuw (*Sturnus unicolor*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

Iberisch schiereiland , corsica, sardinie, sicilie en noordwest Afrika Behoort tot de spreeuwenfamilie Sturnidae.

Erfelijkheid en veerstructuur:

In de gehele bevedering van de spreeuw treft men eumelanine en phaeomelanine aan maar daarnaast is onder invloed van het Tyndall-effect in het licht de metaalglans zichtbaar. Er zijn geen specifieke man of pop kenmerken. Mogelijk dat de man minimaal forser is dan de pop en de snavel langer is dan de vrouwelijke zwarte spreeuw.

Fysieke standaard

Formaat: De ideale zwarte spreeuw moet een forse indruk geven en moet 22 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De zwarte spreeuw is volslank met een korte brede staart. De zwarte spreeuw is iets forser dan de spreeuw en de keelveren zijn opvallend lang. Deze zijn een keer zo lang als de spreeuw. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren toch van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Van voren gezien dient de borst vol en redelijk rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de spreeuw niet de indruk maken uitgezakt te zijn. De kop is vrij breed en de schedel is nogal plat, met centraal ten opzichte van de schedel het oog.

Houding:

De zwarte spreeuw is een vrij nieuwsgierige vogel, die vrij hoog op de poten staat. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit .

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBvV website

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de zwarte spreeuw zijn:

- Kop: In de broedtijd zwart en winter kleed fijne grauwwitte spikkels op het eind van de donsveren.
- Lichaam: In de broedtijd zwart en in het winterkleed een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening die op de borst fijn is en grover uitloopt.
- Rugdek / mantel: In de broedtijd zwart en in het winterkleed een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening.
- Vleugeldekveer: In de broedtijd zwart in het winterkleed omzoming aan buitenvlag.
- Handpennen: In de broedtijd zwart in het winterkleed omzoming aan buitenvlag.
- Bovenstaartdekveren: In de broedtijd zwart in het winterkleed omzoming aan buitenvlag
- Staartpennen: In de broedtijd zwart in het winterkleed omzoming aan buitenvlag
- Onderstaartdekveren: In de broedtijd zwart in het winterkleed een V-vormige tekening.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Zwarte spreeuw man en pop:

Kleurslag	Wildkleur zomer	Wildkleur winter
Kleur:		
Wangen en keel	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Rond de snavel	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Borst	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Flanken	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Buik	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Aarsbevedering	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Handpennen	Zwart	Zwart
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Zwart	Zwart
Staartpennen	Zwart	Zwart
Bovenstaartdekveren	Zwart	Zwart met een grauwwitte rand
Onderstaartdekveren	Zwart	Zwart met een grauwwitte rand
Stuit	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Rugdek, van koptekening tot stuit	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Poten	Rood oranje	Zwart
Nagels	Rood oranje	Zwart
Snavel	Geel	Zwart
Ogen	Zwart	Zwart
Tekeningkleur:		
Lichaamstekening	Geen	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Stuit	Geen	Zwart met een grauwwitte rand
Onderstaart dekveren	Geen	Zwart met een grauwwitte rand

Keurtechnische aanwijzing:

De vleugels mogen niet gekruist zijn. De zwarte spreeuw heeft een zomer en winterkleed.

De voorkeur tijdens keuring gaat uit naar het winter kleed.

[Terug naar index](#)

Rose spreeuw (*Sturnus roseus*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

Oost-Europa, van Hongarije, Roemenië tot Turkije en verder oostelijk tot in Kazachstan. Overwintert in Noordwest India. Behoort tot de spreeuwenfamilie Sturnidae. Er zijn geen specifieke man of pop kenmerken. Mogelijk dat de man minimaal forser is dan de pop en de snavel langer is dan de vrouwelijke rose spreeuw.

Erfelijkheid en veerstructuur:

In de gehele bevedering van de spreeuw treft men eumelanine en phaeomelanine aan maar daarnaast is onder invloed van het Tyndall-effect in het licht de metaalglans zichtbaar. omschrijving opgenomen.

Fysieke standaard

Formaat:

De ideale rose spreeuw moet een forse indruk geven en moet 21,5 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De rose spreeuw is volslank met een korte brede staart. De zwarte spreeuw is iets forser dan de spreeuw en de keelveren zijn opvallend lang. Deze zijn een keer zo lang als de spreeuw. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren toch van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Van voren gezien dient de borst vol en redelijk rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de spreeuw niet de indruk maken uitgezakt te zijn. De kop is vrij breed en de schedel is nogal plat, met centraal ten opzichte van de schedel het oog.

Houding:

De rose spreeuw is een vrij nieuwsgierige vogel, die vrij hoog op de poten staat. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit .

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBvV website

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de zwarte spreeuw zijn:

- **Kop:** In de broedtijd zwart met een typische kuif. In de winter grauwer gekleurd met een minder opvallende kuif.
- **Lichaam:** In de broedtijd zwart met een typische roze borst en mantel. In het winterkleed een hele fijne grauwwitte spikkelvormige tekening op kop en borst. De roze tekening is in het winterkleed minder intensief.
- **Rugdek / mantel:** In de broedtijd intensief rose en in het winterkleed minder sprekende dof roze kleur..
- **Vleugeldekveer:** In de broedtijd blauw/swart in het winterkleed omzoming aan buitenvlag en minder intensief blauw/swart.
- **Handpennen:** In de broedtijd blauw/swart in het winterkleed omzoming aan buitenvlag en minder intensief blauw/swart.
- **Bovenstaartdekveren:** In de broedtijd zwart/roze in het winterkleed omzoming aan buitenvlag
- **Staartpennen:** In de broedtijd zwart in het winterkleed omzoming aan buitenvlag
- **Onderstaartdekveren:** In de broedtijd zwart/roze in het winterkleed een V-vormige tekening

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Rose spreeuw man en pop:

Kleurslag	Wildkleur zomer	Wildkleur winter
Kleur:		
Wangen en keel	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Rond de snavel	Zwart	Zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Borst	Rose	Grauw rose
Flanken	Rose	Grauw rose
Buik	Rose	Grauw rose
Aarsbevedering	Rose	Grauw rose
Handpennen	Zwart/blauw	Zwart/blauw met rand
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Zwart/blauw	Zwart/blauw met rand
Staartpennen	Zwart/blauw	Zwart/blauw met rand
Bovenstaartdekveren	Zwart/blauw	Zwart/blauw met rand
Onderstaartdekveren	Zwart/blauw	Zwart/blauw met rand
Stuit	Rose	Grauw rose
Rugdek, van nektekening tot stuit	Rose	Grauw rose
Poten	Rose	Vaal rose
Nagels	Rose	Vaal rose
Snavel	Rose	Vaal rose
Ogen	Zwart	Zwart
Tekeningkleur:		
Lichaamstekening	Geen	Deels zwart met een fijne grauwwitte spikkelvormige tekening
Stuit	Rose	Zwart met een grauwwitte rand
Onderstaart dekveren	Zwart/blauw	Zwart/blauw met een grauwwitte rand

Keurtechnische aanwijzing:

De vleugels mogen niet gekruist zijn.

De rose spreeuw heeft een zomer en winterkleed.

De voorkeur tijdens het keuren gaat uit na het winterkleed.

[Terug naar index](#)

Ekster (*Pica pica*)

Algemene Informatie

De ekster komt in geheel Europa voor en is talrijk in ons land, zowel in de stad als op het platteland. Hij komt veelal voor in bosgebieden, parken, agrarisch land, heide en struikgewassen. Hij heeft een rechtlijnige vlucht op fladderende, afgeronde vleugels. Hij broedt zowel in hoge solitaire bomen, als in struikgewas. Zijn nest is groot, rond met een invliegkat. Net uitgevlogen jongen zijn dof van kleur en hebben een kortere staart.

De ondersoorten

Twee ondersoorten zijn:

Pica mauritanica: Verspreidingsgebied: Noordwest Afrika. Heeft een blauw gekleurd, naakt gebied achter het oog.

Pica melanotos: Verspreidingsgebied: Zuid Spanje. Kortere vleugels met meer zwart en een zwarte stuit.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de ekster is naast het eumelanine ook blauwstructuur te vinden. Voor de vererving en het gevolg van de bruin- en pastelmutatie wordt verwezen naar de standaard erfelijkheid en veerstructuur. Ook zijn bij de ekster nog vogels bekend in de mutaties satinet, albino, grijs en mogelijk de opaalmutatie. Omdat er nog maar enkel vogels van deze kleurslagen zijn worden ze nog niet beschreven.

Fysieke standaard

Formaat:

De ekster is 46 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart

Model:

De ekster is van een volslank type, wat geaccentueerd wordt door de lange staart. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Een lichte nekinval is toegestaan. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de ekster niet de indruk maken uitgezakt te zijn. De kop moet een regelmatig gebogen lijn vormen, met centraal ten opzichte van de schedel het oog. De staartveren worden trapsgewijs korter naar buiten toe. De 3 buitenste vleugelpennen worden trapsgewijs korter

Houding:

Hoewel de ekster een beweeglijke vogel is zal hij zich toch moeten tonen tijdens de keuring. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de bovenstaartdekveren.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste. Hierdoor komt de metaalachtige glans op het verenpak duidelijk tot uiting.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke teen een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

[Zie vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Fors en puntig. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn. Aan de basis stekelige veren.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. De staart is opvallend lang t.o.v. het lichaam en is spits toelopen

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de ekster zijn:

- Kleurscheiding borst- / buik: Deze vormt een regelmatig gebogen lijn, lopend van vleugel- naar vleugelbocht.
- Dijen: De dijnen zijn zwart bevederd en gaan over in het zwarte loopbeen.
- Tussen de poten: Tussen de poten loopt de zwarte stuitbevedering iets uit in het witte onderlichaam.
- Scheiding rug en stuit: Hier bevindt zich een band van 3 cm. breed.
- Binnenvlag grote vleugelpennen: Deze zijn wit afgelijnd door een zwart bandje aan de buitenrand van de veer, ook de toppen van de veer zijn zwart.
- Vleugeldekveren: Deze zijn wit, hierdoor ontstaat de brede schoudertekening.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Ekster man en pop

Kleurslag	Wildkleur	Bruin	Pastel
Kleur:			
Schedel en achterhoofd	Zwart, met groenviolette metaalglans	Warmbruin, met groenviolette metaalglans	Grijs opgebleekt zwart, met groenviolette metaalglans
Snavelbevedering	Zwart	Bruin	Grijs
Bovenste deel borst	Zwart, met groenviolette metaalglans	Bruin, met groenviolette metaalglans	Grijs opgebleekt zwart, met groenviolette metaalglans
Buik en flank tot aan de broekbevedering	Wit	Wit	Wit
Broek- / aarsbevedering	Zwart	Bruin	Grijs, opgebleekt zwart
Rugdek / mantel	Zwart, met metaalglans	Bruin, met metaalglans	Grijs opgebleekt zwart, met metaalglans
Stuit	Witgrijs	Witgrijs	Witgrijs
Armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren.	Zwart, met groenblauwe metaalglans	Bruin, met groenblauwe metaalglans	Grijs opgebleekt zwart, met groenblauwe metaalglans
Handpennen uitgespreid	Wit, met zwarte toppen	Wit, met bruine toppen	Wit, met grijs opgebleekte toppen
Kleine vleugeldekveren	Zwart, met groenblauwe metaalglans	Bruin, met groenblauwe metaalglans	Grijs opgebleekt zwart, met groenblauwe metaalglans
Schouders	Wit	Wit	Wit
Staart bovenzijde	Zwart, met groenblauwe metaalglans	Bruin, met groenblauwe metaalglans	Grijs opgebleekt zwart, met groenblauwe metaalglans
Staart onderzijde	Zwart	Bruin	Grijs opgebleekt zwart
Poten	Zwart	Bruin	Zwart
Nagels	Zwart	Bruin	Zwart
Snavel	Zwart	Bruin	Zwart
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:			
Borst van vleugelbocht tot vleugelbocht in een regelmatig diep uitlopende gebogen lijn	Zwarte bovenborst, via een gebogen lijn overgaand in het witte onderlichaam	Bruine bovenborst, via een gebogen lijn overgaand in het witte onderlichaam	Grijze bovenborst, via een gebogen lijn overgaand in het witte onderlichaam
Dijen	Zwart	Bruin	Grijs
Tussen de poten	Zwart	Bruin	Grijs
Stuitband	Witgrijs	Witcrème	Wit lichtgrijs
Binnenvlag grote slagpennen	Wit	Wit	Wit
Vleugeldekveren	Wit, waardoor de witte schoudertekening ontstaat	Wit, waardoor de witte schoudertekening ontstaat	Wit, waardoor de witte schoudertekening ontstaat

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Ekster man en pop

Algemeen	<p>Aangaande de samenstelling van de vleugelpennen van de kraaiachtige wordt opgemerkt, dat de eerste vleugelpen altijd korter is dan de tweede (ongeveer de helft). De tweede vleugelpen is altijd korter dan de derde. De twee langste slagpennen zijn de derde en de vierde. Wanneer we kraaiachtige vogels keuren, mag men nooit de opmerking plaatsen van buitenste pen niet compleet of te kort.</p>
Wildkleur	<p>Een goede conditie is een eerste vereiste, in goede conditie komt de metaalglans naar voren en zit de vogel strak in zijn bevedering. Het model moet vol zijn. De borstlijn mag niet onderbroken zijn. De witte veervelden moeten helder wit zijn. Bij jonge vogels is het wit meer roomkleurig. Man en pop zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden poppen zijn iets fletser van kleur en haar staart is iets korter. De staartveren worden trapsgewijs korter naar buiten toe. De 3 buitenste vleugel pennen worden trapsgewijs korter.</p>
Bruin	<p>Bij de bruine ekster moet er opgelet worden dat de bruine kleur niet flets of vlekkerig is. De bruine kleur hoort egaal diep warmbruin te zijn.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
Pastel	<p>Bij de pastel ekster dient men speciaal op de kleuregaliteit te letten. De pastefactor is erg variabel. Deze kan van 30% tot 80 % optreden. De ideale pastel is van 40 tot 60 % gereduceerd. Het grijs moet egaal grijs zijn en niet vlekkerig. De kleurdiepte moet men voorlopig nog soepel beoordelen.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur</p>

[Terug naar index](#)

Gaai (*Garrulus glandarius*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied geheel Europa, uitgezonderd het hoge noorden. Vrij algemeen in bossen. Mijdt menselijke bewoning allerminst, maar is dan door zijn waakzaamheid moeilijk te observeren. Meestal te herkennen aan vlucht met onregelmatige vleugelslagen.

Ondersoorten

<i>Garrulus rufitergum</i>:	Britannië en Ierland, is donkerder roodbruin van kleur
<i>Garrulus krynicki</i>:	Kaukasus
<i>Garrulus atricapillus</i>:	Midden-Oosten
<i>Garrulus cervicalis</i>:	Midden en Noord-Afrika, heeft een zwarte kruin en dikkere snavel
<i>Garrulus brandtii</i>:	Het Noordoosten van Rusland, heeft een roodbruine kop.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de gaai komt eumelanine en phaeomelanine evenals blauwstructuur voor. Voor de vererving en het gevolg van de mutaties wordt verwezen naar de standaard erfelijkheid en veerstructuur. Van de gaai zijn de opaal- en albinomutatie bekend.

Fysieke standaard

Formaat:

De gaai is 35 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart,

Model:

De gaai is van een robuust en fier type. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen, waarbij een lichte nekinval is toegestaan. Van voren gezien dient de borst breed, vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de gaai niet de indruk wekken uitgezakt te zijn. De vrij brede kop moet een regelmatig gebogen lijn vormen, met centraal ten opzichte van de schedel, het oog. Door het opzetten van zijn veren toont hij op de kop dikwijls een kleine kuif.

Houding:

Hoewel de gaai een beweeglijke vogel is, zal hij zich toch moeten tonen tijdens de keuring. Hij behoort half opgericht te zitten en het lichaam dient vrij van de stok te blijven. Hij is daarbij waakzaam. De vleugels dienen strak langs het lichaam gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de bovenstaartdekveren.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste. Dikwijls zet hij als teken hiervan zijn kleine kuif op.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze de stok goed te omklemmen, waarbij drie tenen naar voren en één teen naar achteren is gericht. Aan elke teen zit een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Fors en vrij zwaar (echte gaaiachtig), met aan de bovensnavel een klein haakje.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. Bij de snavel zitten borstelveren.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de gaai:

- **Masker:** Loopt vanaf de bovensnavel tot op de achterschedel langs de wangen tot op de keel.
- **Schedel:** Is voorzien van korte lengtestreepjes.
- **Baardstreep:** Loopt vanaf de snavelbasis tot onder de wang.
- **Grote vleugeldekeren:** Zijn voorzien van een afwisselende blauwzwarte dwarstekening.
- **De twee binnenste armpennen:** Zijn roodbruin van kleur en steken af bij de mantel.
- **Armpennen:** Zijn vanaf de basis tot halverwege wit, waardoor een witte vleugelspiegel ontstaat.
- **Stuitbevedering:** Is wit, waardoor een witte band tussen de staart en de onderrug ontstaat.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Gaai man en pop.

	Wildkleur	Opaal	Albino
Kleur:			
Schedel	Gebroken wit, wat langzaam overgaat in het beigebruin van de nek	Crème	Wit
Masker, wangen en achterschedel.	Bruin roze. Wit onder het oog	Crème	Wit
Keel	Grijsachtig wit tot crèmewit	Gebroken wit	Wit
Borstelveren	Bruinroze	Crèmebeige	Wit
Borst en flanken	Lichtroze bruin, bleker naar de buik toe	Lichtbeige, bleker naar de buik toe	Wit
Buik en aarsstreek	Gebroken wit	Gebroken wit	Wit
Rugdek / mantel	Bruinroze	Lichtbeige, met grijze waas	Wit
Stuit	Wit	Wit	Wit
Handpennen	Bruinzwart, met grijswitte buitenvlag	Grijs, met witte buitenvlag	Wit
Armpennen	Vanaf de basis tot halverwege wit, verder zwart	Vanaf de basis tot halverwege wit, verder grijs met blauwe waas.	Wit
Binnenste armpennen	Roodbruin	Beigebruin	
Staartpennen	Bruinzwart, iets gezoomd	Grijs, met iets donkerder omzoming	Wit
Poten	Bleekbruin	Vleeskleurig	Vleeskleurig
Nagels	Donkerbruin	Bruin	Vleeskleurig
Snavel	Donkerbruin, met aan de bovensnavel een klein haakje	Donker hoornkleurig, met aan de bovensnavel een klein haakje	Wit, met aan de bovensnavel een klein haakje
Ogen	Grijsblauw, met bleke oogring. Pupil zwart	Grijs, met bleke oogring. Pupil zwart	Rood, met bleke oogring. Pupil helderrood
Tekeningkleur:			
Schedel korte lengtestreepjes	Zwart	Grijs	N.v.t.
Baardstreep	Zwart	Zwartgrijs	N.v.t.
Op de binnenvlag van de handpennen	Blauwachtige vlekjes	N.v.t.	N.v.t.
Op de armpennen een vleugelspiegel	Wit	Wit	N.v.t.
Grote vleugeldekveren	Blauw, met zwarte dwarsstreepjes	N.v.t.	N.v.t.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Gaai man en pop.

Algemeen	<p>Aangaande de samenstelling van de vleugelpennen van de kraaiachtige wordt opgemerkt, dat de eerste vleugelpen altijd korter is dan de tweede (ongeveer de helft). De tweede vleugelpen is altijd korter dan de derde. De twee langste slagpennen zijn de derde en de vierde. Wanneer we kraaiachtige vogels keuren, mag men nooit de opmerking plaatsen van buitenste pen niet compleet of te kort.</p>
Wildkleur	<p>Een goede conditie met een gave bevedering is een eerste vereiste bij een gaai. Gelet dient er op te worden dat de baardstrepen niet ongelijk getekend zijn en dat de kopbestreping regelmatig verdeeld is. De vleugelspiegels moeten scherp en symmetrisch zijn. De borstkleur moet egaal zijn een vlekkerige borstkleur is fout. De kopbevedering kan als kuif worden opgezet.</p>
Opaal	<p>Bij de opaal gaai dient gelet te worden op kleuregaliteit van het rug- en vleugeldek. Ook de aanwezigheid van de baardstrepen. De blauwe vleugeltekening ontbreekt bij deze mutatie.</p> <p>Verder gelijk aan de wildkleur.</p>
Albino	<p>De albino gaai is een smetteloos witte vogel die voldoende dik bevederd moet zijn.</p> <p>Keuren in schaal 2</p>

[Terug naar index](#)

Bijeneter (*Merops apiaster*)

Algemene Informatie

De bijeneter heeft als verspreidingsgebied Midden-Europa. Biotoop; vochtig terrein met berken, elzen, wilgenbosjes en struikgewas. Open gemengde bossen en parken. Broed in gangen in oevers en zandafgravingen.

Ondersoorten

Merops superulosus De groene bijeneter is 30 cm, komt voor in West-Azië en Afrika. Rugdek groen, geen verlengde staartpennen. Daarnaast zijn er nog veel uitheemse bijeneters, welke in het bestek van deze herkenningsoomschrijving niet worden genoemd.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de bijeneter is naast het eumelanine en het phaeomelanine ook geel carotenoïde te vinden. Ook een blauwstructuur is aanwezig.

Fysieke standaard

Formaat:

De bijeneter ± 28 cm. lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De bijeneter een goed gevulde vogel, met een vrij ronde kop. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:

Een bijeneter dient rustig op stok te zitten. Hij heeft een meer liggende houding, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten zijn kort en moeten recht zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Lange naar beneden gebogen snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. Een goede conditie is een eerste vereiste.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de bijeneter zijn:

- Voorhoofdsband: Loopt bovenlangs de snavel tot het oog.
- Teugel: Loopt vanaf de snavel door het oog tot de nek.
- Keelband: Loopt van de onderkant van de teugel over de keelstreek.
- Vleugels: Gezoomd aan de buitenvlag.
- Grote vleugeldekveren: Gezoomd aan de buitenvlag.
- Slagpennen: Toppen zwart.
- Staartpennen: Gezoomd aan de buitenvlag.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Bijeneter man en pop

	Wildkleur
Kleur:	
Kop en nek	Bovenschedel kastanjebruin, overgaand in de kastanjebruine nek. Voorhoofd wit / zachtgeel. De wangen zijn geel. De keel is zachtgeel,
Lichaam	De borst, welke loopt vanaf de keel, is diep blauwgroen. De buik is iets lichter. De flanken zijn helderblauw. Rugdek en de mantel zijn vanaf de nek tot aan de stuit grijsgroen met kastanjebruine waas. Aarsstreek blauwgrijs. De stuit is rozebruin. Op de schouders blauw met bruine waas.
Vleugels	Vleugelpennen zwartbruin, Grote vleugeldekveren kastanjebruin.
Staart	Staartpennen grijsgroen. Onderstaartdekveren grijsblauw. De middelste twee staartpennen zijn van 1 tot 3 cm verlengd zowel bij de man als bij de pop.
Snavel	Zwart.
Poten	Bruinachtig hoornkleurig. Nagels donkerbruin.
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekeningkleur:	
Kop en nek	De witte voorhoofdband loopt boven langs het oog tot ongeveer 1 cm voorbij het oog. De zwarte teugel loopt vanaf de snavelinplant door het oog tot 2 cm achter het oog. Boven het oog een smalle blauwe streep tot in de nek.
Lichaam	Op de borst is de afscheiding met de keel afgetekend met een zwarte streep
Vleugels	De buitenvlag is, smal, zwart gezoomd. De grote vleugeldekveren hebben een roodbruine omzoming. De onderzijde is grijs met zwarte toppen.
Staart	Op de staartpennen bevindt zich aan de buitenvlaggen een smalle witgrijze zoom op de bovenzijde, de onderzijde is geheel egaal

Keurtechnische aanwijzingen: Bijeneter man en pop

Wildkleur	<p>Er is geen onderscheid tussen man en pop bijeneter. Men moet er wel op letten dat de kleuren niet flets zijn. Dit kan veroorzaakt worden door verkeerde voeding. De verlengde staart pennen dienen onbeschadigd te zijn. Jongens zijn te herkennen aan het vaalgroene rugdek, het fletsgele en blauw van de keel- en buikkleur. Ook missen de jonge vogels de verlengde staartpennen.</p>
------------------	--

[Terug naar index](#)

Hop (*Upupa epops upupiformes*)

Algemene Informatie

De hop heeft als verspreidingsgebied geheel Europa, met uitzondering van Scandinavië, Noord-Nederland, Engeland en het Noorden van Duitsland. De Europese hopen overwinteren in Zuid-Spanje en Afrika, de hop die meer oostelijk voorkomt overwintert in India. Biotoop; oude fruitboomgebieden met waterpartijen en vochtige weidegebieden. In mindere mate te vinden in loof- en naaldbossen, wijnbergen en parken. Broed in holen en rotsspleten.

Ondersoorten

Upupu. e. afrikana: de Afrikaanse hop, komt voor in Afrika. De kop, nek, borst en onderlichaam zijn lichtbruin. De grote vleugeldekveren zijn aan de toppen zwart en verder wit, deze vormen een wit vleugelschild. De kleine vleugeldekveren hebben een smalle witgrijze band welke een witgrijze vleugelband vormen. De staart is geheel zwart.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de hop is naast het eumelanine ook phaeomelanine te vinden.

Fysieke standaard

Formaat:

De hop is ± 26-28 cm. lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De hop is een goed gevulde vogel, met een vrij ronde kop en kuif. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel. De kuif kan als een waaier opgezet worden, dan is de volledige zwart-witte tekening zichtbaar. In rust zijn alleen de 4 zwarte banen op de bruine kuif zichtbaar.

[Terug naar index](#)

Houding:

Een hop dient rustig op stok te zitten. Hij hoort rechtop te zitten en het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

De lange dunne snavel is gebogen. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de hop zijn:

- **Kuif:** Op de schedel een kuif, die als een waaier kan worden opgezet. Dan is de volledige zwart-witte tekening zichtbaar, draagt de hop de kuif in rust dan zijn 4 zwarte baantjes zichtbaar op een regelmatige afstand onderbroken door rossigbruine veren. De band is niet strak af getekend.
- **Slagpennen:** De slagpennen hebben om en om witte- en zwarte dwarsbanden. De witte zijn wat breder dan de zwarte.
- **Mantel:** Op de het onderste deel van de mantel en rug 2 witte dwarsbanen en 1 zwarte dwarsbaan.
- **Vleugelpennen:** De toppen van de vleugelpennen hebben een crèmebeige omzoming.
- **Staart:** Op de staart op ongeveer 2 cm van af de onderkant een witte dwarsbaan van ongeveer 1 cm breed in rust is er niet meer van te zien dan een witte vlek aan de buitenkanten van de staart. De buitenste staartpennen hebben op ongeveer 3 cm vanaf de staartinplant een witte buitenvlag.

Kleurstandaard: Hop man en pop

	Wildkleur
Kleur:	
Kop en nek	Bovenschedel bleek rossigbruin, overgaand in de rossigbruine nek. De wangen zijn lichtrossig bruin. De keel is zachtbruin, de kuif is kaneelbruin
Lichaam	De borst, welke loopt vanaf de keel, is bleek rossigbruin. Overgaand in een witachtige rozebruine overgoten buik. De flanken zijn geel bruinachtig witroze overgoten. Rugdek en mantel zijn vanaf de nek tot halfweg de rug rossigbruin. Dan volgen afwisselend een zwarte, witte en zwarte dwarsband van ongeveer 1 cm breed. De rest van de onderrug is wit. De stuit is wit.
Vleugels	Vleugelpennen zwart, grote vleugeldekken zwart.
Staart	Staartpennen zwart.
Snavel	Donkerbruin, aan basis iets lichter vrij lang en iets gebogen.
Poten	Grijsbruin. Nagels donker hoornkleurig
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart.
Tekeningkleur:	
Kop en nek	De kuif heeft aan de toppen van de veren 4 zwarte punten op regelmatige afstand, dan een witte band, verder zijn de kuifveren rossigbruin. De kuifveren zijn bijna altijd verschillend van lengte en hierdoor is de band niet strak
Vleugels	Op de grote slagpennen bevinden zich, om en om, witte- en zwarte dwarsbanden. De kleine slagpennen hebben een crèmebeige omzoming. Evenals de toppen van de grote slagpennen.
Staart	Op de staartpennen een witte band, ongeveer 1 cm breed en 2 cm van de onderkant van de staart. Deze is alleen zichtbaar als de staart gespreid word. De buitenste staartpennen hebben witte buitenvlaggen op ongeveer 3 cm van de staartinplant

Keurtechnische aanwijzingen: Hop man en pop

Wildkleur	Bij de hop moet er op gelet worden dat de rozebruine veervelden voldoende diep van kleur zijn. De witte veervelden zuiver wit zijn en de snavel niet af gebroken is. In herfst en winter zijn de kleuren wat fletser dan in het broedkleed. Het grootste belang is echter dat de het verenkleed van de hop compleet en schoon is.
------------------	---

[Terug naar index](#)

Scharrelaar (*Coracias garrulus*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied: De scharrelaar komt voor in Zuid- en Oost-Europa en in Azië van Turkije en Irak tot Midden-Rusland, West-China en Pakistan. Het is een trekvogel die in augustus of september vertrekt naar het zuiden van en tropisch Afrika en in april of mei weer terugkeert naar zijn broedgebied. Het aantal scharrelaars in Europa is de laatste decennia van de twintigste eeuw sterk afgenomen. In de 19e eeuw broedden ze zelfs nog tot in Zweden, terwijl ze nu in Midden-Europa nauwelijks meer te vinden zijn.

Er worden 2 ondersoorten onderscheiden:

C. g. garrulus: van noordelijk Afrika en centraal en zuidelijk Europa tot Iran en zuidwestelijk Siberië.

C. g. semenowi: van Irak tot westelijk Pakistan, de westelijke Himalaya en centraal Kazachstan.

De scharrelaar is ongeveer zo groot als een gaai. Hij heeft een grote kop en een krachtige, dikke, zwarte snavel. Het verenkleed is helder lichtblauw met diepblauwe kleine vleugeldekveren, stuit en delen van de ondervleugel. De rug is bruin, de vleugelpunten en de bovenkant van de staart zijn zwart.

Fysieke standaard

Formaat:

De scharrelaar is 31 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

Het is een robuuste vogel. Hij heeft een zware dolksnavel en korte, dikke en krachtige poten.

Houding:

De rug van de blauwborst is enigszins rond. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBV website

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de scharrelaar zijn:

- Kop: De scharrelaar heeft een diepgroenblauwe kop.
- Lichaam: Hij heeft een bruine rug en een licht groen blauwe buik en borst.
- Rugdek / mantel: Bruin
- Vleugeldekveer: Blauw groen
- Handpennen: Van het einde tot halverwege de pennen zwart grijs over gaand in wit lichtblauw. De kleine dekveren zijn blauw
- Bovenstaartdekveren: Blauw bruin.
- Staartpennen: Blauw.
- Onderstaartdekveren: Man wit en pop grijs/wit.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Scharrelaar :

Kleurslag	Wildkleur
Wangen	Blauw
Keel	Wit
Kop	Blauw
Borst	Wit
Flanken	Oranje
Buik	Wit
Aarsbevedering	Wit
Handpennen	Blauw
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Blauw
Staartpennen	Blauw.
Bovenstaartdekveren	Grijs blauw
Onderstaartdekveren	Wit blauw
Stuit	Blauw
Rugdek, van koptekening tot stuit	Bruin
Poten	Licht bruin
Nagels	Licht bruin
Snavel	Zwart grijs
Ogen	Donker bruin
Tekeningkleur:	
Lichaamstekening	Blauwe kop en onder zijde wit flanken oranje
Stuit	Blauw
Onderstaart dekveren	Wit

Keurtechnische aanwijzingen:

De vleugels mogen niet gekruist zijn.

Het winterkleed van de scharrelaar is mater dan het zomer kleed.

De kop en nek en onderzijde zijn meer bruinachtig groen.

De scharrelaar mag hier niet op bestraft worden.

[Terug naar index](#)

Notenkraker (*Nucifraga caryocatactes*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

De **notenkraker** (*Nucifraga caryocatactes*) is een vogel uit de familie van de kraaien (Corvidae). De notenkraker komt voor in de noordelijke bossen van Eurazië en in het midden en hooggebergte van Europa. Zijn verspreidingsgebied loopt verder van midden en oosten van Siberië tot Kazachstan en de Himalaya. Er zijn geen specifieke man of pop kenmerken. Mogelijk dat de man minimaal forser is dan de pop en de snavel langer is dan de vrouwelijke notenkraker.

¶Ondersoorten

Er zijn 8 onder soorten:

- *N. c. caryocatactes* (diksnavelnotenkraker): Europa.
- *N. c. macrorhynchos* (Siberische notenkraker): van het Oeralgebergte tot oostelijk Siberië en noordoostelijk China.
- *N. c. rothschildi*: van Kazachstan tot noordwestelijk China.
- *N. c. japonica*: de Koerilen en noordelijk Japan.
- *N. c. owstoni*: Taiwan.
- *N. c. interdicta*: noordelijk China.
- *N. c. hemispila*: de noordwestelijke en centrale Himalaya.
- *N. c. macella*: van de oostelijke Himalaya tot centraal en zuidelijk China en noordelijk Myanma

Fysieke standaard

Formaat:

De notenkraker is 32 - 34 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De notenkraker moet een robuuste vogel zijn. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. De nek is vol. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de notenkraker niet de indruk maken uitgezakt te zijn.

Houding:

De notenkraker is een nieuwsgierige vogel en zal zich goed kunnen tonen tijdens de keuring. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten bijna op het eind van de staart

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke teen een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBV website

Snavel:

Een lange dolkvormige snavel. Onderen bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. De staart heeft een enigszins afgeplat model.

Tekeningpatroon:

Tekeningonderdelen van de notenkraker zijn:

- Lichaam: Een fijne geconcentreerde druppeltekening op de wangen en borst die grover uitloopt op overige lichaamsdelen en hier minder sterk geconcentreerd zijn.
- Kop: eenkleurig bruin.
- Rugdek / mantel: Een druppelvormige tekening.
- Vleugeldekveer: een fijne lichte omzoming uitlopend in een witte druppel. Aan de onderzijde vormen zij twee witte lijnvormige banden.
- Handpennen: Licht omzoming aan buitenvlag.
- Bovenstaartdekveren: Omzoming aan de buitenvlag.
- Staartpennen: Vier buitenste staartpennen boven en onderzijde een witte tekening

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Notenkraker man en pop:

Kleurslag	Wildkleur
Kleur:	
Wangen en keel	Donkerbruin met witte druppels
Rond de snavel	witbruin
Borst	Bruin wit gedruppeld
Flanken	Bruin wit gedruppeld
Buik	Bruin wit gedruppeld
Aarsbevedering	wit
Handpennen	Donkerbruin
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Donkerbruin
Staartpennen	Vier buitenste staartpennen boven en onderzijde van af de helft van de pen is wit
Bovenstaartdekveren	Bruin
Onderstaartdekveren	Wit
Stuit	Bruin
Rugdek, van koptekening tot stuit	Bruin wit gedruppeld
Poten	Zwart
Nagels	Zwart
Snavel	Zwart
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:	
Koptekening	Bruin
Kintekening	Bruin met fijne witte druppels
Wenkbrauwstreep	Bruin met fijne witte druppels

Keurtechnische aanwijzingen : Notenkraker

De vleugels mogen niet gekruist zijn.

De pootkleur moet zo donker mogelijk zijn.

De lichaamstekening, witte druppels, moet een regelmatig en scherp verloop hebben. Naar de kop vervloei de druppeltekening deels in elkaar

[Terug naar index](#)

Pestvogel (*Bombycilla garrulus*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied van de pestvogel is Noord- en Noordoost Europa, in de winter trekkend naar West- en Midden-Europa tot aan de Rode Zee. Een echte fruiteter, leeft in zwermen. Jonge vogels te herkennen aan een bleke rechte streep op de toppen van de handpennen. In Nederland vormen de pestvogels tijdens koude winters soms een ware invasie.

Ondersoorten

- B. japonica** Japanse pestvogel, welke het geel in de vleugels mist en een rode- in plaats van een gele staartband heeft. 20 cm groot.
- B. cedrirum** Ceder pestvogel, uit Noord-Amerika. Mist zowel de gele- als de witte vleugeltekening maar bezit wel een gele staartband. 17 cm groot. De lakveertjes zijn wel aanwezig. Kleur: Lichtbruin, grijs op vleugels en lichtgeel op de flanken. Rug donkerbruin.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de pestvogel is naast het eumelanine en het phaeomelanine ook rood en geel carotenoïde aanwezig.

Fysieke standaard

Formaat:

De pestvogel is ± 18 cm. lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De pestvogel is een forse vogel met een volle borst, vrij plomp door de korte staart. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een bijna rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel. Op het midden van de schedel staat een rozebruine kuif die op gezet kan worden.

Houding:

Een pestvogel dient rustig op stok te zitten. Hij is van nature zeer rustig en kalm. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Korte smalle snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de pestvogel zijn:

- Voorhoofdsband: Deze is 2 cm breed.
- Teugel: De teugel loopt vanaf de borstelveren rond de snavel om het oog tot 2 cm achter het oog uitlopend in een punt.
- Kinvlek: Onder de snavel strak afgetekend.
- Handpennen: De handpennen bezitten aan de buitenvlag een helder gele top die samen een band vormen.
- Vleugelband: De handpennen bezitten in het midden een witte vleugelband.
- Armpennen: De armpennen tonen op het einde wit gezoomde punten.
- Armpennen: De verlengde schachten bezitten de lakplaatjes.
- Staart: De toppen van de staartpennen zijn geel, deze vormen een band.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Pestvogel man en pop

	Wildkleur
Kleur:	
Kop en nek	Bezit een opgerichte rozebruine kuif. Schedel en nek rozebruin, wangen voorzijde kaneelbruin, overgaand naar rozebruin.
Lichaam	Borst bruingrijs, flanken bleek bruingrijs, onderlijf, buik en aarsstreek beigebruin. Rugdek / mantel donker matbruin overvloeiend naar grijsbruin, stuit grijs
Vleugels	Handpennen zwart, armpennen grijszwart
Staat	Aan basis grijs, overvloeiend naar zwart, Bovenstaartdekveren grijs, Onderstaartdekveren roestbruin.
Snavel	Zwart, vleeskleurig aan de basis. Met een wit streepje een de basis van de ondersnavel. Borstelveren zwart.
Poten	Zwart, nagels zwart.
Ogen	Oogring donkerbruin, pupil zwart.
Tekeningkleur:	
Kop en nek	Voorhoofdsband roestkleurig. Teugel zwart. Aan de onderzijde wit omzoomt, kin / keelvlak zwart
Vleugels	Op de handpennen zit in het midden een witte dwarsstreep. De toppen aan het uiteinde van de buitenvlag zijn helder geel. Op het uiteinde van de grijszwarte armpennen zitten wit gezoomde punten. De verlengde schacht van de armpennen hebben lak rode hoornplaatjes (± 8 , minimaal 3).
Staat	Op het uiteinde van de staart zit een gele brede band.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen: Pestvogel man en pop

Pestvogel	<p>Het verschil tussen man en pop pestvogel is te minimaal om voor een pop een aparte standaard op te stellen.</p> <p>Bij de pop zijn de mantel en de schouderveren meer grijsachtig.</p> <p>Kin / keelvlak zijn minder diepzwart.</p> <p>De lakrode hoornplaatjes zijn meestal kleiner en ontbreken soms en de gele rand aan het uiteinde van de staart is smaller.</p> <p>Daarom kan men als TT-vogel beter gebruik maken van een man pestvogel welke de standaard beter zal benaderen.</p> <p>Een pestvogel dient strak van bevedering te zijn.</p> <p>Losse bevedering dient buiten de rubriek bevedering ook bij conditie bestraft te worden.</p> <p>De borstkleur dient zo diep en egaal mogelijk van kleur te zijn, vaak zien we dat de borstkleur vlekkelig is.</p> <p>Fouten zijn; onregelmatige- kin / keelvlak, vleugeltekening, gele en witte uiteinden, gele staartrand.</p> <p>Ook mag de vleugelstreep niet onderbroken zijn.</p> <p>Er moeten minimaal 3 lakrode hoornplaatjes per zijde aanwezig zijn, het maximale is 8.</p> <p>Jonge vogels zijn herkenbaar aan de gele eindband van de staart.</p> <p>Deze is nog niet helder geel en de lakplaatjes zijn niet volledig.</p> <p>Ook missen eerstejaars pestvogels de witte omzoming bij de armpennen</p> <p>.</p>
------------------	---

[Terug naar index](#)

Kauw (*Corvus m. monedula*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied: geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden en Noordoost Europa. In Nederland zeer algemeen. Karakteristieke kopvorm met hoog voorhoofd. Loopt met kop knikkend rechtop. Opvallend is ook de blauwgrijze tot witte oogkleur. De kauw is een koloniebroeder.

Ondersoorten

De twee ondersoorten zijn:

***Corvus m. spermologus*:** West- en Zuid Europa. Is geheel donkerder van kleur.

***Corvus m. soemmerringii*:** Noordoost Europa. Vooral in het najaar heeft deze ondersoort opvallende grijswitte vlekken beneden op de zijhals, tussenvormen met een lichte zijhals en achterhoofd komen ook voor.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de kauw komt alleen eumelanine voor. Voor de vererving en het gevolg van de mutaties wordt verwezen naar de standaard erfelijkheid en veerstructuur. Van de kauw zijn de volgende mutaties bekend satinet, bruin en agaath. Van deze mutaties zijn nog maar weinig vogels voorhanden, daarom zijn ze nog niet beschreven.

Fysieke standaard

Formaat:

De kauw is 30- 34 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De kauw heeft een geblokt type. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. Op rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Ook de nek is vol. De kop is karakteristiek te noemen met een hoog voorhoofd. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de Kauw niet de indruk maken uitgezakt te zijn.

Houding:

De kauw is een vrij rustige vogel en zal zich goed kunnen tonen tijdens de keuring. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. Hij toont daarbij een fiere en aandachtige houding. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten bijna op het eind van de staart.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwing en of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke teen een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Relatief kort, maar erg stevig. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. Ook staart heeft een enigszins afgeplat model. Bij de neusgaten zwarte borstelharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de kauw:

- Voorhoofdband: De voorhoofdband wordt gevormd door de kruin tot bovenop de schedel en loopt daarna achter het oog langs tot aan de borst. Deze tekening is een duidelijke kleurscheiding en zeer kenmerkende voor de kauw. Keuren in schaal 1

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Kauw man en pop.

	Wildkleur
Kleur:	
Kop, masker en achterhoofd	Zilvergrijs, uitvloeiend naar de flank / borstlijn
Borstelveren	Zwart
Borst, buik, flanken, dijën en aarsstreek	Zwart
Rugdek / mantel	Zwart, met een blauwe waas
Onderrug en stuit	Zwart, met een blauwe waas
Vleugels	Zwart, met een blauwe waas
Staartpennen	Zwart, uiteinde afgerond
Poten	Zwart
Nagels	Zwart
Snavel	Zwart
Ogen	Grijswit tot grijs, blauwe oogring. Pupil zwart
Tekeningkleur:	
Voorhoofdband, kruin tot boven op de schede I	Zwart met een blauwachtige glans. Loopt strak achter het oog langs tot aan de borst.

Keurtechnische aanwijzingen: Kauw man en pop

Algemeen	Aangaande de samenstelling van de vleugelpennen van de kraaiachtige wordt opgemerkt, dat de eerste vleugelpen altijd korter is dan de tweede (ongeveer de helft). De tweede vleugelpen is altijd korter dan de derde. De twee langste slagpennen zijn de derde en de vierde. Wanneer we kraaiachtige vogels keuren, mag men nooit de opmerking plaatsen van buitenste pen niet compleet of te kort.
Wildkleur	Er dient op gelet worden dat de nekkleur zo helder mogelijk grijs is. Vaak zien we dat deze niet duidelijk genoeg is. De koptekening dient strak afgelijnd te zijn en mag geen onregelmatig verloop laten zien. De neusharen zijn regelmatig beschadigd, dit is een bevederingfout, in zeer ernstige mate ook straffen bij conditie. De vleugelpennen zijn tamelijk lang, reiken bijna tot aan het uiteinde van de staart. Het model moet vol zijn

[Terug naar index](#)

Bonte Kraai (*Corvus corone cornix*)

Algemene Informatie

Het verspreidingsgebied van de bonte kraai ligt ten noorden en ten oosten van het verspreidingsgebied van de Zwarte Kraai. De Scandinavische landen, Midden- Oost-Europa en de landen rond de Balkan. In overlappinggebieden vaak samen met de zwarte kraai. Tussenvormen komen daar ook vaak voor. Deze intermediaire vormen vertonen verschillende hoeveelheden grijs. In Nederland zeldzame broedvogel en algemene doortrekker en wintergast.

Ondersoorten

De bonte kraai is een ondersoort van de zwarte kraai, *Corvus c. corone*

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de bonte kraai komt alleen eumelanine voor. Van de bonte kraai worden geen mutaties beschreven noch zijn er mutaties bekend.

Fysieke standaard

Formaat:

De bonte kraai is 44-51cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart-

Model:

De bonte kraai is van een robuust type. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. De nek is vol. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de Bonte kraai niet de indruk maken uitgezakt te zijn.

Houding:

De bonte kraai heeft een fiere, aandachtige en rechtopstaande houding en zal zich goed kunnen tonen tijdens de keuring. Hij hoort rechtop te staan, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten tot bijna op het eind van de staart

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke teen een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Stevige zware snavel, met een lichtgebogen punt en zwarte veren aan de basis. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. Ook staart heeft een enigszins afgeplat model. Bij de neusgaten zwarte borstelharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de bonte Kraai:

- De gehele bovenkop tot het achterhoofd zwart, vormt een zwart masker dat loopt via de wangen naar de keel en gaat dan over in een breed uitlopende zwarte bef die nooit strak is af getekend.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Bonte kraai

	Wildkleur
Kleur:	
Kop en masker	Diepzwart
Borstel veren	Zwart
Borst, buik, flanken, dijen en aarsstreek.	Licht vuilgrijs
Rugdek / mantel	Licht vuilgrijs
Onderrug en stuit	Licht vuilgrijs
Vleugels	Zwart, uiteinden afgerond
Staartpennen	Zwart
Poten	Zwart
Nagels	Zwart
Snavel	Zwart
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:	
Voorhoofdband, kruin tot boven op de schedel gehele kop, masker en keel strak afgetekend	Zwart
De zwarte keel gaat over in een bef die niet strak is af getekend	Zwart

Keurtechnische aanwijzingen: Bonte kraai man en pop

Algemeen	Aangaande de samenstelling van de vleugelpennen van de kraaiachtige wordt opgemerkt, dat de eerste vleugelpen altijd korter is dan de tweede (ongeveer de helft). De tweede vleugelpen is altijd korter dan de derde. De twee langste slagpennen zijn de derde en de vierde. Wanneer we kraaiachtige vogels keuren, mag men nooit de opmerking plaatsen van buitenste pen in groei of te kort.
Wildkleur	<p>Hoewel als kleur licht vuilgrijs omschreven staat, geniet de helderste van kleur de voorkeur. De tekening op de dekveren dient een regelmatig verloop te hebben. Vaak zien we dat de aftekening van de licht vuilgrijze veervelden onregelmatig is.</p> <p>De kop tot het achterhoofd, masker en keel zwart dit dient strak afgetekend te zijn. De keeltekening gaat over in een breed uitlopende bef die is zwart en nooit strak afgetekend. Tussenvormen van de bonte- met de zwarte kraai dienen gekeurd te worden wat het dichtst word benaderd en gestraft te worden waar de vogels afwijken.</p> <p>Er dient op gelet te worden, dat de neusharen niet beschadigd zijn.</p> <p>De bonte kraai wordt in schaal 1 gekeurd</p>

[Terug naar index](#)

Zwarte Kraai (*Corvus c. corone*)

Algemene Informatie

Het verspreidingsgebied van de zwarte kraai loopt vanaf Denemarken langs de Westkust naar Zuid- Europa en de Britse Eilanden, uitgezonderd Ierland. Komt zowel in open land als in bewoonde gebieden voor en is een echte territoriumvogel. De zwarte kraai is nauw verwant aan zijn ondersoort, de bonte kraai. Kruisingen vinden plaats waar de verspreidingsgebieden elkaar overlappen. Intermediaire nakomelingen hebben een verschillende hoeveelheid grijze veren.

Ondersoorten

De bonte kraai is een ondersoort van de zwarte Kraai, *Curvus c. corone*.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de zwarte kraai komt alleen eumelanine voor. Voor de vererving en het gevolg van de mutaties wordt verwezen naar de standaard erfelijkheid en veerstructuur. Van de zwarte kraai zijn de volgende mutaties bekend: albino, witte zwartoog, opaal, bruin, agaat en satinet, van deze mutaties zijn nog maar enkele vogels voorhanden vandaar dat ze nog niet verder omschreven worden.

Fysieke standaard

Formaat:

De zwarte kraai is 44- 51 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De zwarte kraai is van een robuust type. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. De nek is vol. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de zwarte kraai niet de indruk maken uitgezakt te zijn.

Houding:

De zwarte kraai heeft een fiere, aandachtige en rechtopzittende houding en zal zich goed kunnen tonen tijdens de keuring. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten bijna op het eind van de staart.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke teen een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBV website](#)

Snavel:

Stevige zware snavel, met een lichtgebogen punt c.q. bolronde bovensnavel en zwarte veren aan de basis. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. De staart heeft een enigszins afgeplat model. Dijbevedering netjes bij elkaar en kort. Bij de neusgaten zwarte borstelharen.

Tekeningpatroon

Tekening onderdelen van de zwarte kraai:

De tekening onderdelen van de zwarte kraai zijn zo beperkt dat de vogel gekeurd dient te worden in schaal 2.

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Zwarte Kraai

	Wildkleur
Kleur:	
Kop en masker	Zwart, met blauw violetachtige glans
Borstelveren	Zwart
Borst, buik, flanken, dijen en aarsstreek.	Zwart, met blauw violetachtige glans
Rugdek / mantel	Zwart, met blauw violetachtige glans
Onderrug stuit	Zwart, met blauw violetachtige glans
Vleugels	Zwart, met blauw violetachtige glans
Staartpennen	Zwart
Poten	Zwart
Nagels	Zwart
Snavel	Zwart
Ogen	Donkerbruin, pupil zwart
Tekeningkleur:	
	Geen tekeningonderdelen, dus keuren in schaal 2

Keurtechnische aanwijzingen: Zwarte Kraai man en pop

Algemeen	<p>Aangaande de samenstelling van de vleugelpennen van de kraaiachtige wordt opgemerkt, dat de eerste vleugelpen altijd korter is dan de tweede (ongeveer de helft).</p> <p>De tweede vleugelpen is altijd korter dan de derde.</p> <p>De twee langste slagpennen zijn de derde en de vierde.</p> <p>Wanneer we kraaiachtige vogels keuren, mag men nooit de opmerking plaatsen van buitenste pen in groei of te kort.</p>
Zwarte kraai	<p>Gelet dient erop te worden, dat de zwarte kraai vol van model is en dat de vleugeldracht gesloten is.</p> <p>Deze komt samen boven de staart.</p> <p>Het ontbreken van de neuswortelharen (borstelveren) is in de eerste plaats een ernstige bevederingfout, moet bij een zeer ernstige bevederingfout ook bestraft worden bij conditie, terwijl dan ook de kleur niet meer optimaal zal zijn.</p> <p>De zwarte kraai moet diep glanzend zwart zijn(blauw violetachtig)</p> <p>Mat gekleurde vogels moeten bestraft worden bij kleur.</p> <p>Jonge kraaien zijn te herkennen aan de bruinzwarte pennen, minder glans en de ogen zijn grijsachtig.</p> <p>De zwarte kraai lijkt veel op de roek maar is te herkennen aan de snavelvorm welke bij de zwarte kraai zwaarder is.</p> <p>Vooraf de bovensnavel is bij de zwarte kraai meer gepunt.</p> <p>Bovendien heeft de zwarte kraai geen naakte gezichtshuid bij de snavel,</p> <p>Keuren in Schaal 2</p>

[Terug naar index](#)

Roek (*Corvus frugileus*)

Algemene Informatie

Deze kolonievogel heeft als verspreidingsgebied West- en Midden-Europa. Ook zien we ze in iets mindere mate in geheel Zuid-Europa en Noordoost-Europa. De vleugels zijn smaller en de vleugelslagen sneller dan bij de zwarte kraai.

Jonge roeken bezitten borstelveren, als deze wat ouder is, wordt de snavelbasis kaal en de onderliggende grijze huid zichtbaar. Het bovendeeel van de poten is, anders dan bij kraaien, met wat veren bekleed. Deze 'broek' maakt ook jonge roeken (jonger dan acht maanden), die nog geen lichte snavelbasis hebben, in het veld herkenbaar.

De ondersoorten

De roek kent geen ondersoorten.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de bevedering van de roek komt alleen eumelanine voor. Zover bekend is er bij de roek een mutatie bekend de albino deze is echter vooralsnog niet in de standaard opgenomen. Het ligt wel in de lijn der verwachting, dat er dezelfde mutaties kunnen optreden als bij de zwarte kraai.

Fysieke standaard

Formaat:

De roek is 41-49 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De roek heeft een robuust type. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. De nek is vol. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de roek niet de indruk maken uitgezakt te zijn.

Houding:

De roek is een nieuwsgierige vogel en zal zich goed kunnen tonen tijdens de keuring. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. Hij toont daarbij een fiere en aandachtige houding. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten bijna op het eind van de staart

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan drie tenen naar voren en één naar achteren, met aan elke teen een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Lichte, lange dolkvormige snavel, die overgaat in een wittige gezichtshuid. Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. De staart heeft een enigszins afgeplat model. Rond de dij is de Roek slordig bevederd, het geen aan "afgezakte sokken" doet denken. Bij de neusgaten zwarte borstelharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de roek:

De tekeningonderdelen van de roek zijn zo beperkt dat de vogel gekeurd dient te worden in schaal 2

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard: Roek man en pop

	Wildkleur
Kleur:	
Kop en masker	Zwart, met een blauwpaarse gloed
Borstelveren	Veerloos witachtig grijs
Borst, buik, flanken, dijen en aarsstreek.	Zwart, met een blauwpaarse gloed.
Rugdek / mantel	Zwart, met een blauwpaarse gloed.
Onderrug en stuit	Zwart, met een blauwpaarse gloed.
Vleugels	Zwart, met een blauwpaarse gloed.
Staartpennen	Zwart uiteinde afgerond
Poten	Zwart
Nagels	Zwart
Snavel	Zwart, veerloos aan de basis
Ogen	Donkerbruin Pupil zwart.
Tekeningkleur:	
Voorhoofdband, kruin tot boven op de schedel	Geen tekeningonderdelen, dus keuren in schaal 2.

Keurtechnische aanwijzingen: Roek man en pop

Algemeen	Aangaande de samenstelling van de vleugelpennen van de kraaiachtige wordt opgemerkt, dat de eerste vleugelpen altijd korter is dan de tweede (ongeveer de helft). De tweede vleugelpen is altijd korter dan de derde. De twee langste slagpennen zijn de derde en de vierde. Wanneer we kraaiachtige vogels keuren, mag men nooit de opmerking plaatsen van buitenste pen niet compleet of te kort.
Roek	Een typisch kenmerk van de roek zijn de losse dijveren bij de broek, dit mag niet bestraft worden. Wel dient de broek een regelmatig verloop te hebben. Buiten een goede conditie dient er op gelet te worden dat de glans niet ontbreekt, dit is een kleurfout. De roek wordt gekeurd in schaal 2.

[Terug naar index](#)

Kwikstaarten

Algemene Informatie bij de Kwikstaarten

Kwikstaarten behoren tot de familie *Motacillidae*. Het zijn slanke vogels die het formaat van een mus hebben met daarbij een lange staart. De staart toont witte randen. Het zijn drukke beweeglijke vogels die veelvuldig op de grond zitten voortdurend met de staart wippen en een relatief slanke snavel hebben. Nestelen in holtes of vegetatie. Kwikstaarten hebben een contrastrijk verenkleed.

Witte kwikstaart	
Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla alba alba</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	18 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa met uitzondering van gebied waar de rouwkwikstaart voorkomt. Broedt bij boerderijen en in steden en dorpen, in de omgeving van water. Meestal in spleten of holten, onder dakpannen en de meest vreemde plaatsen, uit de regen. De staart wipt vaak op en neer.
Opmerking:	Bij de pop vloeit het grijs van het rugdek over in de zwarte schedel. Sommige poppen hebben zelfs helemaal geen zwart op de kop. In winterkleed is de schedel ook bij de man grijs bewaasd. Het wit aan de kop is dan grijs en de keel is wit. De zwarte borst blijft half maanvormig aanwezig. Jonge vogels zijn contrastloos grijs en bezitten een donkergrijze driehoekige vlek op de middenborst.
Kleur en tekening:	Man in zomerkleed. Kop; voorhoofd tot de ogen wit, achterschedel zwart. Wangen; wit, dit loopt door tot aan het wit bij de snavel. Keel; zwart.
Lichaam:	Borst; zwart, doorlopend vanuit de keel en strak afgelijnd. Onderlijf; wit. Flanken; iets grijs bewaasd. Mantel / rugdek; grijs. Stuit; grijs. Tussen borst en vleugelbocht; wit.
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwart, met smalle witte zoom. Armpennen; zwart, met brede witte zoom. Kleine dekveren; beige zoom. Grote dekveren; zwart, met beige zoom en witte toppen. Hierdoor ontstaat een witte vleugelband. Staart; zwart met witte buitenpennen.
Snavel:	Zwart. Vrij lang loopbeen, dat bijna verticaal staat.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart

[Terug naar index](#)

Rouwkwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla alba yarrellii</i>
Ondersoorten:	<p><i>M. a. dukhunensis:</i> Heeft meer wit in de vleugels. <i>M. a. subpersonata:</i> Heeft meer zwart aan de zijkant van de kop. Verder: <i>M. a. personata</i>, <i>M. a. alboides</i>, <i>M.a. ocularis</i>, <i>M. a. Leukopsis e</i> <i>M.a. baicalensis</i>.</p>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	18,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Britse eilanden en kust van West Europa. Broedt gelijk aan de witte kwikstaart.
Opmerking:	<p>Bij de pop is het zwart meer donkergrijs en vaak vlekkelig. Jonge vogels hebben een grijze kop en een grijze vlek op de borst. Na de 1^e jaars rui wordt de kop dofgeel en de grijze borstvlek een half zwart maantje. Volwassen vogels in de winter: Witte keel en zwarte borst (halve maan). Jongen lijken op de grote gele kwikstaart maar hebben witte- in plaats van gele onderstaartdekveren. Verschil rouwkwikstaart en witte kwikstaart: Het wit tussen borst en vleugelbocht van de witte kwikstaart is bij de rouwkwikstaart geheel zwart</p>
Kleur en tekening:	Man in zomerkleed. Kop; voorhoofd doorlopend naar wangen wit. Schedel en nek; zwart. Keel; zwart.
Lichaam:	Borst; half rond zwart maanvormig. Onderlijf; wit. Flanken; grijs. Mantel / rugdek en stuit; glanzend zwart.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; zwart, de armpennen en dekveren wit gezoomd met twee witte vleugelbanden. Staart; zwart, met witte buitenpennen.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart. Vrij lang loopbeen, dat bijna verticaal staat.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Grote gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla cinera cinera</i>
Ondersoorten:	<i>M. c. Carnariensis</i> en <i>M. c. Schmitzi</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	18 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied; geheel Europa uitgezonderd Scandinavië. Broedt nabij heuvelland, beken en meren en traag stromende rivieren, in holtes of spleten in rotsen of onder bruggen. Heeft een lange staart en bruine poten.
Opmerking:	Bij de pop is de keel wit met enig grijszwart. In winterkleed wenkbrauwstreep en baardstreep crème, schedel meer bruin en keel bleek geel in plaats van zwart. Geel op stuit en aars net als zomerkleed. Jongen hebben een gele aarsstreek en een roze ondersnavel.
Kleur en tekening:	Man in zomerkleed. Kop; schedel en nek grijsbruin. Wangen; grijs. Keel en kin; zwart, bij de pop bruin. Wenkbrauwstreep en baardstreep; wit, halve oogring aan onderzijde van het oog.
Lichaam:	Borst; geel. Onderlijf en flanken; bleekgeel. Aarsstreek; fel geel. Mantel / rugdek; grijs. Stuit; geelgroen.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, aan basis wit (alleen zichtbaar bij het vliegen) met lichte zoom. Dekveren; zwartbruin met bruine zoom. Staart; middenpennen zwart, aan de basis grijs. Buitenpennen, wit met zwarte schacht.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Bruin roze, nagels zwart.
Ogen:	Zwart.

Gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla flava flava</i>
Ondersoorten:	Van de gele kwikstaart, <i>motacilla flava</i> zijn zeven ondersoorten bekend. Voor ornithologen zijn dit de hardste noten om te kraken. Sommigen willen b.v. <i>flavissima</i> en <i>lutea</i> in één soort onderbrengen de <i>M lutea</i> . Ze komen voor in een gebied rond de Kaspische zee. Er komen kleurvariaties per ras voor en ook worden er vogels gezien die op geen van de bekende rassen lijken. Dit zijn tussenvormen in een overgangsgebied. De poppen van de ondersoorten zijn nagenoeg gelijk en van de mannetjes staat alleen de wetenschappelijke naam vermeld. Wij hebben hieraan een Nederlandse naam gekoppeld, welke karakteristieke kenmerken van de ondersoort weergeeft of aan het verspreidingsgebied.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	16,5 cm.
Algemeen:	De gele kwikstaart komt met zijn ondersoorten in heel Europa voor. De gele kwikstaart <i>M. flava flava</i> in West Europa en Zuid Scandinavië. Met uitzondering van de Britse eilanden.
Opmerking:	Poppen soms enkel wat geel bij aarsstreek. Keel bij de pop wit. Rugdek en mantel bij de pop olijfbuin. Jongen grijsbruin van boven, vuilwit van onderen, keel omzoomt (bruin zwart). Voor de trek plaats vindt zijn ze geheel op kleur. Man lijkt in de winter erg veel op de pop.
Kleur en tekening:	Kop; schedel blauwgrijs. Wangen; grijs. Wenkbrauwstreep; wit. Baardstreep; wit, aan de basis overgaand in geel. Keel; geel.
Lichaam:	Borst en onderlijf; geel. Mantel / rugdek; olijfgroen, iets gehamerd. Stuit; grijs.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, licht gezoomd. Armpennen; zwart met brede, bleke zoom. Dekveren; bruingrijs met donkere schacht. Vleugels; twee bleekgele vleugel bandjes en een zwart gezoomd bandje boven 1 ^e vleugelband. Staart; zwart, met witte buitenspiegels.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Balkan gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla flava feldegg</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	16 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Balkan, Zwarte Zeekust.
Opmerking:	De pop heeft een grijsgroen rugdek en mantel. Het vleugeldek van de pop is zwartgrijs met dezelfde tekening als de man. De pop mist in de staart de groene waas van de man.
Kleur en tekening:	Mantel en rugdek; bij de man groengrijs.
Lichaam:	Borst onderlijf en flanken; goudgeel.
Vleugels en staart:	Het vleugeldek is grijs met een groene waas en licht grijze omzoming. De toppen van de kleine vleugeldekveren zijn wit en vormen samen een vleugelband. De staart van de man is zwartgrijs met een groene waas en brede witte zoom aan de buitenste pennen. Het onderstaartdek is wit.
Snavel:	Zwart
Poten:	Zwart
Ogen:	Zwart

Engelse gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla flava flavissima</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	16 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Britse eilanden en de tegenoverliggende kust van Europa. Biotoop: Duinen, graslanden en akkers.
Opmerking:	Winterkleed: Geel is fletser en de schedel meer bruin, evenals de wangen en de bleekgele wenkbrauwstreep. Pop: Is nagenoeg gelijk aan de man in winterkleed. Onderlijf: Geheel bleekgeel. Bovenzijde: Grijsgroen. Keel: Wit.
Kleur en tekening:	Man: Kop: Gehele kop geelgroen, op schedel en wangen groene waas, in de nek groengrijs. Keel lichtgeel. Teugel en rond het oog lichtgrijs.
Lichaam:	Borst; geel. Flank; geel, met iets groene waas. Onderlijf; geel. Mantel / rugdek; geelgroen, met grijze waas. Stuit; groen, met grijze waas.
Vleugels en staart:	Vleugels; bruine slagpennen en dekveren met lichte omzoming. Op vleugelbocht witte vleugelband. Staart; bruin met witte vlag aan de buitenste pen.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Noorse gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla flava tunbergi</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	16,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Noord-Scandinavië en Rusland. Karakteristiek grijze kop en bruine wangen, ook de groene dijveren zijn kenmerkend.
Opmerking:	Winterkleed: Minder geel en meer bruin bewaasd. Pop; bovenzijde geheel donkerbruin met vage vleugelband. Borst; beige. Onderlijf; gele gloed, vooral bij de broek. Keel; wit. Man en pop in winterkleed bijna niet van elkaar te onderscheiden.
Kleur en tekening:	Man zomerkleed: Kop; gehele schedel zwart, loopt onder het oog door tot in de nek. Keel en wangen; geel. Baardstreep; wit. Keel; geel, bij de pop wit.
Lichaam:	Borst; geel, bij vleugelbocht groengeel. Onderlijf; geel, dijen groen. Flanken; groen bewaasd. Mantel / rugdek en stuit; olijfgroen, met grijze waas.
Vleugels en staart:	Slagpennen; donkerbruin, met smalle lichte zoom op buitenvlag. Armpennen; donkerbruin, lichte zoom is wat breder. Vleugeldeken; donkerbruin met lichte zoom en bleekgele toppen, samen twee bleekgele vleugelbanden vormend. Staart; donkerbruin, met witte spiegels aan buitenzijde.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Italiaanse gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	16,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Italië, Albanië en centrale Mediterrane eilanden. Kenmerken; grijze kop, geen wenkbrauwstreep, witte keel en bruine pennen.
Opmerking:	Winterkleed: Gehele kop bruin bewaasd. Man en pop in winterkleed bijna niet van elkaar te onderscheiden, pop iets grauwer van kleur.
Kleur en tekening:	Kop, schedel, wangen en nek; grijs, rond het oog donkergrijs. Keel; wit.
Lichaam:	Borst en onderlijf; geel, in flanken bruine waas. Mantel / rugdek en stuit; olijfbuin.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin met crème omzoming, meer lichtbruin naar de rug toe. Dekveren; donkerbruin, met twee crèmewitte vleugelbanden en lichtbruine omzoming. Staart; met smalle lichte zoom en witte staartspiegels.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Iberische gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla flava iberiae</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	16,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuidwest Europa. Kenmerken: Donkergrijze kop, witte keel, vaag wenkbrauwstreepje achter het oog. Vrij donker olijfgroen op de mantel.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop, schedel, nek en wangen; donkergrijs, achter het oog een vage korte witte wenkbrauwstreep. Keel; wit.
Lichaam:	Borst; geel iets bruin bij vleugelbocht. Onderlijf en flanken; geel. Mantel / rugdek; olijfgroen, met bruine waas. Stuit; meer grijze waas.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; donkerbruin, met brede geelbruine zoom en twee witte vleugelbanden. Staart; zwartbruin, spiegel aan basis bleekgeel overgaand in wit.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Russische gele kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla flava beema</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website
Formaat:	17 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuidoost Rusland. Kenmerken: Klein wit keelvlekje, grijze kop, witte wenkbrauwstreep, vol model en zwarte pennen.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop; schedel, nek en wangen donkergrijs. Wenkbrauwstreep; wit, onder het oog wit randje. Onder de snavel heel klein wit vlekje overgaand in de gele keel.
Lichaam:	Borst, onderzijde en flanken; geel, in borst bij vleugelbocht en flanken iets groene waas. Mantel / rugdek; olijfgroen, met iets grijze zoom. Stuit; meer grijs.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; zwart, met smalle beige grijze zoom. Twee vleugelbanden beigegrijs. Staart; zwart, met witte spiegels.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart. Vrij lang loopbeen, dat bijna verticaal staat.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Citroen kwikstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Motacilla citreola citreola</i>
Ondersoorten:	<i>M. c. werae</i> : Heeft smallere witte vleugelbanden.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	18 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West Rusland, zeldzame gast in West Europa. Direct herkenbaar aan citroengele kleur en zwarte nekband.
Opmerking:	De pop mist het citroengeel en zwarte nekband. Bovenschedel is grijs getint. Wenkbrauw, keel en hals; bleekgeel. Wangen; donkerbruin met lichtgeel. Onderlijf; zacht citroengeel met grijze waas, vooral in de flanken. Jonge vogels: Bovenzijde grijsbruin, witte vleugelbanden, aarsstreek wit en bruingele borst. Brede witte vleugelstrepen. Lichte omranding van de oorstreek. Winterkleed: vuilgele borst en grauw rugdek. Man en pop zijn dan moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Kleur en tekening:	Kop; gehele kop citroengeel. Tussen nek en mantel een duidelijke zwarte streep tot aan de vleugelbocht.
Lichaam:	Borst, onderlijf en flanken; diep geel. Mantel / rugdek; grijs, met iets bruine waas en fijne zwarte omzoming. Stuit; grijs.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; zwart. Armpennen; brede witte zoom, ook twee brede witte vleugelbanden. Staart; zwart, met witte spiegels.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Mezen

Algemene Informatie bij de mezen

Mezen behoren tot de familie *Paridae*. Het zijn relatief kleine vogels die het formaat van een mus hebben. Deze vogels hebben een kort snaveltje en tonen zich vaak schuw, maar toch kwiek. Na de broedperiode vormen de vogels groepen, waar soms ook boomklevers en goudhaantjes deel van uitmaken. De meeste mezen zijn echte holenbroeders met vaak bijzonder grote nesten tot wel 14 eieren.

Koolmees	
Wetenschappelijke naam:	<i>P. m. blanford</i> , <i>P.m. corsus</i> , <i>P. m. excelsus</i> en <i>P. m. newtoni</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 – 15 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa uitgezonderd Siberië. Leeft in alle soorten bossen, parken en tuinen. Algemeen bekend in Nederland, het hele jaar door.
Opmerking:	Jonge koolmezen hebben gele wangen en missen het zwart op de borst. Van de koolmees is een pastel / grijsvleugel mutatie bekend. Opvallend gereduceerde vleugel- en staartkleur, ook het rugdek is lichter. Schedel en keelvlak hebben nagenoeg dezelfde kleur dan de wildkleur.
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel tot in de nek en keel glanzend zwart. Wangen; wit.
Lichaam:	Borst; een zwarte band, doorlopend vanuit de keel tot en met aarsstreep. Bij de man is deze duidelijk breder dan bij de pop. Het gehele onderlijf vanaf de keelstreek geel, bij de aars overgaand in wit. Rugdek / mantel; groengeel. Stuit; blauwgrijs
Vleugels en staart:	Vleugeldek; blauwgrijs, de toppen van slag- en binnenpennen zwart, iets licht gezoomd. In het midden van de vleugels een witte vleugelband. Bovenstaart; blauwgrijs, in het midden donkerder. Onderzijde; toont witte staartspiegels.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Donkergrijs.
Ogen:	Zwart.

Zwarte mees	
Wetenschappelijke naam:	<i>Parus ater ater</i>
Ondersoorten:	<i>P. a. atlas</i> : <i>P. a. britannicus</i> : Komt voor in Brittannië. Mantel is olijfgroen van tint. <i>P. a. cyriotus</i> : Komt voor op Cyprus. Mantel olijfgrijs met beige tint. Flanken roodachtig beige. <i>P. a. ledouci</i> : Algerije en Tunesië. Heeft een gelige buik. Verder kent men de <i>P. a. michalowskii</i> , <i>P. a. sardus</i> en <i>P. a. hibernicus</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	11 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. Leeft in naaldbossen. Heeft een vrij korte staart.
Opmerking:	Er is geen uiterlijk verschil tussen man en pop.
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel diepzwart, op de achterschedel tot in de nek een witte vlek. Kinvlek; zwart. Aansluitend op de zwarte kinvlek een zwarte keelband, deze loopt niet helemaal door. Wangstreek; vanaf de snavel tot in de nek wit. Zowel de schedel als de keelband is niet helemaal strak afgetekend.
Lichaam:	Borst; beige, overgaand in geelachtig bruin. Flanken en broek; iets dieper. Mantel en stuit; grijs, met een iets blauwe tint.
Vleugels en staart:	Slagpennen en armpennen; zwartbruin met lichte zoom. De kleine vleugeldekveren zijn grijs met een blauwe tint. Op de vleugels bevinden zich twee witte verticale bandtekeningen. Staart; zwartbruin met iets gele tint.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Pimpelmees	
Wetenschappelijke naam:	<i>Cyanistes caeruleus caeruleus</i>
Ondersoorten:	<i>P. c. cyrenaicae</i> , <i>P. c. degener</i> , <i>P. c. obscurus</i> , <i>P. c. ombriosus</i> , <i>P. c. orientalis</i> , <i>P. c. palmensis</i> , <i>P. c. Tineriffae</i> en <i>P. c. Uramarinus</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	12 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa uitgezonderd het hoge Noorden. Leeft in loof- en gemengde bossen, tuinen en parken. In de winter vaak op de voertafel te zien. Mezen zijn direct te herkennen aan de korte snavel.
Opmerking:	De breedte van de bef verschilt nogal per vogel, dit is echter geen indicatie van man en pop. Er is geen duidelijk verschil tussen man en pop. Meestal zijn de poppen wat fletser van kleur. In de winter is de schedel en mantel matter van kleur. Jonge vogels in jeugdkleed: Gele wangen en grijsgroene schedel.
Kleur en tekening:	Kop; witte voorhoofdsband, deze is smaller rond de diepblauwe kruin. Aan onderzijde van de kop een zwarte band, welke rond de gehele kop doorloopt, een bef vormend onder de snavel. Deze bef wordt smaller onder de snavel. De zwarte oogstreep begint bij de snavel, door het oog, naar de zwarte band in de nek. Onder deze band een brede blauwe nekband. Tussen deze twee zwarte banden is de kleur wit.
Lichaam:	Borst; helder geel. Flanken; iets dieper geel. Onderbuik; wit, vanaf de onderborst tot in de buik een zwarte streep. Mantel; groen.
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwart, met witte buitenvlag. Armpennen; diepblauw. Kleine vleugeldekveren; zijn tot aan de witte band, tussen de dekveren en pennen, kobaltblauw. Staart; blauw, met witte zoom, toppen zwart. Onderstaart; wit.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Grijsblauw tot zwart, nagels zwart.
Ogen:	Zwart

Azuurmees	
Wetenschappelijke naam:	<i>Cyanistes cyanus cyanus</i>
Ondersoorten:	<i>P. c. flavipectus</i> : Komt voor van Centraal Azië tot Noordwest Kirgizië. Heeft een gele buikvlek.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	13 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Oost Europa in loof- en gemengd bos, vooral bij rivieren en water. In de winter vaak bij rietvelden. Lijkt veel op de pimpelmees, maar heeft opvallend witte kop en borst en twee vrij brede vleugelstrepen. Staart is vrij lang. Bevedering is vrij pluizig,
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel tot in de nek wit. Wangen; witgrijs. Op de buik een blauwe vlek. Nekstreek; diepblauw. Keel; wit, vanaf het oog tot in de nek een smalle zwarte streep.
Lichaam:	Borst en flanken; wit. Onderlijf; wit, met een iets grijze waas. Vanaf de borst een smalle blauwgrijze streep tot aan de poten. Rugdek en stuit, blauwgrijs.
Vleugels en staart:	Slagpennen; blauw met zwarte toppen en lichte omzoming. Toont twee duidelijke witte vleugelbandstrepen. Staart; blauw, met lichte omzoming.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Blauwgrijs tot zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Kuifmees

Wetenschappelijke naam:	<i>Lophophanes cristatus cristatus</i>
Ondersoorten:	<i>P. c. Abadei</i> , <i>P. c. Mitratus</i> , <i>P. c. scoticus</i> en <i>P. c. weigoldi</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	12 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Bijna geheel Europa uitgezonderd het hoge Noorden, uiterste Oosten, Italië en Engeland. Broedt in naaldbossen (vooral pijnbomen). Nestelt in holtes in verrot hout. De kuifmees kan zelf deze holtes hakken. Direct herkenbaar aan de duidelijke kuif en zwart / witte tekening.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop; schedel (kuif) zwart met grijze omzoming, onderzijde kuif meer wit. Boven het oog meer grijs. Wangen; grijs, aan de achterzijde omgeven door een zwarte rand. Keel / bef; zwart, aan de onderzijde van de bef begint de zwarte nekring, welke geheel doorloopt tot en met de kuif. Tussen wang- en nekstreep; wit, met iets grijs.
Lichaam:	Borst en onderbuik; witachtig grijs. Flanken; iets bruinachtig. Rugdek en stuit; bruingrijs.
Vleugels en staart:	Vleugels; zwartbruin, met lichte omzoming. Bovenstaart; duidelijk lichter.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Grijs tot zwart. Nagels zwart
Ogen:	Donkerbruin.

Glanskopmees

Wetenschappelijke naam:	<i>Poecile palustris palustris</i>
Ondersoorten:	<i>P. p. dresseri</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	12 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West-, Midden- en Oost-Europa. Leeft in loof- en gemengde bossen en in dicht gebladerde struiken.
Opmerking:	Lijkt veel op de matkopmees. Mist witte vlek op de vleugels. De schedel glanst. Jonge glanskopmezen zijn nauwelijks te onderscheiden van de jongen van de matkopmees
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel tot in de nek glanzend zwart. Kinvlek; zwart, deze is niet geheel strak afgetekend. Wangstreep; licht crèmeachtig. Achternek; bruiner.
Lichaam:	Borst en onderlijf; licht crèmeachtig. Flanken; bruin bewaasd. Mantel / rugdek en stuit; bruin.
Vleugels en staart:	Zwartbruin. Dekveren wat dieper bruin.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Grijs.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Matkopmees

Wetenschappelijke naam:	<i>Poecile montanus montanus</i>
Ondersoorten:	<i>P. m. borealis</i> : Het noordelijke ras. Is groter en bleker met zuiver witte wangen. Het rugdek is meer grijs. <i>P. m. kleinschmidte</i> : Het Britse ras. Heeft gelig bruine flanken, die vooral buiten de broedtijd goed waarneembaar zijn. De mantel is bruin <i>P. m. rhenanus</i> en <i>P. m. salicarius</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website..
Formaat:	12 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West-, Noord- en Oost-Europa. Leeft in naald-, gemengde- en berkenbossen, ook in bergstreken. Lijk zeer veel op de glanskopmees, maar is herkenbaar aan de witte vlek op de vleugels en de matte kopkleur.
Opmerking:	Bij jonge vogels geen of nauwelijks verschil met de glanskopmees jongen. Het winterkleed is grauwer van kleur
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel matzwart, evenals het kleine niet strak afgetekende beffe. Wangstreek; wit, met bruingrijze tint. Achterhals / nek; bruingrijs.
Lichaam:	Borst; wit, met bruingrijze tint. Flanken; licht beigebruin. Onderlijf; iets lichter. Rugdek en stuit; grijsbruin.
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwartbruin, met smalle bruine zoom. Armpennen; warmer bruin en meer omzoming. Lichte banen op de armpennen. Staart; zwart met bruine omzoming.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Grijs, nagels grijs
Ogen:	Zwart

Staartmees

Wetenschappelijke naam:	<i>Aegithalos caudatus europaeus</i>
Ondersoorten:	<i>A. c. cadatus</i> : Komt voor in Noordoost Europa. Heeft een geheel witte kop. <i>A. c. taiti</i> : Komt voor in Zuid Spanje, Italië en Turkije. Is zwartachtig. De wangen zijn fijn grijs bestreep. Wijnrode tint op de flanken. <i>A. c. rosaceus</i> : Komt voor in Brittannië en Ierland. Het Britse ras heeft een witte kop met een donkere brede streep boven het oog, roze geelbruin getinte schouderveren, stuit en anaalstreek. Witte vleugelvelden en gele oogring. <i>A. c. Sibiricus</i> : Komt voor in Oost - Rusland tot Azië. Mantel grijs, flanken grijswit met fijne streeptekening. <i>A. c. tephronotus</i> : Komt voor in Turkije. Heeft een donkere kinvlek, een grijze mantel en een relatief korte staart.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm, de staartlengte maakt voor meer dan de helft deel uit van de totale lichaamslengte.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. Leeft in loof- en gemengde bossen. Koepelvormig nest van mos. Vaak samen met andere mezen. Er zijn ondersoorten bekend van de staartmees.
Opmerking:	Opmerking: een jonge vogel heeft donkere wangen, minder roze en een kortere staart. Intermediaire vorm komt voor in Noord- en Centraal Europa. Man en pop zijn gelijk van kleur en tekening.
Kleur en tekening:	Kop; wit, met brede zwarte kruin. Strepen rond de snavel en oog iets rozige tint met fijne donkere streepjes. Op de borst vaak een band van donkere vlekken.
Lichaam:	Borst en onderlijf; wit. Flanken; licht roodbruin. Mantel / rugdek; in het midden zwart, ter hoogte van de schouders wijnrood of roodbruin.
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwart. Armpennen; vrij brede witte zoom. Smalle staart; zwart, buitenzijde witte spiegels tot driekwart van de staart.
Snavel:	Zwart
Poten:	Donkerbruin tot zwart, nagels zwart.
Ogen:	Zwart, met een rode oogring.

[Terug naar index](#)

Bruinkopmees	
Wetenschappelijke naam:	<i>Parus cinctus cinctus</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Het hoge Noorden van Europa in de naaldwouden en berkenbossen. Qua kleur en tekening heeft de bruinkopmees wat weg van de ringmus, zeker aan de voorzijde, maar aan staart- en snavelvorm direct als mees te herkennen.
Opmerking:	Er is geen geslachtsonderscheid tussen man en pop.
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel dof donkerbruin, bij het oog zwart. Wangen; wit tot grijsachtig, doorlopend tot in de nek. Kinvlek / bef; zwart, loopt tot aan de borst en onder de wangen door en is vaak getand aan de onderzijde. In rustkleed minder sprekend.
Lichaam:	Borst / onderlijf; grijsachtig met zwarte ondergrond. Flanken; roestgeel, in de zomer minder opvallend. Rugdek / stuit; geelbruin
Vleugels en staart:	Bruin, slagpennen bruin met duidelijke grijs witte omzoming. Staart; bruin, met licht zoom
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Buidelmees	
Wetenschappelijke naam:	<i>Remus pendulines pendulines</i>
Ondersoorten:	<i>R. p. caspius</i> en <i>R. p. macronyx</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	11 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Hoofdzakelijk in Zuid- en Oost-Europa, soms ook in West-Europa. Leeft in struikgewas aan rivieroever, moerassen of kreupelhout, nabij rietvelden. Dankt zijn naam aan zijn nestbouw in de vorm van een buidel. Deze wordt opgehangen aan het uiteinde van een twijg, soms dicht boven het water.
Opmerking:	Jonge vogels missen de zwarte koptekening en zijn op het rugdek en mantel gelig grijsbruin. De man heeft een breder masker en warm roodbruine veervelden op rug en borst.
Kleur en tekening:	Kop; bovenschedel, nek en keel, grijs, met iets bruine tint. Vanaf de snavel, rond het oog en wangstreek, loopt het zwarte masker.
Lichaam:	Borst; roodbruin. Bij de pop lichtbruin. Onderlijf en flanken; beigebruin. Mantel / rugdek; man diep roodbruin bij de pop bruin.
Vleugels en staart:	Zowel vleugel- als staartpennen bruin, met iets omzoming. Slagpennen en grote vleugeldekken; zwart, met witgrijze omzoming. Staart; zwart, met witgrijze omzoming.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart, in de winter iets lichter.
Ogen:	Zwart, met donkerbruine iris.

[Terug naar index](#)

Baardman

Algemene Informatie

De baardman hoort tot het geslacht *Timaliidae*, de grote familie der mezen. Van de 2 ondersoorten die de Baardman telt, wordt de nominaatvorm (*P. b. biarmicus*) in onze omgeving aangetroffen. De baardman is in Nederland een vogel, die op de rode lijst voorkomt. De hier levende Baardmannen zijn grotendeels standvogels. In de wintermaanden komen verplaatsingen, onder invloed van de temperatuur voor.

Ondersoorten

De ondersoorten zijn:

<i>Panurus biarmicus biarmicus</i> :	Engeland, oost-, zuid- en centraal Europa.
<i>Panurus biarmicus ruscicus</i> :	Oost Europa, Rusland, Iran en Mantsjoerije.
<i>Panurus biarmicus occidentalis</i> :	Balkan.

Erfelijkheid en veerstructuur

In de gehele bevedering van de baardman treffen wij phaeomelanine aan, bij de man meer dan bij de pop. In de bevedering van de baardman bevindt zich geen carotenoïde.

Fysieke vorm:

Formaat:

De ideale baardman moet een langgerekte indruk geven en moet 16.5 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De Baardman is een langgerekte vogel, vol van type. Van opzij gezien moet de borst-/buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:

Een goed getrainde Baardman is een bewegelijke vogel, maar mag niet onrustig zijn. De stand van het lichaam is ongeveer 45° en iets gedrukt. Het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp te worden gedragen, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

[Terug naar index](#)

Poten:

De poten zijn zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie [vogelindex NBvV website](#).

Snavel:

Een smalle, spitse naar verhouding lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon:

Tekeningonderdelen van de Baardman man zijn:

- Vleugeltekening: Slagpennen bruin, buitenvlag witte spiegels.
- Vleugeldekeren: Vanaf de vleugelbocht een zwarte omzoming.
- Staartpennen: De buitenvlag van de staartpennen bestaat uit een tweetal witte veren.
- Onderstaart: Onderstaartdekveren zwart en in een V vorm van ongeveer 2 tot 3 cm lang, en de veren liggen trapsgewijs.
- Tussen het oog en de snavel loopt een zwarte baardstreep, tot aan de borst.
- Kopkleur is helder blauwgrijs.
- Er is een scherpe aftekening tussen de blauwe kopkleur en het kaneelbruine rugdek.

De baardman pop laat als tekening zien:

- Vleugeltekening net zo contrastrijk als bij de man.
 - Onderstaart dekveren bruin.
 - Kopkleur bruin-/grijsachtige tot kaneelbruin.
 - Pop mist baardstrepen.
 - Er zijn poppen die mantelstrepen laten zien, dit is geen fout maar het soort eigen.
- De Baardman man en pop worden beide gekeurd in schaal 1 van het gele keurbriefje).

Mutatie:

Tot op heden zijn er nog geen mutaties bekend van de baardman.

	Baardman man	Baardman pop
Kleur:		
Kop en masker:	Gehele schedel helder blauwgrijs, in de wangen iets lichter van kleur.	Bruin grijsachtig tot kaneelbruin.
Kin:	Witgrijsachtige.	Wit, met iets crème kleur.
Nek:	Helder blauwgrijs.	Bruin grijsachtig tot kaneelbruin.
Mantel / rugdek:	Diep kaneelbruin.	Bruin, fletser dan bij de man.
Keel en borst:	Wit met iets crème waas.	Wit, met een crème waas.
Buik:	Lichtbruin.	Lichtbruin.
Stuit:	Crèmebruin.	Crèmebruin.
Flanken:	Kaneelbruin.	Kaneelbruin.
Dijen:	Crèmebruin.	Crèmebruin.
Vleugelpennen:	Slagpennen zo diep mogelijk kaneelbruin. Buitenvlag witte spiegel.	Bruin, buitenvlag witte spiegel.
Vleugeldekveren:	Dekveren diep kaneelbruin.	Bruin.
Staartpennen:	Diep kaneelbruin.	Bruin .
Bovenstaart dekveren:	Diep kaneelbruin.	Bruin.
Onderstaart dekveren:	Zwart.	Bruin.
Poten en nagels:	Zwart.	Zwart .
Snavel:	Geel.	Donker hoornkleurig .
Ogen:	Zwart. Iris geel.	Pupil zwart. Iris roodbruin.
Tekeningkleur:		
Baardstreep:	Zwart.	Wit.
Omzoming alle vleugelpennen:	Wit.	Zwart .
Smalle omzoming	Zwart.	Wit.
Omzoming buitenvlaggen	Wit.	

Keurtechnische aanwijzingen:

Jonge baardmannen tonen tussen de ogen en snavel een zwarte streep, en bezitten een zwarte teugelstreep.

Er zijn poppen die een streeptekening op de mantel / rugdek laten zien. Dit is niet fout, maar een variatiebreedte binnen de soort. Als er een stam poppen ter keuring wordt aangeboden, moeten dit echter wel vier vogels zijn, met streeptekening of vier zonder streeptekening. Bij het aanwijzen van de prijswinnaar, gaat de pop zonder streeptekening voor.

[Terug naar index](#)

Rood-, blauwborsten en nachtegalen

Algemene Informatie Rood-, blauwborsten en nachtegalen:

De rood-, blauwborsten en nachtegalen zijn relatief kleine vogels met een opgerichte staart. Hebben een sterk op het territorium gericht gedrag. Opvallend zijn de lange loopbenen.

Roodborst	
Wetenschappelijke naam:	<i>Erithacus rubecula rubecula</i>
Ondersoorten:	<i>E. r. rubecula</i> : Komt voor in het grootste deel van Europa <i>E. r. balcanicus</i> : Afkomstig van de Balkan landen <i>E. r. witberbyi</i> : Komt voor op Ierland en Schotland <i>E. r. melophilus</i> : Dit is de Britse vorm. Heeft een diepere bruine tint op de rug en de borst, is dieper doorgekleurd. <i>E. r. tataricus</i> : Turkije en de Kaukasus. <i>E. r. superbus</i> : Leeft op Gran Canaria / Tenerife. Wijkt sterk af in kleur en zang. <i>E. r. caucasicus</i> : Leeft in de Kaukasus <i>E. r. byrcanus</i> : Engeland en Schotland
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. Broedt algemeen in bossen, parken, tuinen en hagen. In het Noorden in weelderige bergweiden en naaldwouden. Is niet schuw, vaak aan te treffen op de grond.
Opmerking:	Jonge roodborsten in jeugdkleed, missen het roodbruine, zijn geheel zwaar gespikkeld. Na 1 ^e jeugdruï komt het volwassen kleed. Wel is de vleugelband duidelijk aanwezig.
Kleur en tekening:	Kop; voorhoofd, wangen en keelstreek oranjebruin. Bovenschedel en nek; grijs, met iets spikkeltekening en een olijfgroene waas. Achter het oog een wit streepje.
Lichaam:	Borst en 1 ^e gedeelte buik; oranjebruin, ter hoogte van vleugelbocht grijs. Onderlijf; lichtgrijs, flanken en broekstreek olijfgrijs. Mantel / rugdek; olijfgrijs, met iets grijze zoom. Stuit; licht oranjebruin.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; olijfgrijs, met smalle donkere zoom, toppen zwart. Dekveren; op uiteinde grijs en een kleine crème vleugelband, vrij vaag. Staart; olijfgrijs, soms oranjebruine gloed aan de basis. Toppen; zwart, met smalle lichte zoom.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Roodgesternde blauwborst	
Wetenschappelijke naam:	<i>Luscinia svecica svecica</i>
Ondersoorten:	<i>L. s. magna</i> : Komt voor in Oost-Turkije en de Kaukasus, met witte vlek op de borst. <i>L. s. pallidogularis</i> , <i>L. s. kobdensis</i> , <i>L. s. saturaitior</i> , <i>L. s. volgae</i> , <i>L. s. namnetum</i> , <i>L. s. abbotti</i> en <i>L. s. przewalskii</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website..
Formaat:	14 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Noord- en Oost-Europa, Noord-Amerika en Alaska. Biotoop; wilgenbosjes en weelderige berkenbossen. Ook langs sloten en vennen, met dicht riet en struikgewas. Moerassige streken. Hipt veel op de grond. "Trekt "met staart.
Opmerking:	De pop mist het kaneelbruin en de borstvlek is crémewit. Totaal wat grauer van kleur, onderlijf meer getekend. De blauwe borstkleur is meer kobaltblauw en minder aanwezig, heeft iets roodbruin in de staart. 1° Jaars: blauwborsten missen het blauw en tonen een crème snavelstreep en een bef, die zwart omrand is. Het kaneelbruin is vaag aanwezig. In winterkleed: Nauwelijks verschil met de gesternde blauwborst. Dan keuren als blauwborst. Bij de mannen is in de winter het blauw op de keel en borst veel minder uitgebreid. De keel is dan geheel of gedeeltelijk bedekt met crèmebeige veren.
Kleur en tekening:	Kop; schedel en nek bruingrijs. Wangen; geelbruin. Wenkbrauwstreep; witgrijsachtig. Keel en borst; diepblauw, met in het midden een strakke kaneelkleurige vlek en aan de onderzijde een wit randje
Lichaam:	Onder de blauwe borst een zwarte borstband, hieronder een smalle witte band. Ter hoogte van de borst / buik een halve maanvormige, kaneelkleurige tekening. Onderlijf; wit, met iets aanslag. Bij de broek bruine waas. Mantel / rugdek; bruingrijs. Stuit; kaneelkleurig.
Vleugels en staart:	Bruingrijs met lichte zoom. Bovenstaartdekveren; kaneelbruin. Onderstaartdekveren; licht crème.
Snavel:	Zwart, aan de basis oranjebruin.
Poten:	Zwart, opvallend lang loopbeen.
Ogen:	Zwart.

Witgesternde blauwborst	
Wetenschappelijke naam:	<i>Luscinia svecica cyanecula</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	De witgesternde blauwborst is een ondersoort van de roodgesternde blauwborst. Verspreidingsgebied, Centraal- en Zuid-Europa. Broedt in rietvelden en andere dichte vegetatie. En zingt ook nachts.
Opmerking:	De pop is geheel fletser en minder sprekend van kleur en tekening. Lijkt veel op de pop van de roodgesternde blauwborst, heeft echter geen "rode" gloed in de staart.
Kleur en tekening:	Kop; schedel zwartbruin in het midden een lichtbruine kopstreep. Boven de snavel lichtbruin. Wenkbrauwstreep; crème. Wangen; bruin, aan de bovenzijde zwartbruin. Tussen oog en snavel zwart. De keel en borst zijn diepblauw, met op de borst / keel afscheiding een heldere witte strakke vlek. (deze is kleiner dan de kaneelbruine vlek bij de roodgesternde blauwborst.)
Lichaam:	Onder de blauwe borst een brede zwarte borstband aan de onderzijde een vage witte band. De halve maanvormige buiktekening is kastanjebruin. Onderlijf; beigegrijs, bij de broek meer bruin. Mantel / rugdek; grijsbruin. Stuit; bruin.
Vleugels en staart:	Slag- en staartpenen; zwart, met grijsbruine zoom. De dekveren zijn diep grijsbruin met een lichtere grijsbruine zoom.
Snavel:	Zwart, aan de basis gelig.
Poten:	Zwart, met een opvallend lang loopbeen.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Noorse nachtegaal

Wetenschappelijke naam:	<i>Luscinia luscinia</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	16,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Noordoost Europa en de Baltische staten. Biotoop; bladrijk struikgewas en lage begroeiing langs meeroevers.
Opmerking:	Lijkt veel op de nachtegaal. Rugdek meer grijs, staart niet zo diep roodbruin en vage borsttekening, is ook bruiner aan de kop ten opzichte van de nachtegaal. Jonge vogels zijn geheel gevlekt zoals jonge roodborstjes.
Kleur en tekening:	Kop; schedel, nek en wangen roodbruinachtig. Keel; crème, licht gevlekt, iets licht streepje aan de bovenzijde van het oog.
Lichaam:	Borst en onderlijf; lichtcrème, met grijze gemarmerde tekening. De flanken; zijn meer bruin. Rugdek, mantel en stuit; bruin, met iets grijze waas.
Vleugels en staart:	Vleugel- en staartpennen; roodbruin, aan de toppen iets donkerder bruin. Onderstaartdekveren; lichtcrème.
Snavel:	Donker hoornkleurig, aan de basis geel.
Poten:	Vleeskleurig. Nagels hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

Nachtegaal

Wetenschappelijke naam:	<i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>
Ondersoorten:	<i>L. m. Africana</i> , <i>L. m. hafizi</i> : Deze komt voor in Centraal Azië. Is lichter van kleur en heeft een vage lichte wenkbrauwstreep en een langere staart. <i>L. m. baebrmanni</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	16,5 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied, West- en Zuid-Europa. Biotoop; in bosjes met vochtige ondergroei in bossen en parken.
Opmerking:	Geen uiterlijk verschil tussen man en pop.
Kleur en tekening:	Kop; schedel en nek bruin, iets gespikkeld. Wangen; bruingrijs. Wenkbrauwstreep en oogring; wit, vaag waarneembaar. Keel; crèmewit, bij snavelbasis iets tekening.
Lichaam:	Borst en onderlijf; grijsbeige. Flanken; iets bruin bewaasd. Mantel en rugdek; warmbruin. Stuit; roodbruin.
Vleugels en staart:	Slagpennen; roodbruin, toppen bruin, iets gezoomd. Armpennen; dieper roodbruin. Staart diep roodbruin, toppen donkerbruin.
Snavel:	Ondersnavel hoornkleurig, geel aan de basis. Bovensnavel bruin
Poten:	Rood vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Roodkeel nachtegaal

Wetenschappelijke naam:	<i>Luscinia.calliope calliope</i>
Ondersoorten:	<i>L. c. camtschatkensis</i> en <i>L. c. beicki</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website .
Formaat:	15 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Het uiterste Noordoosten van Europa. Zeer zeldzame dwaalgast in West-Europa. Staartdracht vaak verticaal. Broedt in naaldwouden.
Opmerking:	De pop mist de rode kinvlek, soms iets roze. Wenkbrauw en snavelstreep beigewit. De teugel is grijs. De jongen zijn wit op de keel, zonder zwarte omranding en hebben een lichte oogring.
Kleur en tekening:	Kop; schedel, nek en wangen donkerbruin. Wenkbrauwstreep en snavelstreep; helder wit. Tussen oog en snavel zwart. Kinvlek; rood, omrand door smalle zwarte band. Toont witte baardstrepen.
Lichaam:	Borst; donkerbruin. De vrij brede flanken zijn donkerbruin met iets grijze waas. Onderbuik; lichtbeige bruin. Mantel / rugdek en stuit; egaal donkerbruin.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin. Armpennen; iets donkerder. Staart; bruin, met lichte schacht. Bovenstaartdekveren; donkerbruin, met iets grijs. Onderstaart; wit.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwartbruin, inclusief de nagels. Heeft vrij lang loopbeen
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Roodstaarten

Algemene Informatie bij de roodstaarten

Roodstaarten horen tot het genus *Phoenicurus*. Het zijn vogels die het formaat van een mus hebben. De vogels zijn levendig en hebben een opvallende roestrode staart die altijd trilt.

Zwarte roodstaart	
Wetenschappelijke naam:	<i>Phoenicurus ochruros ochruros</i>
Ondersoorten:	<p><i>P. o. atterrimus</i>: Komt voor op het Iberische schiereiland. Is volledig zwart met een grijze kruin.</p> <p><i>P. o. Gibraltariensis</i>: Komt voor in het grootste deel van Europa. Bovenzijde man grijs en geen rood op de onderbuik.</p> <p><i>P. o. ochruros</i>: Turkije en Kaukasus. Is roestbruin op de buik.</p> <p><i>P. o. semirufus</i>: Komt voor in het Midden-Oosten. Gehele buik en benedenborst en buik roestbruin. Dit is strak afgetekend van de zwarte bovenborst. Heeft geen witte vleugelvlek.</p>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	15 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West-, Midden- en Zuid-Europa. Broedt in holen en muurnissen. In Zuid Europa zeer algemeen in bergstreken. Het trillen van de staart is soorteigen.
Opmerking:	De pop, mist de lichte vleugelspiegels. Jonge vogels lijken op de pop. Man in winterkleed nagenoeg als de pop, is totaal wat dieper grijszwart
Kleur en tekening:	Man in rustkleed: Kop, donkergrijs in de winter. Gehele kop diepzwart, op schedel iets grijze waas. De pop heeft een bleke oogring.
Lichaam:	Borst, onderlijf, flanken, mantel / rugdek; egaal zwartgrijs. In de winter meer grijs met een bruine waas. Stuit; roestrood. Aarsbevedering; lichtbruin, met oranje. Pop: Rugdek en mantel; bruingrijs. Borst en buik; muisgrijs, onderbuik iets lichter.
Vleugels en staart:	Vleugels diep egaal grijszwart. Op de armpennen lichtgrijze spiegel. Staart zwartgrijs. In de winter zijn al deze onderdelen meer grijs, met een iets bruine waas. Middelste pennen oranjebruin. De pop mist de licht grijze spiegel. Vleugels, armpennen en staart bruingrijs.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart. Nagels donker hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Gekraagde roodstaart

Wetenschappelijke naam:	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
Ondersoorten:	<i>P. p. samamisticus</i> : Komt voor Oost-Turkije, Kaukasus en in het Midden-Oosten. De bovenzijde is donkerder. Een variabele witte vleugelvlek op de armpennen.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. Broedt vrij algemeen in open bossen, parken, struikgewas, taiga. Nestelt in holten en nestkasten. Het trillen van de staart is soorteigen.
Opmerking:	.
Kleur en tekening:	Man: Kop; voorhoofd witgrijs, zwak zichtbaar in de winter, overgaand in grijze schedel en nek. Deze is fijn zwart gespikkeld. Voorhoofdsband, wangen, keel en kin; egaal zwart, in de winter grijs getint. Borst en flanken; roestbruin tot helder kastanjebruin en lopen op het onderlichaam in een rossige grijze kleur uit. In de rusttijd (tentoonstellingsseizoen): Ligt over het totale verenpak een beige waas. Dit wordt veroorzaakt doordat de veertoppen beige van kleur zijn. De pop heeft een duidelijk witte oogring.
Lichaam:	Keel; zwart strak afgelijnd. Onderlijf en flanken; roodbruin, tussen de poten wat lichter. Mantel / rugdek; glanzend blauwachtig grijs, iets zwart gespikkeld. Stuit; oranjebruin. Pop: Rugdek en mantel; grijsbruin. Borst; beige, met een licht oranje waas. Keel; crème. Flanken; geelbruin.
Vleugels en staart:	Vleugels; zwartgrijs, met beige waas en grote witte spiegels. De onderste vleugeldekveren zijn vaal rood. Staart; middelste pennen egaal donkerbruin, de overige staartpennen zijn rood tot roodachtig kastanjebruin.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart, nagels donker hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Vliegenvangers

Algemene Informatie bij de vliegenvangers.

Vliegenvangers behoren tot de familie *Muscicapidae*. Er is verwantschap met de zangers en lijsters. Het zijn kleine vogels, die vrij rechtop op de takken zitten. Het menu bestaat uit insecten, die in de vlucht gevangen worden. Het nest treft men aan in allerlei holtes. Het legsel bestaat uit 4 tot zelfs 9 eieren.

Bonte vliegenvanger	
Wetenschappelijke naam:	<i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. Algemene broedvogel in gemengde en loofbossen, parken en tuinen. Wipt vaak met staart.
Opmerking:	Pop; is bruingrijs in plaats van zwart. Mist wit op voorhoofd, smalle oogring, wel witte vleugelband. Ook kleine dekveren gezoomd en staartspiegel. 1 ^e jaars vogels overwegend grijs met bruine waas. Witte onderdelen nog niet helder wit.
Kleur en tekening:	Kop; schedel, nek en wang zwart, boven de snavel een wit vlekje. Keel en hals; wit, dit loopt door onder de wang tot aan de nek.
Lichaam:	Gehele onderzijde, borst, buik en flanken; wit. Mantel / rugdek; zwart. Stuit; zwart.
Vleugels en staart:	Slagpennen en dekveren; zwartbruin. De toppen van de slagpennen een smalle lichte zoom. Armpennen; aan basis wit, hierdoor een brede witte vleugelband. Staart; zwart. Onderstaartdekveren; wit.
Snavel:	Zwart, smal en spits.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Kleine vliegenvanger	
Wetenschappelijke naam:	<i>Ficedula parva parva</i>
Ondersoorten:	<i>F. p. albicilla</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	11,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Midden-, Noordoost- en Zuidoost Europa. In weelderige, schaduwrijke, iets vochtige delen van loof- of gemengde bossen. Broedt in boomspleten. Gedrag als de fitis. Wipt met staart. Kenmerkend wit in staart. Heeft wat weg van de roodborst, maar enkel "rood" op borst en keel en niet op het voorhoofd.
Opmerking:	Pop en 1^e jaars vogels: Schedel meer bruin, onderlijf crème. Keelvlak kleiner en fletser roodbruin. Wel witte staarttekening. In het volièreklimaat is het onmogelijk om de man op kleur te houden. Het zwart wordt dan bruingrijs. Dit geldt ook voor overjarige wildvangexemplaren na de rui.
Kleur en tekening:	Vleugelpennen en dekveren; bruin. Staart; bruin, de vier buitenste pennen voor de helft wit vanaf de basis. Hierdoor ontstaat de kenmerkende staarttekening.
Lichaam:	Kop; schedel grauw grijsbruin. Wangen; grijs. Keel; roodbruin. Pop: Vuilwit, smalle lichte oogring.
Vleugels en staart:	Bovenborst; roodbruin, overgaand in grijs bewolkt onderlijf. Flanken; iets donkerder. Mantel / rugdek en stuit; bruin.
Snavel:	Donkerbruin tot zwart, met aan de basis van de ondersnavel roze bruin.
Poten:	Grijsbruin.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Withals vliegenvanger

Wetenschappelijke naam:	<i>Ficedula albicollis albicollis</i> .
Ondersoorten:	<i>F. a. semitorquata</i> : Balkan vliegenvanger. Exact hetzelfde van kleur en tekening, alleen de witte nekband is onderbroken in de nek en het rugdek.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Midden- en Zuidoost Europa. In loofbossen en tuinen. Lijkt erg veel op de bonte vliegenvanger. Het witte vlekje op voorhoofd is groter, heeft ook een korte witte spiegel in de slagpennen. Witte nekband loopt geheel door rond de nek. Een zeer nauw verwante soort is de Balkan bonte vliegenvanger.
Opmerking:	De pop van de withals vliegenvanger is nagenoeg gelijk aan de pop van de bonte vliegenvanger. Is iets grijzer van kleur en heeft net als de man korte witte spiegels in de slagpennen. Deze mist de bonte vliegenvanger pop. De Balkan vliegenvanger pop is gelijk aan de withals vliegenvanger pop.
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel en wangstreek zwart, op voorhoofd wit vlekje. Keel; wit, deze loopt boven langs de vleugels, onder de wangen, geheel door in de nek (witte nekband).
Lichaam:	Borst en onderlijf; wit, in de flanken vage grijze streepjes. Mantel/rugdek; zwart. Stuit; grijswit.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; zwart, uitgezonderd de grote dekveren en armpennen. Deze zijn wit. Hierdoor ontstaat een brede witte vleugelband. Halfweg de slagpennen bevindt zich een korte witte spiegel. Staart; zwart, onderzijde wit.
Snavel:	Zwart, smal en puntig.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Grauwe vliegenvanger

Wetenschappelijke naam:	<i>Muscicapa striata striata</i> .
Ondersoorten:	<i>M. s. balearica</i> , <i>M. s. Neumanni</i> en <i>M. s. tyrrhenica</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. In open bossen, bosranden, parken en tuinen.
Opmerking:	Man en pop gelijk, een jonge vogel is veel zwaarder gestreept op borst en rugdek.
Kleur en tekening:	Kop; schedel grauwgrijs, met zwarte lichte streepjes, nek egaler grauwgrijs. Wangen; grijs. Keel; grijswit, met vage strepen.
Lichaam:	Borst; grijswit, met donkere bestreping, vager wordend richting onderlijf. Flanken; beigegrijs. Mantel / rugdek en stuit; grauw bruingrijs.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; bruingrijs met lichte zoom, toppen slagpennen egaal. Staart; bruingrijs, met lichte zoom / spiegel.
Snavel:	Zwart, smal en puntig.
Poten:	Donker grijszwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Klapeksters en klauwieren

Algemene Informatie klapeksters en klauwieren

Klapeksters en Klauwieren behoren tot de familie *Laniidae*. Het zijn vogels die het formaat van een merel en groter hebben. Deze vogels hebben een relatief grote kop en hoekige snavel. De staart is in verhouding tot het lichaam lang. Het voedsel bestaat uit insecten, kleine vogels en knaagdieren, die dan, kenmerkend voor de familie, op een tak of doorn geprikt worden.

Klapekster	
Wetenschappelijke naam:	<i>Lanius excubitor excubitor</i>
Ondersoorten:	<i>L. e. homeyeri</i> : Komt voor in Oekraïne. Heeft bredere vleugelstreep en wit voorhoofd <i>L. e. meridionalis</i> : Komt voor op het Iberische schiereiland en in Zuid Frankrijk. Heeft een roze grijze borst, buik en flanken.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	24 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. Broedt in Zuid Europa in semi open terrein, moerassen en open plekken in naald- of berkenbossen.
Opmerking:	Jonge vogels meer beigegrijs, oogstreep bruin en enkel achter het oog. Vleugelpennen lichter en meer omzoming.
Kleur en tekening:	Kop; schedel en nek helder grijs. Keel; wit. Oogstreep; zwart, smal vanaf bovensnavel, door het oog lopend, breder wordend in de wangen.
Lichaam:	Borst en onderlijf; wit, flanken lichtgrijs. Mantel / rugdek en stuit; helder grijs. Op de scheiding mantel / vleugels een witte band.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; zwart, met witte spiegel. Witte band in toppen van de armpennen. Staart; zwart, met witte spiegel aan onderzijde.
Snavel:	Donkergrijs, aan basis lichter. Forse snavel, bovensnavel gebogen en een haakje.
Poten:	Grijs, nagels zwart
Ogen:	Zwart

Kleine klapekster	
Wetenschappelijke naam:	<i>Lanius minor minor</i> .
Ondersoorten:	<i>L. m. teranicus</i> : Meer bruingrijze waas.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	20 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Midden-, Zuid- en Oost-Europa in open terrein met verspreide bomen en struiken. Te onderscheiden van de klapekster door formaat, zwart voorhoofd en minimale witte vleugeltekening.
Opmerking:	Jongen missen zwart aan de kop en zijn meer bruin bewaasd.
Kleur en tekening:	Voorhoofd en wangen; zwart. Bovenschedel, nek; grijs. Keel en hals; wit.
Lichaam:	Borst en onderlijf; witgrijs. Flanken; beigegrijs. Mantel / rugdek en stuit; grijs, met iets bruine waas.
Vleugels en staart:	Vleugels; zwart, klein smal wit spiegelkje en minimale lichte toppen op de armpennen. Staart; zwart, onderzijde witgrijs, bovenstaartdekveren grijs.
Snavel:	Zwart, vrij fors, iets gebogen met haakje.
Poten:	Donker grijs.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Grauwe klauwier

Wetenschappelijke naam:	<i>Lanius c. Luria.</i>
Ondersoorten:	<i>L. c. kobyhini.</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	18 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa uitgezonderd het hoge Noorden. Leeft in open struikgewas/ plekken in het bos.
Opmerking:	De pop en jonge vogels zijn bruiner en tonen omzoming op borst en flanken. Sommige poppen zijn contrastrijker getekend en lijken veel op de man, maar hebben altijd omzoming op de borst. De staart is bruin. Jonge vogels hebben een geelbruine oogring. Poppen een witte oogring. Jonge vogels zijn ook gezoomd op het rugdek.
Kleur en tekening:	Kop; schedel helder grijs, in nek iets donkerder. Zwarte brede oogstreep. Keel; wit.
Lichaam:	Borst en onderlijf; wit, met iets licht roodbruine waas, vooral in de flanken. Mantel/rugdek, bovenrug; grijs als de kopkleur en strak afgelijnd met kastanjebruin. Stuit; grijs.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, met smalle lichte zoom. Armpennen; licht kastanjebruine zoom. Dekveren; als rugdek/mantel. Staart; zwart, met witte spiegel, bovenstaartdekveren grijs.
Snavel:	Zwart, iets gebogen met haakje.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Roodkop klauwier

Wetenschappelijke naam:	<i>Lanius senator senator</i>
Ondersoorten:	<i>L. s. badius:</i> <i>L. s. nicoticus:</i> Komt voor in Turkije en verder oostwaarts. Extra grote witte vlek op de basis van de handpennen. Heeft veel zwart op het voorhoofd en een witte staartbasis.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	19 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Midden- en Zuid Europa. In open droog terrein met bomen en struiken. Opvallende diep roodbruine kruin. Ondersoort (<i>L. s. badius</i>), afkomstig uit Mallorca, heeft geen witte vleugelstreep.
Opmerking:	Pop is vager en fletser van kleur en tekening. De zwarte veervelden zijn grijs.
Kleur en tekening:	Kop; een brede zwarte voorhoofdsband, door het oog tot in de nek. Achter het oog een wit vlekje. Schedel/achternek; diep roodbruin. Keel en hals; wit.
Lichaam:	Borst en onderlijf; wit, iets geelbruine waas in de flanken. Mantel/rugdek; zwart. Stuit; wit.
Vleugels en staart:	Vleugels; zwart, met vage lichte smalle zoom. Armpennen, smalle witte zoom. Vleugelschild en spiegels wit. Staart; zwart met smalle witte toppen, onderstaart wit.
Snavel:	Donkergrijs, iets gebogen met haakje.
Poten:	Donkergrijs.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Zangers

Algemene Informatie bij de zangers.

Zangers zijn relatief kleine vogels, met een rusteloos gedrag. Het verenkleed is in het algemeen vrij uniform. Verwarring is dan ook niet uit te sluiten. Alle soorten broeden in beboste gebieden, struikgewas of hoge riet- en kruidenvegetatie. Zangers zijn zeer bewegelijke vogels, maken vaak nerveuze rukkende bewegingen met vleugel of staart. Er is geen duidelijk uiterlijk verschil tussen man en pop.

Rietzanger	
Wetenschappelijke naam:	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	12,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa nabij rietvelden en moerasgebieden. Lijkt op de zwartkop- en waterrietzanger, maar de stuit is ongestreept. Ten opzichte van de Sprinkhaanzanger heeft de Rietzanger een duidelijke wenkbrauwstreep (witte) en is de staart rechter op het einde.
Opmerking:	Jonge Rietzangers hebben soms een vaag gestreepte borst en een onduidelijke kruinstreep, maar nooit zo opvallend als bij de blekere, gelere Waterrietzanger.
Kleur en tekening:	Kop; Bovenschedel grijsbruin, licht gestreept. Boven de crèmewitte wenkbrauwstreep donkerbruin. Wangstreek; lichtbruin. Keel; crèmewit. In de nek; grijsbruin, overgaand naar lichtbruin. Zwartbruine teugel
Lichaam:	Borst; beigebruin, in het onderlijf iets lichter. Flanken; lichtbruin, stuit egaal licht roodbruin. Mantel / rugdek; bruin, met een iets roodbruine waas en licht gestreept.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, de toppen donker bruin. Duimveertjes en armpennen; een lichte zoom op de buitenvlag. Staart; bruin, met lichte schacht.
Snavel:	Donkerbruin, aan de basis soms wat geler.
Poten:	Donker vleeskleurig, nagels donkerbruin.
Ogen:	Zwart.

Waterrietzanger	
Wetenschappelijke naam:	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website..
Formaat:	12,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zeldzame en plaatselijke broedvogel in Midden-, Oost- en Zuid-Europa. In vochtige weiden met hoge zeggesoorten. Is duidelijk meer geelbruin van kleur ten opzichte van de Rietzanger, heeft een lichtbeige kruinstreep en meer bestreping op het rugdek.
Opmerking:	De staart is duidelijk ronder dan bij de Rietzanger. De waterrietzanger valt duidelijk op door zijn zwaar gestreepte rug en geelbruine tint.
Kleur en tekening:	Kop; bovenschedel donkerbruin, in de nek geelbruin gestreept. Op de kruin een geelbruine streep. Wenkbrauwstreep; geelbruin, deze loopt om de wangen heen. Wangen; geelbruin aan de bovenzijde donkerbruin. Keel; geelbruin. Teugel; crèmebeige.
Lichaam:	Borst, onderlijf en flanken; licht geelbruin, met op de borst en flanken een vage bestreping. Rugdek / mantel; donkerbruin, met een grove geelbruine omzoming. Stuit; geelbruin, bruin gestreept.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin en licht gezoomd. Armpennen; donkerbruin, grof gezoomd. Staartpennen; bruin, in het midden donkerder met geelbruine zoom. Bovenstaartdekveren; geelbruin, rond de schacht donkerbruin.
Snavel:	Bovensnavel; bruin, ondersnavel meer geel met aan de basis een bruine punt.
Poten:	Vleeskleurig; bruin, nagels bruin.
Ogen:	Zwart, met bruine iris.

[Terug naar index](#)

Bosrietzanger

Wetenschappelijke naam:	<i>Acrocephalus palustris</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website..
Formaat:	13 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West-, Midden-, Oost- en Zuidoost Europa. Biotoop, begroeide, vochtige terreinen, oevers, vaak tussen brandnetels en moerasspirea. Lijkt veel op de kleine karekiet. De snavel is iets korter en de kleur is dieper grijsbruin.
Opmerking:	Jonge bosrietzangers lijken sprekend op de kleine karekiet, maar hebben bleekroze poten in plaats van bruinachtig. Ten opzichte van de Blyths rietzanger duidelijk lichter in de keel en borst. Wel heeft de Bosrietzanger meer bruin in de flankstreek ten opzichte van Blyths rietzanger. Deze is hier vrij helder crème van kleur.
Kleur en tekening:	Kop; schedel licht grijsbruin, wenkbrauwstreep lichtbeige bruin. Keel; lichtcrème. Lichte oogring.
Lichaam:	Borst en onderlijf; crème, met een gele tint, vooral ter hoogte van vleugelbocht en pootinplant. Mantel / rugdek; grijsbruin met vage groene tint. Stuit; bruin, met grijze waas.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; donkerbruin, vooral de toppen diep zwartbruin. Vleugelpennen tonen een smalle lichte zoom op de buitenvlag. Staart; grijsbruin, toppen zwartbruin.
Snavel:	Grijsbruin, aan de basis en ondersnavel iets lichter.
Poten:	Geelroze, nagels bruin.
Ogen:	Zwart.

Kleine karekiet

Wetenschappelijke naam:	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> .
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	12,5 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa uitgezonderd het Noorden. Biotoop rietvelden, struiken en dichte kruidenvelden. Te onderscheiden van de Rietzanger door egaal gekleurde kop en lange wenkbrauwstreep. Is ook warmer bruin dan de Bosrietzanger. Rugdek en de stuit zijn altijd roestbruin.
Opmerking:	Jonge Kleine karekieten; bovenzijde warmer bruin met roestgele stuit.
Kleur en tekening:	Kop; schedel bruin. Een vage crème wenkbrauwstreep. Wangen en nek; iets lichter bruin. Keel; crèmeachtig. Zwartbruine teugel.
Lichaam:	Borst en onderlijf; beigewit. In de flanken een bruine tint. Mantel / rugdek; egaal bruin, met iets grijze waas. Stuit; roodbruin.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, buitenvlag grijze zoom, bij de basis roestbruin. Staart; bruin, met grijze waas, aan de toppen lichtcrème zoom.
Snavel:	Hoornkleurig, bovensnavel donkere streep.
Poten:	Vleeskleurig, nagels donker hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Grote karekiet	
Wetenschappelijke naam:	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	19 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het Noorden en de Britse eilanden. Biotoop; rietvelden / kragen. Lijkt op de Kleine karekiet, formaat is 6,5 cm groter. Wenkbrauwstreep is duidelijker wel een vage keeltekening. Heeft ook een vrij grote snavel ten opzichte van aanverwante soorten.
Opmerking:	De Grote karekiet valt gelijk op door een groot formaat en een krachtige snavel. Bij jonge vogels zijn de handpennen donker met lichtere toppen
Kleur en tekening:	Kop; schedel en nek bruingrijs, boven de snavel meer bruin. Wangen; grijsbruin. Keel; lichtcrème, vaag gestreept. Wenkbrauwstreep; lichtcrème.
Lichaam:	Borst en onderlijf; beigebruin. In de flanken en broek dieper bruin. Mantel / rugdek; grijsbruin. Stuit; roestbruin.
Vleugels en staart:	Bruin, in de toppen zwartbruin. Onderstaart crème, meer roestbruin richting staart, toppen van de staartpennen crème.
Snavel:	Hoornkleurig, bovensnavel en punt grijs.
Poten:	Rozebruin of donker bruingrijs, nagels grijs.
Ogen:	Zwart.

Cites rietzanger	
Wetenschappelijke naam:	<i>Cettia cetti cetti</i>
Ondersoorten:	<i>C. c. albiventris</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuid- en West-Europa. Biotoop dichte lage vegetatie bij water- en moerasgebieden. Opvallend brede staart en afgerond. Trekt met staart opwaarts en zijwaarts. Snavel dun en puntig. Man en pop gelijk.
Opmerking:	De jongen lijken op de volwassen vogels.
Kleur en tekening:	Kop; schedel grijsbruin, iets getekend. Nek; meer bruin. Wangen; grijsachtig. Keel; beigebruin. Vage wenkbrauwstreep. Rond het oog lichte briltekening.
Lichaam:	Borst; grijs, aan de onderzijde meer bruin. Buik; grijswit. Aarsstreek; roodbruin. Mantel / rugdek; grijsbruin, in het midden op de vleugels meer roodbruin. Stuit; roodbruin.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, met vage zoom. Staart; bruin, met lichte schacht aan de onderzijde. Boven- en onderstaartdekveren; roodbruin.
Snavel:	Hoornkleurig, bovensnavel donkere streep.
Poten:	Vleeskleurig, nagels hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Sprinkhaan rietzanger

Wetenschappelijke naam:	<i>Locustella naeuia naeuia</i>
Ondersoorten:	<i>L. n. obscurior</i> en <i>L. n. straminea</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het Noorden. Biotoop; in vochtig open terrein met dichte ondergrond vegetatie. Vooral weilanden met pollen en struiken, maar ook op drogere gronden, in coniferen kwekerijen en korenvelden.
Opmerking:	De kleuren kunnen iets variabel zijn, soms in de borst iets gevlekt. Typisch kenmerk; de zwarte rugbestreping.
Kleur en tekening:	Kop; schedel grijsbruin, licht gevlekt. Vanaf de snavel, boven de lichtcrème wenkbrauwstreep, meer roodbruin. Onder het oog ook lichtcrème, niet geheel doorlopend. Wangen; bruin, met dunne lichte streepjes. Keel; lichtcrème. Onderstaart; heeft een V- vormige tekening
Lichaam:	Borst; bruin, iets lichter bij de keelstreek. Onderlijf; lichtcrème, overlopend naar bruine flanken. Mantel / rugdek; grijsbruin, met groenige waas en met zwartbruine bestreping. Stuit; bruin, iets gevlekt.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, met zwartbruine toppen op de binnenpennen. Armpennen; zwartbruin, met bruine omzoming. De schacht van de armpennen kan zowel bruin als zwart zijn. Staart; bruin, met donkere schacht. De twee middelste pennen zijn iets verlengd en hebben een roodbruine schacht.
Snavel:	Bruin, aan basis meer geelachtig.
Poten:	Roodachtig bruin, nagels hoornkleurig
Ogen:	Zwart met bruine iris.

Kleine sprinkhaan rietzanger

Wetenschappelijke naam:	<i>Locustella Lanceolata</i> .
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	Verspreidingsgebied: Uiterste Oosten van Europa. Biotoop; dichte moerasvegetatie en aan oevers van meren.
Algemeen:	De kleuren kunnen iets variëren. Jonge vogels hebben een kortere staart, een vage streep-tekening op de borst en flanken en een duidelijke omzoming aan de vleugeldekveren.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop; schedel grauwbrown, met in het midden zwarte bestreping. Nek; egaal grauwbrown. Wangen; bruin, met zwarte waas. Wenkbrauwstreep vaag crèmekleurig. Keel; lichtcrème, met donkere bestreping. Onderstaarttekening; is een smalle onderbroken streep-tekening.
Lichaam:	Borst; lichtcrème, met zware zwartbruine bestreping, in de buik egaler. Flanken; wat fijner bestreept, met bruine waas. Mantel / rugdek; grauwbrown met zware zwartbruine lengtestrepen. De stuit; heeft dezelfde kleur als het rugdek.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; zwart met bruine omzoming. De staart is iets gepunt en egaal zwart. De bovenstaartdekveren zijn zwart met bruine omzoming.
Snavel:	Diepgrijs, de punt is iets lichter.
Poten:	roodachtig, nagels wat lichter.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Snor

Wetenschappelijke naam:	<i>Locustella luscinioides</i>
Ondersoorten:	<i>L. l. fusca</i> : Oost-Kaspisch zeegebied en Centraal Azië. Rugdek groenig grijsbruin, lichte toppen aan de onderstaartveren
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website..
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het Noorden. Biotoop; rietvelden en moerassen. Heeft een vrij lange brede afgeronde staart.
Opmerking:	Jongen lijken op de volwassen vogels.
Kleur en tekening:	Kop; schedel kastanjebruin, met donkere streepjes. Nek en wangen; bruin. Keel; lichtbruin. Vage wenkbrauwstreep. Smalle lichte oogring.
Lichaam:	Borst; lichtbruin, onderlijf iets lichter. Mantel / rugdek; egaal bruin. Stuit; egaal bruin.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, buitenste pen een lichte spiegel. Staart; donkerbruin, onder- en bovenstaartdekveren kastanjebruin.
Snavel:	Donker hoornkleurig, bovensnavel bruin.
Poten:	Roodachtig bruin
Ogen:	Zwart

Krekelzanger

Wetenschappelijke naam:	<i>Locustella fluviatilis</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13,5 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Oost- en Zuidoost Europa. Biotoop; vochtige grond, met dichte ondergroei van struiken en elzen.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop; schedel egaal bruin, in de nek iets grijze waas. Wangen; bruin. Vage wenkbrauwstreep. Iets lichtere oogring. Keel; lichtbruin, met vage bestreping.
Lichaam:	Borst; lichtbruin, bruine waas vooral bij de vleugels. Onderlijf; lichter en egaler. Aarsstreek; iets meer bruin. Rugdek / mantel en stuit; egaal bruin
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; egaal bruin, buitenste slagpennen lichter. Staart; egaal bruin, onderstaart toont crèmewitte tekening.
Snavel:	Bruin, bovensnavel iets donkerder.
Poten:	Roodachtig bruin, nagels bruin.
Ogen:	Zwart, met donker bruine iris.

[Terug naar index](#)

Waaierstaart rietzanger (Graszanger)

Wetenschappelijke naam:	<i>Cisticola juncides juncides</i> .
Ondersoorten:	<i>C. j. neurtica</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	10 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West- en Zuid-Europa in open terrein en vlakten met lang gras, korenvelden enz. Herkenbaar aan zijn kleine formaat, gestreepte bovendelen en zeer korte, afgeronde staart met zwarte- en witte uiteinden.
Opmerking:	In de broedtijd zijn man en pop te onderscheiden. De man heeft lichte wangen en een zwarte snavel. De pop heeft een lichtbruine snavel en een egale donkere kop
Kleur en tekening:	Kop; op de bovenschedel in het midden een gele kruinstreep. Wangen; lichtbruin, soms gespikkeld. Wenkbrauwstreep; duidelijk aanwezig en crème van kleur. Keel; wit tot crème. Teugel; lichtcrème.
Lichaam:	Borst en onderlijf; lichtcrème, aan buitenzijde en flanken lichtroodbruin. De flanken kunnen in de zomer ook gestreept zijn. Mantel en rugdek; zandkleurig met zware donkerbruine strepen. Stuit; bruin, met zwarte streep-tekening.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; donkerbruin, met lichte buitenvlag. Armpennen; zijn wat egalere. Staartpennen; bruin, middelste wat donkerder. Bovenstaartdekveren; roodbruin. Uiteinde staart zwart wit.
Snavel:	Hoornkleurig, bovensnavel bruin.
Poten:	Vleeskleurig, nagels hoornkleurig soms iets donkerder.
Ogen:	Zwart, met bruine iris.

Fitis

Wetenschappelijke naam:	<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>
Ondersoorten:	<i>P. t. acredula</i> : Is grijsbruin op rugdek en mantel. Stuit helder groen. Keel en borst geelwit <i>P. t. evermanni</i> en <i>P. t. yakutensis</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website..
Formaat:	11,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, in loof- en gemengde bossen, van laagland tot hoogst alpine berkenbossen. Het gehele geslacht <i>pylloscopus</i> is te herkennen aan het bezit van iets gele- en/of wat groene veervelden. Ten opzichte van andere kleine zangvogels zeer actief en rusteloos van aard
Opmerking:	De populatie uit Noord Europa is meer grijsbruin van kleur dan de zuidelijke populatie, welke meer olijfgroen is. Jonge fitissen zijn geler aan de onderzijde dan de tijftjaf maar minder bruin en duidelijker van wenkbrauwtekening.
Kleur en tekening:	Kop; schedel op voorhoofd iets olijfgroen, overgaand in grauwbrown. Iets gespikkeld tot in de nek. Wenkbrauwstreep; zachtgeel, voor het oog iets dieper van kleur. Onder de wenkbrauwstreep een bruine teugel en oogstreep. Wangen; crèmeachtig met gele waas. Keel; crèmeachtig.
Lichaam:	Borst; zachtcrème, met gele waas. Onderlijf; helderder. Mantel /rugdek; grijsachtig bruingroen, met groene waas. Stuit; groen.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, met gelige buitenvlag. Bij de armpennen is de buitenvlag lichter, nagenoeg wit van kleur. Staart; bruin, iets olijf tint. De schacht is licht van kleur.
Snavel:	Bovensnavel bruin, ondersnavel okergeel.
Poten:	Bruin met gele ondergrond, nagels bruin.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Grauwe fitis

Wetenschappelijke naam:	<i>Phylloscopus trochiloides</i> .
Ondersoorten:	<i>P. t. nitidus</i> , <i>P. t. pluimbeitarsus</i> en <i>P. t. viridanus</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	11 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Oost-Europa. Biotoop; gemengde bossen met weelderige ondergroei, vaak in sparrenbossen met enige loofbomen. Tijdens de trek veel in kreupelhout
Opmerking:	De Grauwe Fitis lijkt op de Fitis en Tjiftjaf, maar heeft een duidelijk langere wenkbrauwstreep en een smalle witte vleugelband. Ook de poten zijn dieper van kleur
Kleur en tekening:	Kop; schedel olijfgroen, met grijze waas. Wangen; lichtbeige. Keel; licht witgrijs. Wenkbrauwstreep; witachtig, deze loopt ver door achter het oog olijfgroen grijs.
Lichaam:	Borst; vuilwit, met vage gele tint. Onderlijf; helder lichtgrijs. Mantel / rugdek; grijsgroen, met groengele tint. Stuit; meer olijfkleurig.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, buitenvlag olijfgroen gezoomd. Op buitenvlag armpennen witachtig gezoomd, toppen bruin. De toppen van de kleine vleugeldekveren zijn wit en vormen samen en korte vleugelbandtekening. Staart; bruin, buitenspiegels olijf, middelste pennen lichtgrijs gezoomd.
Snavel:	Donkergrijs, onder snavel okergeel met donkere streep.
Poten:	Grijs, nagels donkergrijs.
Ogen:	Zwart.

Tjiftjaf

Wetenschappelijke naam:	<i>Phylloscopus collybita</i>
Ondersoorten:	<i>P. c. abietinus</i> : Is gemiddeld een tint lichter en in het uiterste Noordoosten nemen de groene en gele tinten in het verenkleed geleidelijk af <i>P. c. canariensis</i> , <i>P. c. exsul</i> , <i>P. c. fulvescens</i> en <i>P. c. tristis</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	11 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, zomergast in parken en open bossen (met naaldbomen). Lijkt veel op de fitis, meer grijsbruin, wenkbrauwstreep vager, poten donkerder. Onder soort <i>Phylloscopus tristis</i> uit Oost Siberië heeft gelige wenkbrauwstreep en borst, geen geel en groen aan de kop en mantel. De poten hiervan zijn zwart.
Opmerking:	1 ^e jaars vogels zijn matter van kleur minder geel, wenkbrauwstreep meer bruin. Toont een "bril" rond het oog.
Kleur en tekening:	Kop; schedel bruin, met geelgroene waas. Wangen; beige, met gele tint. Keel; lichtcrème. Wenkbrauwstreep; zachtgeel, achter het oog lichter. Witachtige oogring. Voor en achter het oog door midden gedeeld.
Lichaam:	Borst en onderlijf; lichtcrème, met variabele gele en beige tint op keel en borst. In de flanken beigebruin. Mantel / rugdek; bruingroen, met grijze waas. Stuit; groen, met geelgroene waas.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, met smalle gele zoom. Staart; bruin, met smalle gele zoom. De middelste staartpennen tonen een licht grijze zoom.
Snavel:	Geelachtig bruin. Bovensnavel bruiner.
Poten:	Donkerbruin.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Fluiter

Wetenschappelijke naam:	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	12 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. Biotoop; bossen met hoge (beuken) bomen. Toont een opvallende helder gele keel.
Opmerking:	Winterkleed wat fletser van kleur en wat minder geel op borst.
Kleur en tekening:	Kop; schedel bruin, met gele tint. Wangen; wat lichter. Keel; helder geel. Wenkbrauwstreep; breed, citroengeel. Oogstreep; grijsgroen.
Lichaam:	Borst, keel en oorstreek; lichtgeel. Onderlijf; wit. Mantel / rugdek; diep donker mosgroen, met grijze waas. Stuit; olijfkleurig.
Vleugels en staart:	Slagpennen; donkerbruin, met smalle gele buitenvlag. Armpennen en dekveren; meer zwartbruin, rond de schacht met geelgroene zoom. Staart; donkerbruin, met gele spiegels aan de buitenzijde.
Snavel:	Bruin, met geel aan de basis.
Poten:	Geelbruin, nagels bruin.
Ogen:	Zwart.

Zwartkop

Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>
Ondersoorten:	<i>S. a. damahdei</i> , <i>S. a. heiniken</i> : Met donker bruinzwarte kop. <i>S. a. pauluccii</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. Kan tegen strenge kou. Leeft in bossen, parken en tuinen. Eet vaak bessen.
Opmerking:	Pop: Geheel als de man, alleen is de schedel roodbruin in plaats van zwart. Jonge zwartkoppen lijken op de pop, zijn wat bleker en matter van kleur.
Kleur en tekening:	Man: kop; schedel zwart, beginnend vanaf het midden van de snavel, doorlopend door het oog tot in de nek, strak afgelijnd. Wangen, keel en nek; zilvergrijs, in de nek donkerder.
Lichaam:	Borst en onderlijf; licht olijfgrijs. Mantel en rugdek; vuilgrijs. Stuit; is beigebruin.
Vleugels en staart:	Vleugels en staart; bruingrijs, slagpennen iets dieper bruin.
Snavel:	Loodgrijs met donkere punt, bovensnavel is dieper van kleur dan de ondersnavel.
Poten:	Zwartgrijs, nagels zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Kleine zwartkop (*Sylvia melanocephala*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

Middellandse zeegebied, noordwest Afrika, Zuidwest Azië en Canarische eilanden
Behoort tot familie van de Sylvia.

Fysieke standaard

Formaat:

De kleine zwartkop is 13 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

Het is een robuuste vogel met korte vleugels.

Houding:

De kleine zwartkop is een vrij bewegelijke vogel, die vrij hoog op de poten staat. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De staart wordt vaak gespreid.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBvV website

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de kleine zwartkop zijn:

- **Kop:** De man heeft een zwart kop en de pop een grijze kop.
- **Lichaam:** Man heeft een grijze rug en licht grijze buik en een witte keel en een rode oog ring. De pop een grijs/bruine rug en een grijs/bruine buik en een rode oog ring.
- **Rugdek / mantel:** Man grijze rugdek en mantel pop een meer grijs/bruine rugdek en mantel
- **Vleugeldekkeer:** Man grijs pop grijs/bruin.
- **Handpennen:** Man grijs pop grijs/bruin.
- **Bovenstaartdekveren:** Man grijs pop grijs/bruin.
- **Staartpennen:** Man en pop buitenste staart pennen grijs de binnenste grijs en wit uitlopend.
- **Onderstaartdekveren:** Man grijs en pop grijs/bruin

[Terug naar index](#)

Kleurstandaard Kleine zwartkop:

Kleurslag	Wildkleur man	Wildkleur pop
Kleur:		
Wangen	Zwart	Bruin
Keel	Wit	Wit
Kop	Zwart	Grijs
Borst	Grijs	Grijs/bruin
Flanken	Grijs	Grijs/bruin
Buik	Wit/grijs	Grijs/bruin
Aarsbevedering	Grijs/wit	Grijs/bruin
Handpennen	Grijs	Grijs/bruin
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Grijs	Grijs/bruin
Staartpennen	Grijs, de binnenste grijs en wit uitlopend	Grijs/bruin de binnenste bruin/grijs en wit uitlopend.
Bovenstaartdekveren	Grijs	Grijs/bruin
Onderstaartdekveren	Grijs/wit	Grijs/bruin
Stuit	Grijs	Grijs/bruin
Rugdek, van koptekening tot stuit	Grijs	Grijs/bruin
Poten	Licht bruin	Licht bruin
Nagels	Donker grijs	Donker grijs
Snavel	Donkergrijs en onder snavel lichter	Donkergrijs en onder snavel lichter
Ogen	Rood en donkere pupil	Rood en donkere pupil
Tekeningkleur:		
Lichaamstekening	Zwarte kop en onder zijde wit/grijs bovenzijde grijs	Zwarte kop en onder zijde grijs/bruin bovenzijde grijs/bruin
Stuit	Grijs	Grijs/bruin
Onderstaart dekveren	Wit	Grijs/wit

Keurtechnische aanwijzingen:

De vleugels mogen niet gekruist zijn.
 De kleine zwartkop is van nature een bewegelijke vogel.
 Hier mag hij niet op worden bestraft.

[Terug naar index](#)

Tuinfluitier	
Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia borin borin</i>
Ondersoorten:	<i>S. b. woodwardi</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd IJsland. Leeft in open bosland met veel ondergroei, bosjes en parken. In Nederland zeer algemeen. Toch zullen de meeste mensen hem nog nooit gezien hebben. Dit komt door zijn eenvoudige verenkleed. De zang is wel zeer opvallend en lang aanhoudend.
Opmerking:	Jonge tuinfluiters zijn minder helder van kleur. Pennen zijn meer bruin met lichte toppen en de lichaamskleur toont een wat geelgroene waas.
Kleur en tekening:	Man en pop: kop; schedel en achterwangen bruingrijs, voorhoofd lichter. Boven het oog een lichtcrème streep. Keel en wangen; lichtcrème. Nek; bruingrijs. Kenmerkende zuiver grijze tint op de zijhals
Lichaam:	Borst; crèmewit. Tussen de poten helder wit. Flanken; beigebruin. Mantel / rugdek en stuit; bruingrijs. Broek- en aarsbevedering wit
Vleugels en staart:	Zwartbruin, met bruingrijze buitenvlag
Snavel:	Vrij dikke stompe blauwachtig grijsbruine snavel.
Poten:	Licht grijs, nagels zwart.
Ogen:	Zwart, iris donkerbruin

Spotvogel	
Wetenschappelijke naam:	<i>Hippolais icterina.</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het Zuidwesten, Britse eilanden en het hoge Noorden. Biotoop; in loofbossen met ondergroei. Parken en grote tuinen.
Opmerking:	De Orpheus spotvogel is vrijwel identiek, is alleen iets matter, minder brede zoom op de armpennen en heeft lichte buitenvlag op de staart. De vleugels zijn iets korter en de poten zijn bruin.
Kleur en tekening:	Kop; schedel bruin. Wangen; iets lichter. Keel; lichtgeel. Lichte teugel en een korte witte wenkbrauwstreep. Lichte oogring.
Lichaam:	Borst en onderlijf; geel, met beige bruine tint. In de flanken vaag gestreept. Mantel en rugdek; bruin grijsgroen. Stuit; bruin.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin. Slagpennen; zeer smalle lichte buitenvlag. Armpennen; wat donkerder en een brede lichte buitenvlag. Staart; egaal bruin, de toppen iets donkerder.
Snavel:	Bovensnavel; donker hoornkleurig. De ondersnavel aan basis roze oranje.
Poten:	Loodgrijs, nagels zwart .
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Orpheus spotvogel

Wetenschappelijke naam:	<i>Hippolais polyglotta</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Vervangt de spotvogel in Zuidwest Europa. Broedt in wilgen, zilverpopulieren, acacia's en eiken. Maar ook in lage vegetatie frambozen- en braamstruiken.
Opmerking:	Lijkt veel op de spotvogel, iets plomper van bouw. Gezichtsuitdrukking iets vriendelijker. Vleugels duidelijk korter en minder spits.
Kleur en tekening:	Kop; schedel bruin. Wangen; iets lichter. Keel; lichtgeel. Boven en onder het oog een klein lichtgeel streepje. Lichte oogring.
Lichaam:	Borst en onderlijf; geel, met beige bruine waas. In de flanken vaag gestreept. Mantel en rugdek; bruin, met iets groenige waas. Stuit; bruin.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin. Slagpennen; zeer smalle lichte buitenvlag. Armpennen; wat donkerder en een brede lichte buitenvlag. Staart; egaal bruin, de toppen iets donkerder.
Snavel:	Donker hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig bruin, nagels bruin.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Blauwstaartje (*Tarsiger cyanurus*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

Finland, noordelijke Azië oostwaarts tot Kamtsjatka, Japan en centraal Azië. Lijkt op gekraagde roodstaart in bouw en formaat. Mannetje diep blauw op kop, bovendelen en staart, met blekere lichtblauwe stuit. Keel wit, borst en onderdelen grijs met donkere onduidelijke strepen, flanken oranje. De pop is bruin waar mannetje blauw is, heeft opvallende witte oogring, blekere blauwe stuit en donkerblauwe staart.

Fysieke standaard

Formaat:

De blauwstaart is 14 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

Het is een robuuste vogels bewegelijk en met een op en neergaande staart.

Houding:

De blauwstaart is een vrij bewegelijke vogel bewegelijk en met een op en neer gaande staart en vleugels. De blauwborst staat vrij hoog op de poten. De rug van de blauwborst is enigszins rond en de uiterlijke vorm is vergelijkbaar met die van de roodborst. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBvV website

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de blauwstaart zijn:

- Kop: De man heeft een diepblauwe kop en de pop een bruine kop.
- Lichaam: Man heeft een blauwe rug en leen witte buik en borst. De pop een grijs/bruine rug en een grijs/bruine buik en een witte oog ring. De flanken van man en pop zijn oranje.
- Rugdek / mantel: Man blauw en mantel pop een meer grijs/bruine rugdek en mantel
- Vleugeldekkeveer: Man blauw pop grijs/bruin.
- Handpennen: Man blauw pop grijs/bruin.
- Bovenstaartdekveren: Man blauw pop bruin/blauw.
- Staartpennen: Man en pop blauw.
- Onderstaartdekveren: Man wit en pop grijs/wit.

[Terug naar index](#)

Omschrijving Blauwstaartje:

Kleurslag	Wildkleur man	Wildkleur pop
Kleur:		
Wangen	Blauw	Bruin
Keel	Wit	Bruin/wit
Kop	Blauw	Bruin
Borst	Wit	Bruin/wit
Flanken	Oranje	Oranje
Buik	Wit	Bruin/wit
Aarsbevedering	Wit	Bruin/wit
Handpennen	Blauw	Bruin
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Blauw	Bruin
Staartpennen	Blauw.	Bruin/blauw
Bovenstaartdekveren	Blauw	Blauw/bruin
Onderstaartdekveren	Wit	Wit/bruin
Stuit	Blauw	Blauw
Rugdek, van koptekening tot stuit	Blauw	Bruin
Poten	Zwart	Zwart
Nagels	Zwart	Zwart
Snavel	Zwart	Zwart
Ogen	Zwart	Zwart witte oogring
Tekeningkleur:		
Lichaamstekening	Blauwe kop en onder zijde wit flanken oranje	Bruine kop en onder zijde bruin/wit bovenzijde bruin
Stuit	Blauw	Blauw
Onderstaart dekveren	Wit	Bruin/wit

Keurtechnische aanwijzingen:

De vleugels mogen niet gekruist zijn.

De blauwstaart is van nature een bewegelijke vogel meteen op en neergaande staart.

Hier mag hij niet op worden bestraft.

[Terug naar index](#)

Heg- en grasmussen

Algemene Informatie heg- en grasmussen

De heggemussen horen tot de familie *Prunellidae*, Het zijn kleine bruingrijze vogels, die hun voedsel zoeken op de grond.

Het zijn fijne vogels met een gestreepte staart. Er is nauwelijks uiterlijk verschil tussen de geslachten.

De grasmussen behoren eigenlijk tot de zangers, de familie *Sylviidae*. Beweeglijk uniform gekleurde vogels met dunne puntige snavels.

Heggemus	
Wetenschappelijke naam:	<i>Prunella modularis</i>
Ondersoorten:	<i>P. m. hebridium</i> : Komt voor in Ierland, de Hybriden en het Westelijke gedeelte van Schotland. Donkerder van kleur, vooral op de mantel en borst <i>P. m. obscura</i> : Komt voor in de Krim, de Kaukasus, Transkaukasie de Noordoostelijke gebieden van klein Azië tot de Noordwestelijke streken van Iran. <i>P. m. occidentalis</i> : Komt voor in Engeland en Schotland. <i>P. m. mabbotti</i> : Komt voor in de Zuidwestelijke oorden van Frankrijk, Spanje en Portugal. En verder zijn er ook nog de <i>P. m. fuscata</i> , <i>P. m. euxina</i> en <i>P. m. meinertzbageni</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	15 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. Biotoop vrij dichte parken en tuinen, struikgebieden, ongedunde sparrenaanplant, berkenbossen. Zoekt voedsel op de grond.
Opmerking:	In winterkleed lichte snavelstreep. Ook is het leigrijs minder sprekend door bruine waas. Verder tonen ze dan een smal wit vleugelbandje. Jonge vogels hebben een lichte ondersnavel en een wenkbrauwstreep. Minder leigrijs, veel meer omzoming op gehele bovenzijde. Ook veel crème omzoming onder andere op de punten van de armpennen. Van de heggemus zijn de bruin-, wit- en een phaeo mutant bekend.
Kleur en tekening:	Kop: schedel leigrijs, met regelmatige bruine en zwarte hamertekening. Nek; egaal leigrijs. Keel; leigrijs, de keelstreek is licht wit gespikkeld. Wangen; bruin, met fijne donkere strepen, aan voorzijde witte stipjes. Grijs oogstreep.
Lichaam:	Borst; leigrijs, met iets bruine waas. Onderlijf; grijs, met zwarte lengtestrepen. Flanken; bruin, met donkere strepen. Mantel en rugdek; bruin, met zware zwarte strepen, welke vager worden richting vleugels. Stuit; egaal bruingrijs,
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; bruin, met geelbruine buitenvlag. Binnenste armpennen nagenoeg zwart met lichtcrème zoom. Bovenstaartdekveren; bruingrijs. Onderstaartdekveren; beigebruin, met donkere randen aan de buitenkant van de veer, die een V- vormige onderstaarttekening te zien geeft.
Snavel:	Zwart, in de winter lichter.
Poten:	Geelbruin, nagels zwart.
Ogen:	Bruin.

[Terug naar index](#)

Alpen heggemus	
Wetenschappelijke naam:	<i>Prunella colaris colaris</i>
Ondersoorten:	<i>P. c. montana</i> : Komt voor in Turkije. Lichter bruin en minder zwaar bestreept op de mantel. <i>P. c. subalpina</i> : Keel wit met donkere bewolking.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	18 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Midden- en Zuid-Europa. Biotoop hooggebergte, boven de boomgrens. Direct te herkennen aan zijn kastanjebruine buik en zware bestreping. Is de grootste heggemussoort.
Opmerking:	In zomerkleed zijn de witte vleugelbanden veel vager of zelfs verdwenen. Kop egaler grijs evenals de buik, welke egaler kastanjebruin is.
Kleur en tekening:	Kop; schedel, nek, hals en keel grijs, met donkere bewolking. Voorhoofd en wangen donker grijs
Lichaam:	Borst; grijs, met donkere bewolking. Buik en flanken; kastanjebruin, met grijze omzoming, lichter wordend tussen de poten. Op het onderlijf gaat de kastanjebruine kleur over in bestreping. Mantel/rugdek; grijs, met vrij zware bestreping. Het grijs wordt bruiner richting vleugels. Stuit; grijsbruin bestreept.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; donkerbruin, met lichte zoom op buitenvlag. Op de armpennen is de zoom breder. Grote vleugeldekveren; zwartbruin. Op het uiteinde hiervan, evenals op het uiteinde van de vleugelpennen, wit. Hierdoor ontstaan twee witte vleugelbanden. Staart; bruingrijs, met smalle lichte zoom, onderstaartdekveren wit, met zwarte bestreping.
Snavel:	Zwart, gelig aan de basis. In de zomer diep zwart.
Poten:	Geelbruin, nagels donker. In de zomer diep zwart.
Ogen:	Zwart.

Grasmus	
Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia communis communis</i> .
Ondersoorten:	<i>S. c. icterops</i> en <i>S. c. volgensis</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. In Nederland zijn er 50.000 broedparen in vrij open terrein met struikgewas, braamstruiken en dergelijke. De grasmus lijkt veel op de Braamsluiper, maar is te onderscheiden aan de duidelijk lichtere poten en roestkleurige vleugels.
Opmerking:	Pop: Geheel als de man, alleen de kop is bruin in plaats van grijs. Staart is ook meer roodbruin. Borst lichtbeige
Kleur en tekening:	Man: kop; schedel geheel grijs, met iets hamertekening. In de nek meer bruin. Boven het oog een smal wit randje. Achter het oog grijs, iets lichter dan de schedel. Wangen; bruin, met iets donkerdere strepen. Keel / bef; witcrème.
Lichaam:	Borst; geelachtig bruin (iets roze bij volwassen man). Onderlijf; crèmebruin. Flanken; vanaf de vleugelbocht bruin bewaasd, in de broek iets dieper. Mantel / rugdek en stuit; bruin, met iets grijze waas.
Vleugels en staart:	Slagpennen; donkerbruin met lichte zoom. Dekveren; roestbruin. De vrij lange staart is donkerbruin met lichte zoom in de buitenpennen. Onderstaart iets lichter.
Snavel:	Donker aan de bovensnavel, ondersnavel lichter met iets gele waas.
Poten:	Hoornkleurig, bovenzijde loopbeen iets bruiner, nagels donker hoornkleurig.
Ogen:	Pupil zwart, iris roodbruin

[Terug naar index](#)

Braamsluiper	
Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia curruca curruca</i> .
Ondersoorten:	<i>S. c. blythi</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	13,5 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het Zuidwesten en het hoge Noorden. In Nederland leven naar schatting 15.000 broedparen. Leefgebied laag struikgewas aan bosranden en open plekken in naaldbossen. Lijkt op de grasmus, iets kleiner, kortere staart duidelijk donkere poten. Mist de "rode" gloed in de vleugels en de iris is meer grijs bij volwassen vogels. Ook de zang is duidelijk anders.
Opmerking:	De pop is nagenoeg gelijk aan de man, iets doffer van kleur. 1 ^e Jaars vogels zijn duidelijk lichter van kleur, vooral op de kop en het rugdek. Hierdoor is er meer contrast met de wangvlek. Ook de vleugeldeken zijn duidelijk lichter.
Kleur en tekening:	Kop; schedel bruingrijs, iets hamertekening. Boven het oog een smalle witte oogstreep, vaag doorlopend boven de bruine wangvlek. Keel; nagenoeg wit.
Lichaam:	Vanaf de keel, doorlopend tot de onderstaart, nagenoeg wit. Flanken; iets bruin bewaasd. Mantel / rugdek en stuit; bruin.
Vleugels en staart:	Bruingrijs, dekveren licht gezoomd. Buitenste staartpenen lichter, vooral in zomerkleed.
Snavel:	Bovensnavel bruingrijs, ondersnavel iets lichter.
Poten:	Donker bruingrijs, nagels zwart.
Ogen:	Pupil zwart, iris grijs, bij jonge vogels is de iris meer bruin.

Orpheus grasmus	
Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia hortensis hortensis</i>
Ondersoorten:	<i>S. h. jerdoni</i> en de <i>S. h. crassirostris</i> deze komt voor in Zuidoost Europa en Griekenland. Alleen de zang is verschillend ten opzichte van de nominaatvorm. Toont geen zwart op de kop bij de man. De pop heeft een bruingrijze kop en donkere iris.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	15 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuid Europa, de landen rond de Middellandse zee. Leeft in open bos, bosjes en parken. Lijkt zeer veel op de kleine zwartkop. Buiten het formaat is de iris van het oog het duidelijkste verschil. Bij de Orpheus grasmus een witte iris en bij de kleine zwartkop een rode iris. Jonge Orpheus grasmussen lijken veel op de grote braamsluiper. Deze tonen echter een wit half maantje boven het oog en de snavel is rechter bij de punt. Bij de Orpheus grasmus is deze iets gebogen.
Opmerking:	Pop: Geheel gelijk aan de man, mist alleen het zwart op de kop. Heeft zwart in de wangen, oogring is donkerder dan bij de man, maar nog wel waarneembaar ten opzichte van de pupil.
Kleur en tekening:	Kop; vanaf snavel onder het oog door tot en met de wangen, omhoog lopend tot aan de achter schedel, diepzwart. Achterschedel / nek; bruingrijs. Keel; wit.
Lichaam:	Borst en onderlijf; gebroken wit. Flanken; iets beigebruin van kleur. Mantel / rugdek en stuit; bruingrijs.
Vleugels en staart:	Bruingrijs, de buitenste staartpenen tonen een witte vlag.
Snavel:	Iets gebogen aan de punt, bovensnavel zwart ondersnavel grijs. Punt zwart.
Poten:	Donker grijsbruin, nagels zwart.
Ogen:	Pupil zwart, iris opvallend wit.

[Terug naar index](#)

Sperwer grasmus

Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia nosoria</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	15,5 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Vanaf Duitsland naar het Oosten en Zuidoosten toe. Biotoop; open veld met struiken en bosranden.
Opmerking:	Pop: Geheel veel fletser, mist golftekening nagenoeg. Alleen in de flanken is deze vaag waarneembaar. De oogring is meer bruingeel, ondersnavel lichter. Jonge vogels lijken op de pop, kop en nek zijn donkerder en het oog is geheel zwart, missen de gele oogring.
Kleur en tekening:	Man: Kop; schedel vanaf snavel onder het oog langs tot in de nek donker bruingrijs. Kopveren kunnen iets opgezet worden tot een kuifvorm. Wangen; iets lichter. Keel; lichtcrème, met fijne bruine halve maanvormige tekening.
Lichaam:	Borst en onderlijf; lichtcrème, met bruine golftekening, in de flanken iets grover. Stuit; egaal bruingrijs. Mantel en rugdek; bruingrijs, iets donkerder dan de wangkleur.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, dekveren bruin met lichte zoom. Op de dekveren vanaf de vleugelbocht ook een lichte zoom, dit vormt een smalle band. Staart; donkerbruin. Buitenste pen lichte smalle vlag, doorlopend tot het uiteinde van de staart.
Snavel:	Donker hoornkleurig.
Poten:	Donkerbruin, nagels zwart.
Ogen:	Zwarte pupil met fel gele iris.

Baardgrasmus

Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia cantillans cantillans</i>
Ondersoorten:	<i>S. c. albistriaia</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	12,5 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: De landen rond de Middellandse zee. Leeft in lage bosjes in droge struikgebieden en open plekken in het bos. Te onderscheiden van de brilgrasmus door grijsbruine bovenzijde in plaats van kaneelbruin en het ontbreken van de witte bril bij volwassen vogels. 1 ^e Jaars vogels hebben wel een witte bril. Te onderscheiden ten aanzien van de kleine zwartkop door lichtere bruine kleuren en van de braamsluiper door lichtbruine poten en andere koptekening.
Opmerking:	De pop is geheel doffer / matter van kleur, maar toont wel rode oog ring. Borst en keel meestal slechts licht roze beige getint. Jonge vogels hebben een witte oogring en de borst en de keel hebben een minimale roestbruine gloed.
Kleur en tekening:	Man: kop; gehele schedel net onder het oog doorlopend tot en met de nek blauwgrijs met iets bruine tint. De blauwgrijze wangen zijn vaag afgetekend met een smal donkergrijs half maantje. Keel; roestbruin. Vanaf de snavel tot de onderzijde van de wangen een witte baardstreep met iets roestbruine tint.
Lichaam:	Borst; roestbruin. Flanken; licht roestbruin. Buik en onderlijf; lichtcrème met roestbruine tint. Mantel / rugdek en stuit; grijs, met iets bruine waas.
Vleugels en staart:	Donkergrijs, met smalle iets lichtere zoom.
Snavel:	Bovensnavel en punt grijs, ondersnavel lichter.
Poten:	Lichtbruin, nagels bruin.
Ogen:	Pupil lichtbruin, iris lichtbruin, rond het oog een rode briltekening.

[Terug naar index](#)

Gebrilde grasmus

Wetenschappelijke naam:	<i>Sylvia conspicillata conspicillata</i>
Ondersoorten:	<i>S. c. orbitalis</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	12,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuidwest Europa en Noord Afrika. Leeft in open droge struikgebieden en in kruidachtige vegetatie op droge heiden of zoutvlakten. Lijkt op de grasmus, is kleiner en slanker, dunnere snavel (donker met gelig witte basis) en verhoudingsgewijs kortere staart. Opvallend is de vleugelkleur en tekening en de koptekening.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Pop: Kleur en tekening: Kop; schedel geheel bruinachtig, boven het oog een smal wit randje. Wangen; bruin, met iets donkerdere strepen. Lichaam: Borst; lichtbeige. Onderlijf; crème Vleugels en staart: slagpennen; roestbruin, met brede zwarte afgeronde vlekken. De vrij lange staart is bruingrijs met lichte zoom in de buitenpennen. Onderstaart iets lichter.
Lichaam:	Man: Kop; gehele schedel donker grijs in de nek naar het rugdek bruin bewaasd. Vanaf de snavel rond de witte oogring een zwarte teugel en zwart rond de oogring. Wangen; donkergrijs. Keel; wit, met iets crème.
Vleugels en staart:	Borst en flanken; roze, met grijsachtig waas. Buik; helder wit. Mantel / rugdek en schouders; bruingrijs. Stuit; egaal donkergrijs.
Snavel:	Slagpennen bruin met lichte en roestbruine zoom. Dekveren roestbruin. Duimveertjes zwart met witte omzoming. Staart grijs, met een witte zoom in de buitenste pennen. De toppen van de staartveren zijn iets donkerder. Onderstaart iets lichter.
Poten:	Geelbruin, bovensnavel en punt donker.
Ogen:	Vleeskleurig, nagels zwart.

[Terug naar index](#)

Piepers

Algemene informatie bij de piepers

Piepers behoren samen met de kwikstaarten tot de familie *Motacillidae*. Het zijn vogels, die het formaat van een mus hebben en opvallen door hun lange staart, waarvan de randen van de pennen een crème tot crèmewitte zoom hebben. De vogels zijn druk en levendig, komen veel op de grond waar ze lopen en rennen.

De piepers hebben een vrij lange puntige snavel.

Boompieper	
Wetenschappelijke naam:	<i>Anthus trivialis</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	15 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. Biotoop; open bossen, terreinen met verspreid staande bomen en struiken. Qua kleur en tekening heeft de Boompieper en ook andere piepers wel iets weg van de veel grotere zanglijster. Ten opzichte van de graspieper heeft de boompieper meer geelbruin in het onderlijf, een baardstreep, op de flanken een fijne tekening en bijna geen tekening op de stuit en een kortere achterteennagel. Lange achternagels zijn typisch voor de piepersoorten, per soort vaak duidelijk verschil.
Opmerking:	Bij jonge vogels is de lichaamsbestreping vager en de rugomzoming meer crème. Winterkleed grauwer bruin van kleur
Kleur en tekening:	Kop; schedel donkerbruin met lichtcrème spikkels en lengtestreepjes, nek bruin met spikkels. Wangen; beigebruin, met wat bestreping. Onder de wang en keelstreek crème. Hier tussen een duidelijke zwartbruine baardstreep. Wenkbrauwstreep; vaag en crèmekleurig. Oogring; lichtcrème.
Lichaam:	Borst; crème, met donkerbruine bestreping. Onderlijf; egaal crème. In de flanken meer geelbruin met bestreping. Mantel / rugdek; bruin, met zware zwartbruine bestreping, richting vleugeldek meer bruingrijs. Stuit; bruin, met vage bestreping.
Vleugels en staart:	Zowel vleugel- als staartpennen donkerbruin met vrij brede crème zoom op buitenvlag. Ook de dekveren zijn dezelfde kleur, alleen zijn hier de toppen ook crème, wat twee vleugelbanden vormt. Bovenstaartdekveren ook breed gezoomd.
Snavel:	Hoornkleurig, donker op bovensnavel en punt.
Poten:	Vleeskleurig, nagels hoornkleurig, achterteen iets langer en sikkelvormig.
Ogen:	Zwart.

Grote pieper	
Wetenschappelijke naam:	<i>Anthus novaeseelandiae</i> .
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	18 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Herfstgast in West-Europa (sept.-okt). Broedt in Azië. Pleistert op kustweiden en droge velden met lang gras. Heeft grote poten met de langste achterteennagel van alle piepersoorten. De houding is erg rechtop.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop; schedel donkerbruin, met lichte bestreping. In de nek meer bestreping. Wangen; crème, met bruin. Snavelstreep; donkerbruin. Wenkbrauwstreep; beige, boven het oog crème. Keel; crème.
Lichaam:	Borst; beigebruin, met vrij fijne zwartbruine bestreping, grover wordend bij de vleugelbocht. Onderlijf; crème. Flanken; lichtbruin, zonder of met minimale bestreping. Mantel / rugdek en stuit; bruin, met iets grijze waas en korte vrij smalle zwartbruine streepjes.
Vleugels en staart:	Slagpennen; donkerbruin, met minimale smalle zoom. Armpennen en vleugeldekveren; zwartbruin, met een duidelijke crème zoom. Staart; zwartbruin, met een bruine zoom. Onderstaart; crème, heeft lichte staartspiegels.
Snavel:	Bruingrijs, vrij lang en grof van vorm.
Poten:	Poten: Donkervleeskleurig, nagels bruin. Zeer lange, ruim 2 cm platte achterteennagel.
Ogen:	Zwart.

Graspieper

Wetenschappelijke naam:	<i>Anthus pratensis pratensis</i>
Ondersoorten:	<i>A. p. whistleri</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website .
Formaat:	14,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, zelfs in IJsland. Broedt algemeen op heidevelden, laagveengebieden, weilanden. Lijkt op de boompieper, maar meer grijs, vagere baardstrepen en langere platte achternagel.
Opmerking:	In zomerkleed is de graspieper lichter van kleur, meer licht crème in plaats van beigebruin. Vleugelbanden minder sprekend en grijze waas meer zichtbaar. Jonge graspiepers, bruiner op de mantel, vage strepen op borst en flank. Winterkleed: Rugdek olijfgrijs en onderlijf beigebruin
Kleur en tekening:	Kop; schedel en nek bruingrijs, met zwarte strepen. Wangen; egaal bruin. Keelstreek; beigebruin, loopt onder de wangen door. Is door donkere baardstreep onderbroken. Bij snavelbasis en oogring lichtcrème.
Lichaam:	Borst; beigebruin, met duidelijke zwartbruine strepen. Onderlijf; vuilwit. Flanken; zwartbruine strepen. Mantel / rugdek; bruingrijs met zwartbruine strepen, op de vleugels zijn deze vager. De stuit is minder gestreept.
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwartbruin, met smalle bruine zoom. Armpennen; zwartbruin, met crème iets bredere zoom. Vleugeldekveren; zwartbruin, met bruine zoom en crème witte toppen. Twee vleugelbanden vormend. Staart; zwartbruin, met smalle bruine zoom. In het midden meer zwartbruin.
Snavel:	Hoornkleurig, met donkere bovensnavel en punt.
Poten:	Vleeskleurig, nagels hoornkleurig, achternagel lang en vrij plat.
Ogen:	Zwart.

Duinpieper

Wetenschappelijke naam:	<i>Anthus campestris</i>
Ondersoorten:	<i>A.c.griseus</i> (deze is grijzer van kleur)
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website .
Formaat:	16,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het Noorden en de Britse eilanden. Broedvogel op kale zanderige terreinen en in Zuid-Europa op kale bergheiden. Van alle piepers de lichtst gekleurde vorm, met zijn beigegrijze kleur en vage bestreping op de borst
Opmerking:	Jonge duinpiepers zijn meer beigebruin en tonen veel meer tekening op de kop, borst, rug en vleugeldek. Lijkt op de graspieper, maar de stuit is veel zwaarder gestreept.
Kleur en tekening:	Kop; schedel beigegrijs, met donkere bestreping. Nek; iets donkerder. Wangen; bruin, met vage strepen. Keel; crèmewit, vage snavelstreep. Wenkbrauwstreep; crème. Donkere teugel.
Lichaam:	Borst; crèmewit, met vage strepen. Onderlijf; crèmewit. In de flanken vage strepen. Mantel, rugdek en stuit; beigegrijs, met iets bestreping.
Vleugels en staart:	Vleugel- en dekveren; donkerbruin, met crèmewitte zoom. In de slagpennen iets donkerder. Op het uiteinde van de dekveren, twee crèmewitte vleugelbanden. Staart; bruin, met lichte zoom.
Snavel:	Hoornkleurig, bovensnavel en punt donkerder.
Poten:	Vleeskleurig, nagels hoornkleurig. Lange vrij platte achternagels.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Roodkeelpieper

Wetenschappelijke naam:	<i>Anthus cervinus</i>
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Oost Europa, van het hoge Noorden tot aan het Zuidoosten, evenals Noord Afrika. Leeft in moerasgebieden, voornamelijk boven de boomgrens. De man is in zomerkleed direct te herkennen aan zijn roodbruine keel en borst, in winterkleed is dit beigegrijs. De pop is zwaarder bestreep en heeft vooral in rustkleed een snavel- en baardstreep met een zwarte vlek.
Opmerking:	De pop is in het winterkleed bruiner / donkerder van kleur, veel meer bestreping op kop en borst. In zomerkleed mantel egalier zwartbruin, snavel / baardstreep minimaal. Jonge vogels lijken op de graspieper. Stuit is zwaarder bestreep, kleur meer oranjebruin, twee opvallende lichte strepen op de rug en een donkere baardstreep. 1^e jaars vogel: Mist de roodbruine kleur op kop en schedel en is in het geheel wat grauwer van kleur.
Kleur en tekening:	Winterkleed man: Kop; schedel lichtbruin, met zwarte bestreping. Boven de snavel licht oranjebruin. Keel en wangen; beigebuin, met iets grijze waas. Wenkbrauwstreep en oogring; crème.
Lichaam:	Borst; crème, met minimale bestreping. Onderlijf; lichtcrème. Op de flanken een scherpe zwartbruine bestreping. Mantel / rugdek; bruin, met crème en grove zwartbruine bestreping. Stuit; bruin, zwaar gestreept.
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwartbruin, met een smalle bruine zoom. Armpennen en dekveren; zwartbruin, met een brede crème zoom. Staart; zwartbruin, met crème zoom. Onderstaartdekveren; lichtcrème.
Snavel:	Basis onder snavel groengeel, bovensnavel en punt zwartbruin.
Poten:	Geelbruin, nagels donker hoornkleurig tot zwart. Lange platte achternagel.
Ogen:	Zwart.

Waterpieper

Wetenschappelijke naam:	<i>Anthus spinoletta spinoletta</i>
Ondersoorten:	<i>A. s. blakistoni</i> , <i>A. s. coutellii</i> : Komt voor op de Kaukasus, heeft een duidelijk gestreepte bovenzijde en is op de borst geelbeige van kleur.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	16 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: De Alpen, Pyreneeën en de Balkan. Broedt in berggebieden, op kale Alpine hellingen en hoogvlakten. Trekt over korte afstanden. Overwintert in het laagland aan oevers van meren en rivieren.
Opmerking:	In winterkleed: Is de schedel grijs, het rug- / vleugeldek bruiner en vager gestreept. Wenkbrauwstreep en omzoming witter. Het onderlijf en de borst zijn lichtcrème.
Kleur en tekening:	Kop; schedel grijs, met donkere streepjes. Nek; egalier grijs. Wangen; beigegrijs. Keel; crème. Wenkbrauwstreep; crème, bij het oog witter. Oogring; crème wit. Oogstreep; zwart.
Lichaam:	Borst en onderlijf; bruin, met vage zwarte bestreping in borst en flanken. Mantel/rugdek en stuit; bruingrijs, met vrij smalle zwarte bestreping.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; zwartbruin, met bruingrijze omzoming. De twee vleugelbanden zijn wit. Staart; zwartbruin, met smalle bruingrijze zoom. Onderzijde witte staartspiegels.
Snavel:	Hoornkleurig, zwart aan bovenzijde en punt. Ondersnavel geel, In de zomer is de snavel geheel zwart.
Poten:	Grijs tot licht roodbruin, met een lange iets gekromde achternagel.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Oeverpieper

Wetenschappelijke naam:	<i>Anthus petrosus petrosus</i>
Ondersoorten:	<i>A. p. Kleinschmidti</i> , <i>A. p. littoralis</i> : Komt voor in Scandinavië en Rusland.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	16 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Langs de gehele kust van West Europa vanaf Noord Afrika t/m Finland. De in Noord- en West Scandinavië levende soort, is de ondersoort <i>Littoralis</i> , welke totaal wat grijzer en helderder van kleur en tekening is. De kleur is bijna geheel grijs met iets bruine pennen. De staartkleur doet denken aan de pastefactor. De Scandinavische- en Russische vogels zien er hetzelfde uit als de Europese <i>petrosus</i> in winterkleed.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop; schedel, nek en wangen olijfgrijs. Keel; crème. Snavel- en baardstreep; donkergrijs. Wenkbrauwstreep en oogring; crème, beide zijn niet echt duidelijk aanwezig.
Lichaam:	Borst; crèmegeel, met vage bestreping. Onderlijf; crème. Flanken; crèmegeel, met vage bestreping. Mantel / rugdek; olijfgrijs, met donkere bestreping. Stuit; olijfgrijs.
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwartbruin, met smalle lichte vlag. Armpennen en dekveren; zwartbruin, met beige zoom. Op de vleugels twee beigegrijze vleugelbanden. Staart; zwartbruin, met olijfgrijze zoom.
Snavel:	Ondersnavel; okergeel, met zwarte punt. Bovensnavel; zwart. In de broedtijd is de gehele snavel zwart.
Poten:	Zwart tot roodbruin.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Paapjes en Tapuiten

Algemene informatie paapjes en tapuiten

Paapjes en tapuiten zijn kleine, veelal op de grond levende vogels. Staart; zwart en wit. Mannetje feller van kleur. Buigen en wippen met vrij korte staart. Nemen vaak mooie showhouding aan. Hebben een vrij lang loopbeen.

Tapuit	
Wetenschappelijke naam:	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Ondersoorten:	<i>O. o. leucorhoa</i> : Komt voor op IJsland en Groenland <i>O. o. seebohmi</i> : Komt voor in Noordwest Afrika. Zwarte kin en keel.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	4,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, ook IJsland. Broedt algemeen in steenachtige gebieden, liefst met weinig begroeiing.
Opmerking:	Ondersoort <i>O. o. Leuconhoa</i> is de Groenlandse tapuit. Is iets groter, forser van snavel, bruiner van boven en rossiger van onderen.
Kleur en tekening:	Man: Kop, schedel en nek grijs, iets gehamerd. In de winter bruin. Voorhoofdsband en wenkbrauwstreep; witgrijs. Teugel en wang; zwart. Keel; geelbruin. Pop: Voorhoofd; voor het oog beige. Witte wenkbrauwstreep.
Lichaam:	Man: Borst; geelbruin. In de winter keel en borst beigebruin, met rosse tint. Onderlijf; witgrijs. Mantel / rugdek; grijs, in de winter bruin. Stuit; wit, met vage zwarte omzoming. Pop: Schedel, nek en mantel / rugdek; bruingrijs
Vleugels en staart:	Man: vleugelpennen en dekveren; zwart. In de winter zijn de vleugels bruin, met duidelijke licht beigebruine omzoming. Dekveren ter hoogte van mantel en armpennen zijn vaag witgrijs gezoomd. Staart; het eerste deel wit, het tweede zwart. Een zwart T-patroon. Alleen de twee middelste staartpennen zijn helemaal zwart. Pop: Zwartbruine vleugels, met een smalle beigebruine omzoming.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Bonte tapuit

Wetenschappelijke naam:	<i>Oenanthe pleschanka</i> .
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuidoost Europa. Broedt op steenachtige, droge hellingen en in ravijnen. Zit vaak hoog van de grond, op de uitkijk.
Opmerking:	Man winterkleed: Valer van kleur, met omzoming. 1 ^e Jaars man: iets zwart bij keel, verder grijsbruin met veel omzoming op vleugeldek. Pop zomerkleed: Geheel grijsbruin. Onderlijf; wit, ook witte bovenstaartdekveren. Flanken; licht roodbruin. Vage wenkbrauwstreep achter het oog. Licht grijze smalle omzoming in de pennen. In winterkleed: Veel meer bruin.
Kleur en tekening:	Man: kop, schedel zilvergrijs tot in de nek. Op de achterschedel wat donkere aanslag. Masker, wangen en keel; zwart, dit sluit aan op het zwart van rug- en vleugeldek.
Lichaam:	Borst; zwart. Onderlijf, nagenoeg wit. Flanken; iets rossige waas. Mantel / rugdek; zwart, vloeit iets uit naar schedel. Stuit; wit.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; egaal zwart. Staartpennen; zwart, middelste grijs. Onderstaart; wit.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Roodborst tapuit

Wetenschappelijke naam:	<i>Saxicola torquata</i>
Ondersoorten:	<i>S. t. hibernaus</i> : Komt voor op de Britse eilanden. Donkerder van kleur, bredere omzoming.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website..
Formaat:	12 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Broedt in West-, Midden- en Zuid Europa op heidevelden, grazige vlakten met struikbedekking. Behoort wetenschappelijk niet tot de echte tapuiten. Heeft ook kenmerkende geheel zwarte kop en wit in de hals. Zowel man als pop ook kenmerkende wit op de vleugels. Er is een ondersoort bekend, de Siberische roodborsttapuit (<i>S. maura</i>). Heeft gelig witte stuit, flanken veel vager, vleugeltekening sprekender, witte hals loopt verder door in de nek.
Opmerking:	Jonge vogels meer geelbruin, ook in de armpennen. Lichte keel, bruine wangen en vage wenkbrauwstreep.
Kleur en tekening:	Man: Kop, gehele kop zwart, iets bruine waas. In de winter bedekt met lichte veerranden. In hals wit, tot aan de flanken. Pop: Kop bruingrijs gespikkeld, zonder de witte tekening.
Lichaam:	Man: Borst en flanken; kaneelbruin. Buik en onderlijf; lichtcrème. Mantel / rugdek; zwartbruin, met bruine streepjes en omzoming. Stuit; wit, met aan de buitenrand zwarte vlekken met beige omzoming. Pop: Mantel rug- en vleugelde; bruingrijs, met licht bruine bestreping en omzoming.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen en dekveren; zwartbruin, met smalle bruine zoom. Op vleugels witte vleugelband. Staart; zwartbruin. Pop: Vleugels bruingrijs, met smalle lichte omzoming. De vleugelband is minder sprekend en minder uitgebreid.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Tapuit (*Oenanthe oenanthe*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

Europa, noordwest – Afrika, Azië, noord Amerika en Groenland.

Familie: Muscicapidae Vliegenvangers

De tapuit is een opvallende, middelgrote zangvogel van open gebied. De witte stuit en witte staart met een omgekeerde zwarte 'T' erop zijn belangrijke kenmerken. Mannetje heeft een zwart masker en zwarte vleugels en is overwegend grijs van boven en wit van onder. De pop is onopvallender, meer beige, getekend. Ze hebben een spitse insecteneterssnavel en tamelijk lange poten. Zijn snelle lopers én vliegers. Het verenkleed van de tapuit verschilt per seizoen en per geslacht. Het mannetje heeft in het zomerkleed een grijze bovenzijde, een witte onderzijde, zwarte vleugels en een brede zwarte oogstreep. Het vrouwtje lijkt 's zomers op het mannetje, maar is minder contrastrijk getekend, terwijl de oogstreep nauwelijks zichtbaar is. In het winterkleed is de rug van de beide geslachten bruin, waarbij zich achter het oog van het mannetje een donkere vlek bevindt.

Fysieke standaard

Formaat:

De tapuit is 15 - 16 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

Het is een robuuste en gedrongen vogels.

Houding:

De tapuit is een vrij bewegelijke vogel. In rust is de rug van de tapuit licht gebogen. De tapuit staat vrij hoog op de poten. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

[Zie vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de tapuit zijn:

- **Kop:** De man heeft een zwart masker en een vaal witte wenkbrauwstreep de pop een bruine kop met een vaal witte wenkbrauwstreep. In de winter is het masker van de man minder sprekend zwart dan in de zomer.
- **Lichaam:** Man heeft een lichtgrijze rug en witte borst en buik. In de winter is de buik en borst isabel kleurige buik en borst. De pop een beige rug en buik.
- **Rugdek / mantel:** Man lichtgrijs in zomer en bruin/grijs in de winter. De pop heeft een meer beige rugdek en mantel dan de man.
- **Vleugeldekkeer:** Man zomer zwart en winter bruin/zwart met bruine omlijsting. Pop in zomer bruin en in de winter grijs/bruin.
- **Handpennen:** Man zomer zwart en winter bruin/zwart met bruine omlijsting. Pop in zomer bruin en in de winter grijs/bruin.
- **Bovenstaartdekveren:** Man grijs pop bruin.
- **Staartpennen:** Man en pop bij de wortel wit tot de helft van de staart. De uiteinde van de staart zwart. Opvallend zijn de twee middelste staartpennen die overwegend zwart zijn.
- **Onderstaartdekveren:** Man wit en pop beige.

[Terug naar index](#)

Omschrijving Tapuit:

Kleurslag	Wildkleur man	Wildkleur pop
Kleur:		
Wangen	Zwart zomer winter bruin zwart	Bruin
Keel	Wit zomer beige wit in winter	Beige
Kop	Grijs winter grijs bruin	Bruin beige
Borst	Wit	Beige
Flanken	wit	Beige
Buik	Wit winter isabel kleurig	Beige
Aarsbevedering	Wit	Beige
Handpennen	Zwart winter zwart bruin	Bruin
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Zwart winter zwart bruin	Bruin
Staartpennen	Zwart	Bruin
Bovenstaartdekveren	Wit	Wit
Onderstaartdekveren	Wit	Bruin
Stuit	Wit	Wit
Rugdek, van koptekening tot stuit	Grijs winter grijs bruin	Bruin
Poten	Zwart	Zwart
Nagels	Zwart	Zwart
Snavel	Zwart	Zwart
Ogen	Zwart	Zwart witte
Tekeningkleur:		
Lichaamstekening	Smalle witte wenkbrauwstreep. Teugel wangen zwart winter zwart bruin wangen	Smalle witte wenkbrauwstreep
Stuit	Wit	Wit
Onderstaart dekveren	Wit	Bruin

Keurtechnische aanwijzingen:

De vleugels mogen niet gekruist zijn.

De tapuit is van nature een bewegelijke vogel die veel op de grond verblijft.

Hier mag hij niet op worden bestraft.

[Terug naar index](#)

Isabel tapuit (*Oenanthe isabellina*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

Familie: Muscicapidae Vliegenvangers

Izabeltapuiten zijn in noordwest Europa zeldzame dwaalgasten. De soort broedt in halfwoestijnen en op steppen in het uiterste zuidoosten van Europa en in Azië en is alleen op Sicilië op trek regelmatig te zien. In Nederland werd het eerste geval vastgesteld in 1996 en nadien volgden nog vier gevallen, allen in de periode eind augustus - november. De isabeltapuit lijkt op groot vrouwtje tapuit. Snavel en poten langer, kop groter en staat vaak rechter op. Kop en bovendelen zandkleurig, borst beige, rest van onderdelen wit. Staartpatroon als van andere tapuiten, wit met zwarte 'T', maar zwarte eindband breder dan bij tapuit. Vleugels donkerder dan bovendelen, maar meestal lichter dan van tapuit. Goed veldkenmerk is contrasterende, geïsoleerde zwarte duimvleugel. Sexen vrijwel identiek, hoewel mannetje een iets zwartere teugel heeft.

Fysieke standaard

Formaat:

De isabeltapuit is 16,5 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

Het is een robuuste en gedrongen vogels.

Houding:

De tapuit is een vrij bewegelijke vogel. In rust is de rug van de tapuit licht gebogen. De tapuit staat vrij hoog op de poten. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:

Zie vogelindex NBvV website

Snavel:

Smalle, spits en puntig. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.

Tekeningpatroon

Tekeningonderdelen van de tapuit zijn:

- **Kop:** De isabeltapuit heeft een vaal witte wenkbrauwstreep. Er is geen onderscheid tussen man en pop.
- **Lichaam:** Man en pop zandkleurig.
- **Rugdek / mantel:** Man en pop zandkleurig
- **Vleugeldekker:** Man en pop donker zandkleurig bruin met lichtere zandbruine omlijsting.
- **Handpennen:** Man en pop zandkleurig bruin met uiteinde die donkerde bruin zijn.
- **Bovenstaartdekveren:** Wit.
- **Staatpennen:** Man en pop bij de wortel wit tot de helft van de staart. De uiteinde van de staart zwart. Opvallend zijn de twee middelste staartpennen die overwegend zwart zijn.
- **Onderstaartdekveren:** Man en pop beige.

[Terug naar index](#)

Omschrijving Isabel tapuit

Kleurslag	Wildkleur
Kleur:	
Wangen	Zandkleurig bruin
Keel	Zandkleurig bruin
Kop	Zandkleurig bruin
Borst	Zandkleurig bruin
Flanken	Zandkleurig bruin
Buik	Zandkleurig bruin
Aarsbevedering	Zandkleurig bruin
Handpennen	Zwart bruin
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Zwart winter zwart bruin
Staartpennen	Zwart
Bovenstaartdekveren	Zandkleurig bruin
Onderstaartdekveren	Zandkleurig bruin
Stuit	Wit
Rugdek, van koptekening tot stuit	Zandkleurig bruin
Poten	Zwart
Nagels	Zwart
Snavel	Zwart
Ogen	Zwart
Tekeningkleur:	
Lichaamstekening	Smalle witte wenkbrauwstreep.
Stuit	Wit
Onderstaart dekveren	Zandkleurig bruin

Keurtechnische aanwijzingen:

De vleugels mogen niet gekruist zijn.

De isabeltapuit is van nature een bewegelijke vogel die veel op de grond verblijft.

Hier mag hij niet op worden bestraft.

[Terug naar index](#)

Europees paapje

Wetenschappelijke naam:	<i>Saxicola rebetra</i> .
Ondersoorten:	
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	12,5 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het uiterste Noordoosten. Broedt vrij algemeen op open terrein, vochtige weiden, lage begroeiing en langs sloten. Hoewel er in Europese vogelgidsen alleen paapje genoemd wordt, hebben wij gekozen voor de toevoeging Europees, aangezien er ook uitheemse paapjes bestaan van het geslacht <i>Sporophila</i> .
Opmerking:	Jonge vogels: Lichter van kleur, witte veervelden meer crème.
Kleur en tekening:	Man: Kop en schedel; donker zwartbruin, met lichte bestreping. In de winter: Bruin, met donkere veren die een licht omzoming hebben. Wenkbrauwstreep; wit, in de winter crème, breed achter het oog. Wangen; bruin, aan voorzijde en achterzijde zwartbruin. In de winter: Bruin. Keelband; wit, loopt onder de snavel door langs wangen tot aan nek. Pop: Koptekening als bij de man in de winter. Kopkleur; bruin, met donkere veren.
Lichaam:	Borst; diep oranjebeige. Onderlijf; wit. Flanken; geelbruin. Mantel / rugdek; donker zwartbruin, met crème omzoming. In de winter: Bruin, met donkere veren die een lichte omzoming hebben. Stuit; geelbruin, met donkere vlekken. Pop: Bruin, met donkere veren op mantel / rug- en vleugeldek. Borst; licht oranjebeige.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; donkerbruin, met smalle lichte zoom. Armpennen; donkerbruin, met crème zoom. In de winter: Armpennen; bruin, tussen dekveren en slagpennen wit vlekje. Dekveren; crème omzoomt. Staart; bruin, buitenste staartpennen aan de basis wit. Enkel zichtbaar in de vlucht.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Goudhaantjes, winterkoning, boomkruiper en boomklever

Algemene informatie bij de Goudhaantjes, winterkoning, boomkruiper en boomklever.

Goudhaantje	
Wetenschappelijke naam:	<i>Rugulus rugulus</i>
Ondersoorten:	<i>R. r. azoricus</i> <i>R. r. teneriffae</i> : Komt voor op de Canarische eilanden. Duidelijk zwarte band over het voorhoofd.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBV website.
Formaat:	9 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. Leeft in sparren en andere naaldbossen, maar ook in gemengde bossen en tuinen. Man en pop zijn nagenoeg gelijk. De man toont iets oranje op de achterzijde van de gele band op de schedel/kuif. Jonge vogels missen in het jeugdkleed de kruintekening, maar na de eerste rui is die al zichtbaar. Het goudhaantje is het kleinste vogeltje van Europa.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Rond de snavel lichtgrijs. Over het midden van de kop een fel gele streep. (bij de man iets oranje aan de achterzijde). Aan alle zijden wordt de gele streep afgebakend door een zwartbruin streepje, dat aan de basis meer roodbruin is. Rond het oog een lichtgrijze ring met aan de voorzijde een bruin vlekje. Verder is de kop bruingrijs.
Lichaam:	Borst en buik; bruin, met een iets grijze waas. Flanken; lichter. Mantel; dof grijsgroen. Stuit; geelbruin, duidelijk lichter dan de mantel.
Vleugels en staart:	Donkerbruin, met in de slag- en staartpennen een gele zoom. Grote dekveren; hebben een witte zoom. Kleine dekveren; diepbruin. Op de vleugelbocht een wit vlekje, half in de vleugel een witte band.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Roodbruin, nagels zwart.
Ogen:	Zwart met smalle bruine iris.

Vuurgoudhaantje	
Wetenschappelijke naam:	<i>Regulus ignicapillus ignicapillus</i>
Ondersoorten:	<i>R. i. madeirensis</i> : Komt voor op Madeira. Heeft een kortere wenkbrauwstreep en een langere snavel. De vleugels zijn meer zwart.
Ringmaat:	Zie vogelindex NBV website.
Formaat:	9 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West-, Midden- en Zuid Europa. Leeft in alle soorten bossen en parken. Lijkt veel op het goudhaantje, maar is direct te herkennen aan de witte streep boven en een zwarte streep door het oog. De mantel is bronsgroen. De streep op de kruin oranje.
Opmerking:	Er is geen duidelijk verschil tussen man en pop. Bij de pop is de oranjekleurige kruin iets minder diep van kleur. Dit is alleen waar te nemen als men verschillende vogels kan vergelijken.
Kleur en tekening:	Kop; rond de snavel okergeel. Op de kruin; een fel oranje streep, zwart omrand. Boven het oog een witte wenkbrauwstreep. Vanaf de snavel door het oog een zwarte teugelstreep. Voor de beigegrijze wangen een witte oogvlek. Keel; beigebrown. Achternek; bruingrijs. Hals; geel, met iets bruine waas.
Lichaam:	Borst en onderlijf; beigebrown. Mantel en stuit; bronsgroen.
Vleugels en staart:	Bruingrijs, slagpennen donkere schacht, armpennen lichte schacht. De staart heeft een lichte zoom. Vleugeldekken; dieper bruin, de uiteinden hebben een lichte band. Op de vleugelbocht bevindt zich een wit vlekje.
Snavel:	Zwart.
Poten:	Donker hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Winterkoning

Wetenschappelijke naam:	<i>Troglodytes troglodytes</i>
Ondersoorten:	<i>T. t. hertensis</i> , <i>T. t. hycranus</i> en <i>T. t. kabyloorum</i> , <i>T. t. zetlandicus</i> : Komt voor op de Schotse eilanden. Is donkerder op het rugdek <i>T. t. Islandicus</i> : Komt voor op IJsland. Rugdek donkerder en snavel langer
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	10 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het hoge Noorden. Komt overal voor waar lage struiken groeien. Direct te herkennen aan zijn kleine formaat, met het kort lijkende, opgerichte staartje. De kleur van de vogel is roestbruin.
Opmerking:	Er is geen verschil tussen man en pop.
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel donkerbruin. Vanaf het oog een witcrème wenkbrauwstreep tot in de nek. Wangen meer grijs en gespikkeld. Keel; lichtbruin met witte tekening.
Lichaam:	Borst en onderlijf; lichtbruin, met stiptekening. Mantel; meer roodbruin, met lichte horizontale streep-tekening. Stuit; iets matter.
Vleugels en staart:	Slagpennen; donkerbruin. Armpennen; diep roodbruin. Op de gehele vleugel zitten donkere veervelden, hierdoor ontstaan verticale banden in de slagpennen. De korte staart is diep roestbruin.
Snavel:	Donker bruingrijs.
Poten:	Bruin, nagels donker.
Ogen:	Zwart.

Boomklever

Wetenschappelijke naam:	<i>Siffa europaea caesia</i>
Ondersoorten:	<i>S. e. asiatica</i> : Komt voor in Oost - Rusland en Siberië. Witte wenkbrauwstreep en wit op voorhoofd buik en flanken wit <i>S. e. cisalpina</i> : Komt voor in Zuid - Europa en Marokko. Onderlichaam meer warm oranje tint. <i>S. e. Levantina</i> , <i>S.e. rubiginosa</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Bijna geheel Europa. Leeft in bossen, tuinen en parken. Vrij lange snavel en korte staart. Er zijn 2 soorten "gewone" boomklevers de <i>S.e. europaea</i> . Deze komt voor in Scandinavië en Noord Rusland. Deze is nagenoeg geheel wit op de borst en buik. Deze nominaatvorm kunnen we Noorse boomklever noemen. De andere <i>S. e. caesia</i> , welke in West-Europa voorkomt de gewone, dus enkel boomklever. Deze laatste wordt hierbij beschreven. Tussenvormen komen ook voor.
Opmerking:	Pop is gelijk aan de man, alleen het kastanjebruin in de flanken en onderstaart is doffer roestbruin.
Kleur en tekening:	Kop en schedel; geheel blauwgrijs. Kin en wangen; wit. Vanaf snavel door het oog een zwarte streep, in de nek iets omlaag lopend.
Lichaam:	Borst / buik; rossig bruin, loopt door achter de wang tot aan de zwarte oogstreep. Flanken; aan de basis kaneelbruin, overgaand in kastanjebruin tot en met de broek. Rugdek en stuit; blauwgrijs.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, met witte zoom. Armpennen; blauwgrijs. Staart; blauwgrijs. Onderstaart; wit, met kastanjebruine omzoming.
Snavel:	Leiblaauw, ondersnavel aan de basis iets lichter.
Poten:	Geelbruin, nagels hoornkleurig. Achterteen nagel vrij lang.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Boomkruiper

Wetenschappelijke naam:	<i>Certhia brachydactyla</i>
Ondersoorten:	<i>C. b. Mauritanica</i> en <i>C. b. megarhyncha</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBV website.
Formaat:	13 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: West-, Midden- en Zuid-Europa in oudere loofbossen, parken en tuinen. Alle boomkruipers hebben een vrij lange staart ter ondersteuning en vrij lange achtereennagels. De snavel is iets gebogen.
Opmerking:	Man en pop zijn gelijk.
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel tot en met de nek bruin, met lichte en donkere bestreping. Vanaf het oog loopt een korte lichtcrème wenkbrauwstreep. Wangen; grijsbruin, met lichte en donkere bestreping. Keel; lichtcrème, met vage bestreping.
Lichaam:	Borst en flanken; lichtcrème, met minimale vage streepjes. Onderbuik; bruin. Rugdek; bruin, met lichte en donkere bestreping, zoals op de kop. Stuit; bruin.
Vleugels en staart:	Vleugels; bruin, met lichte omzoming en witte toppen. Lichtcrème spiegels. Vleugeldekveren; aan de toppen beige, hierdoor ontstaat een bandtekening ten opzichte van de vleugelbocht en afscheiding slagpennen. Staart; geheel bruin.
Snavel:	Grijs, ondersnavel iets lichter.
Poten:	Donker vleeskleurig bruin. Nagels donker hoornkleurig.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Leeuweriken

Algemene Informatie bij de leeuweriken

Leeuweriken behoren tot de familie *Alaudidae*. Het zijn vogels, die het formaat van een mus hebben en wat meer gedrongen overkomen dan de piepers. Behoudens de in deze herkenningomschrijving niet opgenomen Zwarte leeuwerik zijn de poppen en mannen veelal gelijk van uiterlijk. De leeuweriken vallen op door een zangvlucht hoog in de lucht. Nesten worden veelal op de grond aangetroffen.

Kuifleuwerik	
Wetenschappelijke naam:	<i>Galerida cristata</i>
Ondersoorten:	<i>G. c. arenicola</i> , <i>G. c. brachyura</i> , <i>G. c. festae</i> , <i>G. c. macrorhyncha</i> , <i>G. c. maculata</i> , <i>G. c. nigricans</i> , <i>G. c. riggenbachi</i> en <i>G. c. subtaurica</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBVV website.
Formaat:	17 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd de Britse Eilanden, Noord- en Noordoost Europa. Is vrij algemeen in droog open terrein met schaarse vegetatie, wegbermen vaak bij graansilo's. Spoordijken, in havens bij dokken. Opvallend puntige kuif, vrij korte staart, lange punt aan achternagel. Geen witte vleugelbanden.
Opmerking:	
Kleur en tekening:	Kop: schedel (kuif) grauwbruin met fijne smalle crème streepjes. Wenkbrauwstreep crème, baard- en oogstreep bruin. Wangen crème, achter wang beige. Keel licht crème.
Lichaam:	Borst crème met donkerbruine streepjes/vlekjes. Onderlijf crème, in flanken bruin. Mantel/rugdek beigebruin met donkere en lichte omzoming. Stuit beigebruin met vage vlekjes.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen bruin met beige zoom en donkerder bij de schacht. Dekveren bruin met lichtbruine zoom en toppen. Vleugelbanden vaag waarneembaar. Staart vrij kort, bruin met lichte zoom en zwart bij de schacht.
Snavel:	Donker hoornkleurig (vrij lang) iets gelig aan de basis.
Poten:	Hoornkleurig, lange punt aan achternagel en vrij lang loopbeen.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Veldleeuwerik

Wetenschappelijke naam:	<i>Alauda arvensis arvensis</i>
Ondersoorten:	<i>A. a. dulcivox</i> , <i>A. a. sccotica</i> en <i>A. a. sierra</i>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	18 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa. In weiden, bouwland. Is een grondvogel. Heeft lange staart en veel scherpere vleugeltekening als de boomleeuwerik, is ook groter.
Opmerking:	In winterkleed: Donkerder en zwartbruine rand tussen keel en borst. Kan iets kuifvorm tonen. Jonge vogels meer geschubd en nog geen witte vleugelbanden. Door domesticatie is bij de veldleeuwerik ook een pastelmutant ontstaan. Deze is echter nog niet veelvuldig beschikbaar en dan ook nog niet opgenomen in deze beschrijving.
Kleur en tekening:	Kop; schedel, donkerbruin, met crème bestreping. Lichtcrème wenkbrauwstreep. Wangen; lichtbruin, donker omrand. Keel; crème.
Lichaam:	Borst; beigebruin, met korte streepjes. Onderlijf en flanken; lichter. Mantel / rugdek; bruin, met crème en zwarte bestreping.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, met beige zoom. Armpennen; donkerbruin, met iets bredere beige zoom. Dekveren; zwartbruin, met lichtcrème zoom en twee lichtcrème vleugelbanden. Op vleugelbochten vager. Staart; bruin, met witte vlag aan buitenzijde
Snavel:	Puntig, hoornkleurig met bruine punt.
Poten:	Hoornkleurig, met lange achternagel.
Ogen:	Zwart.

Boomleeuwerik

Wetenschappelijke naam:	<i>Lullula arborea arborea</i>
Ondersoorten:	<i>L. a. pallide</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	15 cm
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Geheel Europa, uitgezonderd het Noorden en Oosten. Biotop; heidevelden, bosrijke duinen, boom kwekerijen. Lijkt veel op de veldleeuwerik, maar de staart is veel korter. Heeft een duidelijke wenkbrauwstreep, welke geheel rond loopt over de nek. De kuif wordt zelden opgericht.
Opmerking:	In winterkleed minder crème en zwart. Is dan meer grijs bewaasd, totaal grauwer van kleur. Poten/ snavel donkerder. Kan kopveren iets opzetten.
Kleur en tekening:	Kop; schedel bruin, met crème en zwartbruine bestreping. Wenkbrauwstreep; wit, doorlopend in de nek. Waar ze in een V-vorm samen komen. Wangen; bruin, achterzijde sikkelvormig donkerbruin en voorzijde crème. Fijne zwartbruine baardstreep. Keel; crème.
Lichaam:	Borst, onderlijf en flanken; beigebruin, met op de borst fijne zwartbruine streepjes. Mantel/rugdek; bruin, met zwartbruine en crème bestreping.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, met zwart rond de schacht. Armpennen; bruin, met crème zoom. Dekveren als rugdek. Staart kort van vorm, donker bruin met lichte zoom. Middellange staart.
Snavel:	Puntig van vorm, donkerhoorn kleurig. Bovensnavel donkerder.
Poten:	Hoornkleurig, lange achternagel
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Strandleeuwerik

Wetenschappelijke naam:	<i>Eremophila alpestris alpestris</i>
Ondersoorten:	<p><i>E. a. atlas</i>.</p> <p><i>E. a. balcanica</i>: Komt voor in Zuidoost Europa. Het zwart van de kop is verbonden met het zwart van de borst.</p> <p><i>E. a. bicomis</i>: Komt voor in het Midden Oosten. De mantel en het rugdek zijn warm roodbruin.</p> <p><i>E. a. flava</i>: Komt voor in Noord Europa. Het zwart van kop is gescheiden van de zwarte borstvlak.</p> <p><i>E. a. penicillata</i>: Komt voor Noord Turkije en de Kaukasus. Het zwart van de kop is verbonden met de zwarte borst.</p>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	17 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Noord- en West-Europa. Op bergachtige droge gronden, vaak hoog op de top van een heuvel. Er komt ook een ondersoort voor in Zuid- en Oost-Europa de <i>penicillata</i> . Deze heeft meer zwart aan de kop, baardstreep gaat over in de borst en een opmerkelijke kuifvorm. Dit zijn hoorntjes. Is ook meer bruin van kleur in plaats van grijs. Kenmerkend van beide soorten zijn de zwarte hoorndelen.
Opmerking:	Jonge vogels en ook poppen geheel anders van kleur. Het grijs is bruin. Flanken goed zichtbaar, borst smaller, zwarte baard en kopband veel vager. Wel donkere hoorndelen.
Kleur en tekening:	Kop; voorhoofd, wenkbrauw en wangen wit, met gele waas. Achterzijde wangen; beigegrijs. Zwarte schedelstreep, achterschedel nek rossig grijs, teugel en baardstreep; zwart. Keel; wit, met gelige waas.
Lichaam:	Borst; zwart in hals wit, geelachtig. Onderborst / onderlijf; wit. In flanken iets beigebroune waas, vooral op laatste deel. Mantel/rugdek; beigegrijs, met korte fijne tekening. Bij vleugels meer bruine waas.
Vleugels en staart:	Slagpennen; grijs, met lichte zoom en toppen bruin met lichte zoom. Armpennen; bruin, met brede licht grijze zoom. Dekveren; beigegrijs, met lichte zoom en witte toppen (vleugelband). Staart; zwart, met witte spiegel op buitenpen. Bovenstaartdekveren; bruin, met grijze zoom.
Snavel:	Zwart, ondersnavel aan de basis grijs en iets gebogen
Poten:	Zwart.
Ogen:	Zwart.

Kalender leeuwerik

Wetenschappelijke naam:	<i>Melnocorypha calendra calendra</i>
Ondersoorten:	<i>M. c. hebranca</i> .
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	20 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuid Europa, vooral langs de Middellandse Zee. In droog open terrein. Grote leeuwerik, met een vrij korte staart en brede lange vleugels met witte toppen. Zeer donkere ondervleugels, een dikke snavel en zwarte vlekken in de hals.
Opmerking:	De pop is fletser van kleur, meer bruin. De zwarte veervelden zijn bij de pop bruin. Berg kalenderleeuwerik, <i>M. bimaculata</i> : Uit de Kaukasus en Turkije is kleiner, 17 cm. De zwartbruine hals loopt door als een borstband, de borst is niet wit maar egaal lichtbruin. De vleugeltekening sprekender door een lichte zoom. Snavel is verhoudingsgewijs forser. Ondervleugels lichter, door slechts een crème witte zweem op de toppen van de armpennen. Geen wit in de staart, maar crème spiegels.
Kleur en tekening:	Kop; schedel grijsbruin, met een fijne lichte bestreping. Wangen; bruin, met een donker randje. Wenkbrauwstreep; crèmewit. Keel en hals; crèmewit.
Lichaam:	Onder de hals; V-vormig zwart, in het midden wit en iets gespikkeld. Borst; beigebroun, licht bewolkt. Onderlijf; egaal beige, in de flanken iets dieper. Mantel / rugdek; grijsbruin, met donkere vlekjes en een lichte omzoming.
Vleugels en staart:	Vleugelpennen; donkerbruin, met een lichte zoom. Armpennen; witte toppen. Dekveren; zwartbruin, met een lichtbruine vleugelband. Staart; bruin, met lichte zoom en spiegels.
Snavel:	Donker hoornkleurig, vrij fors van vorm.
Poten:	Vleeskleurig. Een lange punt aan de achternagel.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Kleine kortteen leeuwerik

Wetenschappelijke naam:	<i>Calandrella rufescens rufescens</i>
Ondersoorten:	<p><i>C. r. apetzii</i>: Komt voor in Spanje. Is kleiner en grijsbruin, heeft een zwaar gestreepte borst en flanken.</p> <p><i>C. r. heinei</i>: Komt uit Oost Europa. Is vrij groot en grijs van kleur, met een gestreepte borst en zwak gestreepte flanken.</p> <p><i>C. r. minor</i>: Afkomstig van de Canarische eilanden. Is kleiner met een fijn gestreepte borst en ongestreepte flanken.</p> <p>en verder <i>C. r. polazeki</i>, <i>C. r. perzica</i> en <i>C. r. aharonii</i>.</p>
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.
Formaat:	14 cm.
Algemeen:	Verspreidingsgebied: Zuid-, West- en Zuidoost Europa. In droog open terrein, maar ook op vochtige gronden. Broedt op droge kleivlakten, aan zoutpannen en woestijnachtige steppen. Het verschil met de kortteen leeuwerik is het kleinere formaat. De kleine kortteen leeuwerik is wat grijzer van kleur en wat gelijkmatiger gestreept. De oogring en wenkbrauwstreep zijn crème in plaats van wit. Het beste van de kortteen leeuwerik te onderscheiden door de, ook op het midden, gestreepte borst.
Opmerking:	Het winterkleed is in zijn geheel iets grauer van kleur.
Kleur en tekening:	Kop; schedel lichtbruin, met donkere- en crème streepjes. Keel en hals; crème. Wangen; crème, aan achterzijde bruin gestreept. Oogring en wenkbrauwstreep; crème, achter het oog en onder de oogring een donker streepje.
Lichaam:	Borst; crème, vanaf de hals een donkerbruine bestreping en in het midden iets vager. Onderlijf en flanken; crème, in de flank een donkere bestreping. Mantel/rugdek; lichtbruin met crème en donkere vlekjes.
Vleugels en staart:	Slagpennen; bruin, met een donkere schacht en een lichtcrème buitenvlag. Armpennen; bruin, met crème zoom. Grote vleugeldekveren; donkerbruin, met crème zoom. De kleine vleugeldekveren zijn scherp afgetekend, met een zwartbruin hart en een crème zoom (vleugelband). Staart; bruin, met crème zoom.
Snavel:	Donker hoornkleurig. Vrij dik, iets vinkachtig.
Poten:	Vleeskleurig, nagels hoornkleurig. Met een vrij lange achternagel.
Ogen:	Zwart.

[Terug naar index](#)

Wielewaal

Algemene informatie:

De wielewaal hoort tot het genus *Oriodae*. Het zijn forse vogels die het formaat van een lijster hebben. De vogels zijn levendig, eerder schuw te noemen en vallen, ondanks zijn heldere kleuren, nauwelijks op. Houd zich hoog in de bomen verborgen.

Wielewaal

Wetenschappelijke naam:	<i>Oriolus oriolus</i>	
Ondersoorten:		
Ringmaat:	Zie vogelindex NBvV website.	
Formaat:	23 cm.	
Algemeen:		
Opmerking:	Verspreidingsgebied: Europa, met uitzondering van Noord Europa. Broedt in hoog loofbos, graag nabij meren, ook in parken en boomgroepen in cultuurlandschap. Zomergast (april tot september). Voedsel bestaat uit insecten en bessen. Ondanks zijn fel gele kleur wordt deze vogel meer gehoord dan gezien. De mannen bezitten pas na 3 jaar hun volledige diep gele kleur. Jongen zijn te herkennen aan het grijsgroene rug- en vleugeldek en aan de vuilwitte buik met fijne streeptekening.	
	Man	Pop
Kleur en tekening:	Kop; gehele schedel diep helder geel, in de nek helder geel. Vanaf de snavel naar het oog een zwarte teugel, die vaag zichtbaar is achter het oog. Wangen; diep helder geel. Keel; diep helder geel.	Kop; schedel geheel geelgroen, boven het oog een smal lichtgeel randje. Wangen; geelgroen. Keel en bef; witgrijs, met een fijne zwarte streeptekening. Vanaf de snavel naar het oog een zwarte teugel, die ook vaag zichtbaar is achter het oog
Lichaam:	Borst en flanken; diep helder geel. Buik; helder geel. Mantel / rugdek en schouders; diep helder geel. Stuit; egaal helder geel.	Borst; witgrijs met een fijne zwarte streeptekening. Onderlijf; witgrijs met een fijne zwarte streeptekening. Flanken; vanaf de vleugelbocht geel, met een fijne zwarte streeptekening. Mantel / rugdek; geelgroen. Stuit; geel
Vleugels en staart:	Slagpennen; zwart met witte zoom. Dekveren; zwart, op de zwarte grote vleugeldekveren een helder gele spiegel. Staart; zwart, met aan de 3 buitenste pennen een heldere gele vlek die samen de staartspiegel vormen. Onderstaart; geel, de 2 buitenste pennen zijn halverwege zwart.	Slagpennen; zwart met witte omzoming. Dekveren; groengeel. De grote vleugeldekveren zwart, waarvan er 4 een witte omzoming aan het uiteinde hebben, deze vormen de vleugeltekening. Staart; zwartgrijs met aan de 3 buitenste pennen een gele vlek, die samen de staartspiegel vormen. Onderstaart; geel, de 2 buitenste pennen zijn halverwege zwartgrijs. Onderstaart; groengeel.
Snavel:	Roodachtig.	Roodachtig
Poten:	Grijs, nagels zwart.	Grijs, nagels zwart.
Ogen:	Pupil zwart, iris roodbruin. Om het oog een gele oogring.	Pupil zwart, iris roodbruin.

[Terug naar index](#)

Draaihals (*Jynx linnaeus*)

Algemene Informatie

Verspreidingsgebied:

Hij broedt in een groot deel van Europa, Noordwest-Afrika en in Azië tot China en Japan.

Hij is de enige trekvogel onder de spechten en overwintert in tropisch Afrika, Zuid- en Zuidoost-Azië en het zuiden van Japan.

Er worden zes ondersoorten onderscheiden:^[4]

J. t. torquilla: van westelijk Europa tot Bulgarije en de Kaukasus.

J. t. sarudnyi: westelijk Siberië.

J. t. chinensis: oostelijk Siberië en noordoostelijk en centraal China.

J. t. himalayana: noordelijk Pakistan en de noordwestelijke Himalaya.

J. t. tschusii: zuidelijk Europa.

J. t. mauretunica: noordwestelijk Afrika.

De draaihals is met zijn bruine camouflagekleuren een heel ander soort specht dan de bekende grote bonte specht. In Nederland vooral als zeldzame doortrekker te zien. Hij nestelt in boomholten, vooral in berken. Alleen tijdens de broedperiode zitten draaihalzen vaak, zoals de andere spechten, tegen een boomstam; de rest van het jaar vooral op de grond. Draaihalzen foerageren in schrale pionier vegetaties op zandgrond en leven van mieren. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. De draaihals is een grijsbruine vogel met lichtere onderdelen, van dichtbij is de boomschorstekening te zien (heeft iets weg van de Nachtzwaluw). Donkere streep door het oog, die doorloopt over de hals. Heeft een slangachtig voorkomen en gedraagt zich ook een beetje als een slang. Bij gevaar en bij de balts steekt hij de kop omhoog en draait en kronkelt als een slang heen en weer (naam), terwijl hij sissende geluiden maakt. Het is een schaarse zomergast.

Fysieke standaard

Formaat:

De draaihals is 16 - 17 cm lang, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:

De draaihals moet een robuuste vogel zijn. Ondanks dat de draaihals een robuust uiterlijk heeft is hij opvallend lang. Van opzij gezien moet de borst- / buiklijn van voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. De nek is vol. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de draaihals niet de indruk maken uitgezakt te zijn.

[Terug naar index](#)

Houding:

De draaihals is een nieuwsgierige vogel en zal zich goed kunnen tonen tijdens de keuring. Hij hoort rechtop te zitten, het lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten bijna op het eind van de staart.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste.

Poten:

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen, waarvan twee tenen naar voren en twee naar achteren, met aan elke teen een iets gekromde nagel.

Ringmaat:

[Zie vogelindex NBvV website](#)

Snavel:

Een lange dolkvormige snavel. Onderen bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.

Bevedering:

Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten gedragen te worden. De staart heeft een enigszins afgeplat model.

Tekeningpatroon:

Tekeningonderdelen van de draaihals zijn:

- **Lichaam:** Een fijne geconcentreerde platte v-tekening die onder de snavel begint en over borst die grover uitloopt tot op de staart en hier minder sterk geconcentreerd zijn. De tekening ligt in dwars lijnen.
- **Kop:** Keel eenkleurig licht bruin met een platte v-tekening. Een bruine oogstreep die op de snavel begint en door het oog naar de hals loopt. Het deel van de oogstreep van de snavel naar het oog is vaag waarneembaar. Het deel van af het oog naar de hals is veel breder en donkerder bruin.
- **Rugdek / mantel:** Van af achterzijde kop loopt een bruine streep over het midden van de rug. Deze loopt door tot aan de stuit. Het rug dek is grijsachtig met een schubtekening. Op de overgang van de mantel naar de vleugeldekveren ligt een bruine streep.
- **Vleugeldekveer:** een fijne lichte bruine schubtekening met een aantal grovere lichtgrijs bruine stippen.
- **Handpennen:** Bruin met een lichtbruine dwarsbestreping.
- **Bovenstaartdekveren:** bruin geschuift.
- **Staartpennen:** bruin geschuift.

Kleurstandaard Draaihals:

Kleurslag	Wildkleur
Kleur:	
Wangen en keel	Lichtbruin met een donker oogstreep die door het oogloopt
Rond de snavel	Lichtbruin
Borst	Bruin met een donkere bruine v- tekening
Flanken	Licht cremekleurigbruin met v-tekening
Buik	Licht cremekleurigbruin met v-tekening
Aarsbevedering	Licht cremekleurigbruin met v-tekening
Handpennen	Bruin met een lichtbruine dwarsbestreping
Armpennen, kleine en middelste vleugeldekveren	Bruin geschuopt
Staartpennen	Vier buitenste staartpennen boven en onderzijde van af de helft van de pen is wit
Bovenstaartdekveren	Bruin beschuopt met drie vage dwarsbanden
Onderstaartdekveren	Licht bruin beschut
Stuit	Licht bruin beschut
Rugdek, van koptekening tot stuit	Van af achterzijde kop loopt een bruine streep over het midden van de rug. Deze loopt door tot aan de stuit. Het rug dek is grijsachtig met een schubtekening. Op de overgang van de mantel naar de vleugeldekveren ligt een bruine streep.
Poten	Licht bruin
Nagels	Licht bruin
Snavel	Licht bruin
Ogen	Licht bruin, pupil zwart
Tekeningkleur:	
Koptekening	Bruin
Kintekening	Licht bruin met fijne v-vormige dwarsstrepen
Oogstreep	Donker bruin

Keurtechnische aanwijzingen : Draaihals

De vleugels mogen niet gekruist zijn.

De draaihals kan, dit is een natuurlijke reactie op gevaar, plotseling verstarren.

Hij mag op dit gedrag niet bestraft worden,

[Terug naar index](#)