

Standaard:



Cyanoramphus, Kakariki

Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

© Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Uitgave: **Augustus 2014-2024**

Revisie September2023

Inhoud:

.....	1	FALLOW GROEN:	20
CYANORAMPHUS, KAKARIKI	1	FALLOW AQUA	20
INHOUD:.....	2	FALLOW TURQUOISE	20
VOORWOORD	4	GEZOOMD GROEN:	22
VOORWOORD 2024	4	GEZOOMD AQUA:	22
ALGEMEEN	5	GEZOOMD TURQUOISE:	22
ROODVOORHOOFD KAKARIKI,	7	RECESSIEF BONT SERIE:	24
CYANORAMPHUS NOVAEZELANDIA.....	7	RECESSIEF BONT GROEN:.....	24
1: ALGEMEEN:.....	7	RECESSIEF BONT AQUA:	24
.2.VEERSTRUCTUUR VAN DE ROODVOORHOOFD KAKARIKI	7	RECESSIEF BONT TURQUOISE:	24
3. FYSIEKE STANDAARD (MAN EN POP):	7	DOMINANT BONT SERIE:	26
4. MUTATIES BIJ DE ROODVOORHOOFD KAKARIKI:	8	DOMINANT BONT GROEN:.....	26
4.1 VOORKOMENDE MUTATIES.....	9	DOMINANT BONT AQUA:	26
4.2. KENMERKEN VAN EN TOELICHTING BIJ DE MUTATIES:.....	10	DOMINANT BONT TURQUOISE:	26
4.3. MUTATIECOMBINATIES	12	DEC GROEN:.....	28
MUTATIES AANWEZIG BIJ DE ROODVOORHOOFD KAKARIKI:	13	DEC AQUA:	28
DE TEKENINGONDERDELEN VAN DE ROODVOORHOOFD KAKARIKI: ..	13	DEC TURQUOISE	28
WILDKLEUR EN PRIMAIRE MUTATIES – ROODVOORHOOFD KAKARIKI:14		GEELVOORHOOFD KAKARIKI,	30
GROEN:.....	14	<i>CYANORAMPHUS AURICEPS FORBESI</i>	30
AQUA:.....	14	1: ALGEMEEN:	30
TURQUOISE:.....	14	2. VEERSTRUCTUUR VAN DE GEELVOORHOOFD KAKARIKI:.....	30
SL INO: (LUTINO)	16	IN DE HOORNDELEN ZIT MEESTAL ZWART EUMELANINE.3. FYSIEKE	
SL INO AQUA:.....	16	STANDAARD	30
SL INO TURQUOISE:.....	16	GEELVOORHOOFD KAKARIKI (MAN EN POP).	30
CINNAMON GROEN:	18	4. MUTATIES BIJ DE GEELVOORHOOFD KAKARIKI:	31
CINNAMON AQUA:	18	4.1. KENMERKEN VAN EN TOELICHTING BIJ DE MUTATIES:	31
CINNAMON TURQUOISE:.....	18	4.2. MUTATIECOMBINATIES:.....	31
		MUTATIES AANWEZIG BIJ DE GEELVOORHOOFD KAKARIKI:	31

5 DE TEKENINGONDERDELEN VAN DE GEELVOORHOOFD KAKARIKI:	31
6. BESCHRIJVING VAN WILDKLEUR, PRIMAIRE MUTATIES	32
GROEN:	32
CINNAMON GROEN:	32
FALLOW GROEN:	32
SL INO GROEN:	32
DOMINANT BONT:	32
RECESSIEF BONT:	35
DEC GROEN:	35
DEC TURQUOISE:	35
ALGEMENE AANVULLING GEEL VOORHOOFD KAKARIKI SERIE	37

[Terug naar index](#)

NOOT:

De **geel** en **groen** gemarkeerde items zijn herkenning omschrijvingen.
Indien daar iets niet van klopt dan gaarne melding aan de TC Tropen en Parkieten.

Voorwoord.

Deze standaard *Cyanoramphus*, De standaard voor de Kakariki is tot stand gekomen in samenwerking met de Technische Commissie Tropische Vogels en Parkieten van de Keurmeester Vereniging N.B.v.V en SKG Parkieten Speciaal Club van de NBvV

De vogelliefhebberij is voortdurend in beweging. De Kakariki's worden veelvuldig gekweekt. Er is sprake van domesticatie. Een gevolg van deze domesticatie is het ontstaan van mutaties. De liefhebbers combineren deze mutaties en zo ontstaan steeds nieuwe kleurslagen.

In deze standaard zijn naast de wildkleur ook de tot nu toe bekende mutanten opgenomen. Zoals elke standaard zal ook deze standaard in de toekomst periodiek herzien moeten worden.

Tevens worden ook de minder voorkomende soorten *Cyanoramphus* beschreven. Deze beschrijvingen dienen als herkenningbeschrijving.

Tenslotte spreekt de KMV (TC) de hoop uit, dat deze standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen in de kweek van de Kakariki.

Augustus 2014.

De Technische Commissie Tropische vogels en parkieten van de Keurmeester Vereniging N.B.v.V

Voorwoord 2018-2020

Lay-out omgezet in landscape, violet beschrijving aangepast naar huidige inzichten.
Ringmaten verwijderd met verwijzing naar de website vogelindex.nl met vermelding dat de kakariki's on Cites lijst A vallen

De TC T&P
Utrecht voorjaar 2020

Voorwoord 2024

Aantal niet aanwezige kleur mutaties uit de standaard verwijderd.
Toegevoegd herkenning omschrijvingen van de roodvoorhoofd kakariki :
Fallow aqua en Turquoise
Gezoomd Groen, Aqua en Turquoise:
Recessief bont Aqua en Turquoise
Dominant bont Aqua en Turquoise

Toegevoegd herkenning omschrijvingen geelvoorhoofd kakariki:
DEC turquoise

Aanvullende omschrijvingen wijzigingen t.o.v. de roodvoorhoofd kakariki.

NOOT:

De **geel** gemarkeerde items in de inhoudsopgave zijn herkenning omschrijvingen.
Indien daar iets niet van klopt dan gaarne melding aan de TC Tropen en Parkieten.

De TC T&P
Utrecht zomer 2023

[Terug naar index](#)

Algemeen

Cyanoramphus (Kakariki) soorten hebben door de veelvuldige kweek, al dan niet gewild, zowel negatieve als positieve kweekselecties ondergaan. Het gevolg daarvan zijn afwijkingen in formaat, model, kleur en tekening.

Naast de variatiebreedte binnen de soorten is als gevolg van de domesticatie, ook een aantal mutaties ontstaan. Bij het ontstaan van nieuwe mutanten worden de Roodvoorhoofd kakariki en de Geelvoorhoofd kakariki gebruikt om mutanten over te brengen van de ene naar de andere soort, vooral de koptekening zal hier duidelijkheid geven. Vooral de kleur van de voorhoofdsband is afwijkend van beide soorten.

De standaard van de geslachten *Cyanoramphus* (Kakariki) bevat per soort de volgende diverse onderdelen:

1. Algemeen;
2. Fysieke standaard;
3. Mutaties en mutatiecombinaties;
4. Beschrijving van mutaties;
5. Standaardeisen van de soorten

Het geslacht *Cyanoramphus Bonaparte*- Kakariki

De Kakariki komt voor in Nieuw-Zeeland en de bijliggende eilanden. Het zijn middel grote parkieten. Het formaat van de man is ongeveer 2 cm groter dan van de pop. De man en pop verschillen niet van kleur en tekening. Wel is bij de man de snavel bij de snavelinplant wat breder en forser dan bij de pop. De voetwortel beentjes zijn erg lang te noemen.

De soorten van het geslacht Kakariki zijn populair bij de kwekers en worden dan ook veel gehouden. De Kakariki leeft in hoofdzaak van gras- en onkruidzaden.

De voeding in gevangenschap bestaat uit een zaadmengsel voor grote parkieten. Hiernaast wordt elke dag een mengsel van kiemzaad en eivoer verstrekt. De verhouding tussen het zaad en kiemzaad /eivoer-mengsel is een op een. Scherpe maagkiesel en oesterschelpengrit mogen niet ontbreken. Als nestgelegenheid wordt een nestblok verstrekt met de volgende afmetingen: 40 cm hoog, een bodemoppervlak van 15 x 15 cm en een invlieggat van 6 cm doorsnee. Als nestmateriaal kan rottend hout, houtspaanders of zaagsel dat vermengd wordt met (onbemeste) potgrond, bos humus of turf (laagdikte circa acht cm). Met de Kakariki kan vrij gemakkelijk worden gekweekt en het zijn zeer makke vogels. Als ze aan meelwormen gewend zijn komen ze uit je hand eten. Na 8 maanden zijn ze al geslachtsrijp. In Europa wordt alleen maar gekweekt met de Roodvoorhoofd kakariki en Geelvoorhoofd kakariki.

[Terug naar index](#)

1: De *Cyanoramphus unicolor* (Lear)

Nederlands: Groene Kakariki
 Engels: Green Parakeet
 Duits: Grune Sittich
 Frans: Perruche Verte D'Antipode
 Verspreiding: Het eiland Antilope dat slecht 38 vierkante meter groot is
 Formaat: 30 cm.
 Uiterlijk: Bij volwassen vogels is het verenkleed groen, van onderen lichter en geelachtiger. De kruin en het gelaat briljant smaragdgroen, de iris oranje.

2 De *Cyanoramphus Novaehollandiae* (Sparman)

Nederlands: Roodvoorhoofd kakariki
 Engels: Red-Fronted Parakeet
 Duits: Rotstirn Sittich
 Frans: Perruche á Front Rouge
 Verspreiding: Nieuw Zeeland en de eilanden in de omtrek; Norfolk ; Nieuw Caledonië.
 Formaat: 28 cm.
 Uiterlijk: Bij volwassen vogels is het algemeen verenkleed groen, de onderbuik iets lichter. Het voorhoofd, de kruin, de band achter het oog alsmede de vlek aan elke kant van de flank, karmozijnrood. De iris rood en de poten grijsachtig bruin, de snavel bleek blauwachtig grijs en wordt aan de punt donkergrijs.

3: De *C. Cyranurus* (Salvadori)

Nederlands: Kermadec Kakariki.
 Engels: Kermadec Parakeet.
 Duits: Kermadecsittich.
 Frans: Perruche D'Iles Kermadec.
 Verspreiding: Kermadec eilanden.
 Formaat: 29 cm.
 Uiterlijk: Deze ondersoort heeft een meer blauw gekleurde staart

4: De *C. n. Chathamensis* (Oliver.)

Nederlands: Chatham Kakariki.
 Engels: Chatman Parakeet.
 Duits: Chatmansittich.
 Frans: Perruche d'iles Chatman.
 Verspreiding: Chatman eilanden.
 Formaat: 28 cm.
 Uiterlijk: Volwassen vogels lijken op roodvoorhoedkakariki, maar met een helder smaragd groen gelaat

5: De *C.n Erythrotis* (Wagler).

Nederlands: Macquarie Kakariki
 Engels: Macquarie Parakeet
 Duits: Macquarie Sittich
 Frans: Perruche d'ile Macquarie
 Verspreiding: Vroeger kwam deze vogel voor op het eiland Macquarie, maar is vermoedelijk uitgestorven
 Formaat: 30 cm.
 Uiterlijk: Het blauw op de vleugelpennen is bleker groen bespreid

6: De *C. n. Cookii* (G.R.Gray).

Nederlands: Cook Kakariki.
 Engels: Cook's Parakeet.
 Duits: Cook's Sittich.
 Frans: Perruche du Cock.
 Verspreiding: Op het eiland Norfolk
 Formaat: 31 cm
 Uiterlijk: Volwassen vogels zijn groter dan de roodvoorhoedkakariki. voor het overige aan elkaar gelijk

7: De *Cyanoramphus saisseti* (Verreaux & Des Murs).

Nederlands: Nieuw-Caledonische Kakariki.
 Engels: New Caledonia Parakeet
 Duits: Neu Caledonia Sittich.
 Frans: Perruche de la Nouvelle caledonia'.
 Verspreiding: Voorkomend op het vaste land van Nieuw Zeeland.
 Formaat: 26 cm.
 Uiterlijk: Het gelaat en het onderlichaam is geelachtiger dan bij de roodvoorhoedkakariki op de kruin bleker helderrood

8: De *Cyanoramphus auriceps* (Kuhl).

Nederlands: Geelvoorhoofd kakariki.
 Engels: Yellow Fronted Parakeet.
 Duits: Gelbstirn Sittich.
 Frans: Perruche á Front Jaune.
 Verspreiding: Nieuw Zeeland en omliggende eilanden.
 Formaat: 26 cm.
 Uiterlijk: Bij volwassen vogels is het algemeen verenkleed groen, de onderbuik iets lichter. De karmozijnrode voorhoofdband strekt zich uit van oog tot oog. De kruin goudgeel. Een karmozijnrode vlek aan iedere kant van de flank. Snavel blauwachtig grijs, de punt donkergrijs.

9: De *Cyanoramphus malherbi* (Souancé).

Nederlands: Oranjevoorhoofd Kakariki.
 Engels: Orange-Fronted Parakeet.
 Duits: Orangestirn Sittich.
 Frans: Perruche á Front Orange.
 Verspreiding: Het Zuidereiland in Nieuw Zeeland, kan ook voorgekomen zijn op het Noordereiland (Steward).
 Formaat: 20 cm.
 Uiterlijk: Bij volwassen vogels is het algemeen verenkleed groen, alleen van onderen iets bleker. De oranje voorhoofdband wordt naar de ogen toe bleker. De kruin bleek geel. Aan elke kant van de flank een oranje vlek.

10: De *Cyanoramphus Ulietanus* (Gmelin 1788)

Nederlands: Bruine Kakariki
 Algemeen: Uitgestorven

ROODVOORHOOFD KAKARIKI, CYANORAMPHUS NOVAEZELANDIA.

1: ALGEMEEN:

Nederlands:	Roodvoorhoofd kakariki.
Engels:	Red-Fronted Parakeet.
Duits:	Rotstirn Sittich.
Frans:	Perruche á Front Rouge.

.2.Veerstructuur van de roodvoorhoofd kakariki

We gaan ervan uit dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:
Zwart eumelanine.
Psittacine: geel, rood.

De baard van de veer is van het structurele type, dus in het bezit van de blauwstructuur. Deze blauwstructuur, gecombineerd met het geel psittacine in de cortex, geeft de baard zijn groene kleur.
De felste kleuren bevinden zich aan de kop. Daar is de bevedering het meest intensief. In de hoordelen zit meestal zwart eumelanine.

3. FYSIEKE STANDAARD (man en pop):

Formaat:

De lengte van de Roodvoorhoofd kakariki man 28 cm en de pop 26 cm. De staart is de helft van de lengte van de vogel.

Model:

De nek is vrij kort en breed. De ruglijn vormt, van de nek tot aan de punt van de staart, een bijna rechte lijn. De borst is van voren gezien breed. De vleugels worden strak tegen de romp gedragen, zodat van voren gezien geen ruimte zichtbaar is tussen de vleugels en de romp. Van opzij gezien vormt de borst een strakke, gebogen lijn.
De Roodvoorhoofd kakariki heeft een nagenoeg rechte ruglijn. De staart loopt trapsgewijs, waardoor de middelste staartpennen beduidend langer zijn dan de buitenste staartpennen.

Houding:

De Roodvoorhoofd kakariki staat onder een hoek van ongeveer 40° met het horizontaal stevig op zijn poten. Het onderlichaam blijft daarbij los van de zitstok. Angstige of zieke vogels tonen geen houding. De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen. De vleugelpunten raken elkaar net boven de bovenstaartdekveren.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste. De vogel heeft een gezonde en levendige uitdrukking, zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en levendig. De aarsbevedering is rein en gaaf. Als een vogel niet in een goede conditie verkeert, dan komt hij niet voor een hoge puntenwaardering in aanmerking.

Kop:

De kop past qua grootte en breedte bij het lichaam.. Van voren gezien bezit de kop een goede breedte. Nagenoeg in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden van de kop een rond oog. Het ooglid is vrij smal en onbevederd.

Poten:

Het loopbeen is recht en stevig, zonder bevedering en zonder verruwing. De vier tenen aan elke poot, waarvan twee naar voren en twee naar achteren gericht zijn, krommen zich stevig om de zitstok. De voetwortel beentjes zijn erg lang te noemen. De tenen zijn gaaf, zonder verruwingen of vergroeiingen. Elke teen is voorzien van een vrij korte, natuurlijk gebogen nagel, die eenkleurig is.

Snavel:

De snavel past bij het model van de vogel. Bij de snavelinplant van de bovensnavel bevinden zich de neusdoppen van washuid. De bovensnavel is sterk gekromd en naar onderen gericht. De bovensnavel is duidelijk langer dan de ondersnavel. De punt van de bovensnavel steekt ongeveer 4 mm over de ondersnavel.
De ondersnavel sluit goed in de bovensnavel. Hierdoor is de ondersnavel nauwelijks zichtbaar.

Bevedering:

De bevedering is compleet en glanzend en wordt strak gedragen. Van de handpennen zijn er zeven zichtbaar. Van de staartpennen hebben de twee buitenste pennen ongeveer een derde van de lengte van de staart. De staartpennen worden naar binnen toe trapsgewijs langer. De twee middelste staartpennen zijn de langste en steken variërend van minimaal tot ongeveer één cm over de één na langste pennen.

Ringmaat:

Zie vogelindex website NBvV (Cités bijlage A) moeten dus geringd zijn.

[Terug naar index](#)

4. Mutaties bij de roodvoorhoofd kakariki:

In kwekerskringen werden voor de mutaties allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van het geslacht *Cyanoramphus*. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan de mutaties op basis van vererving en veerstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard. Wij zijn er van overtuigd, dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal. We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere parkietensoorten, onder andere grasparkieten, edelparkieten en agaporniden. Wij verwachten dan ook dat de kwekers, na een overgangperiode, algemeen gebruik zullen maken van de voorgestelde benamingen.

[Terug naar index](#)

4.1 VOORKOMENDE MUTATIES.

Type mutatie:	Mutatiernaam:	Wijze van vererving:	Genetisch symbool:
Eumelaninemutaties:	*Lutino*: hier gaat het niet om een SL noch een NSL lutino maar om een pseudo ino of fenocopie. Dit is een combinatie van Cinnamon en Ino.	Geslachtsgebonden recessief.	<i>Zcin abz</i>
	Cinnamon (*).	Geslachtsgebonden recessief.	<i>Z cin</i>
	Fallow: waarschijnlijk gaat het bij de kakariki om een 'bronze' fallow mutatie maar dit zal door onderzoek moeten worden vastgesteld. De fallowfactor is een autosomaal recessieve mutatie. De bronzefallow is een multi-pele allele van het NSL (niet geslachtgebonden) ino- gen (a-locus). Indien men een *lutino* man paart aan een groene pop dan komen hier allemaal cinnamon poppen uit. Doet men de paring *lutino* man maal fallow pop dan is de uitkomst uiterlijk fallow mannen en *lutino* poppen. Bij de diep doorgekleurde *lutino* kakariki ontstaat deze diepe kleur door de mutatie combinatie van dominant bont of recessief bont hierbij in te kweken.	Autosomaal recessief.	<i>abz</i>
	Dominant gezoomd (edged dilute).	Autosomaal onvolledig dominant (of incompleet dominant).	<i>Ed</i>
	Dominant bont.	Autosomaal dominant.	<i>Pi</i>
	Recessief bont.	Autosomaal recessief.	<i>s</i>
	Mottle.	Multifactorieel.	<i>mo</i>
	Gele Zwartoog.	Combinatie van autosomaal onvolledig dominant bont met autosomaal recessief bont	<i>Pi r</i>
Psittacinemutaties:	Turquoise.	Autosomaal recessief.	<i>b^{lq}</i>

De gebruikte symbolen zijn aangepast aan de nieuwste inzichten in de genetica. Voorheen werden voor de geslachtschromosomen de symbolen X en Y gebruikt. Deze symbolen worden gebruikt voor zoogdieren en mensen en voor vogels worden de symbolen Z en W gebruikt, in plaats van X en Y.

[Terug naar index](#)

4.2. Kenmerken van en toelichting bij de mutaties:

<p>SL ino:</p> <p>Genetisch symbool: <i>Z ino</i> Vererft geslachtsgebonden recessief. Bij de SL ino mutatie is de bevedering niet 'leeg', maar er zitten of lege of heel kleine, misvormende matrixen van de pigment granules in de bevedering. Er wordt geen met het blote oog zichtbare eumelanine aangemaakt, maar onder een elektronenmicroscop is het echter wel zichtbaar. Doordat het eumelanine geen of weinig invloed kan uitoefenen, werkt de sponszone niet en wordt er geen interferentie opgewekt, waardoor er geen blauw licht ontstaat. Die vorm van albinisme wordt tyrosinase positief (TYR-pos) genoemd. De tyrosinase activiteit is niet aangetast, er is zelfs en tweeënhalve maal hogere tyrosinase activiteit gevonden dan bij de wildkleur. Men kan enkel de aanwezige psittacine (geel, oranje, rood psittacine), dat niet wordt aangetast, in de bevedering waarnemen. Normaal groene veren worden geel. Blauwe veren worden wit van kleur. De vogels hebben vleeskleurige poten, hoornkleurige snavel en nagels en rode ogen. Het betreft een kwalitatieve eumelanine reductie.</p>
<p>Cinnamon:</p> <p>Genetisch symbool: <i>Z cin</i> Vererft geslachtsgebonden recessief. Cinnamon is een mutatie waarbij, in tegenstelling tot de wildvorm, geen zwart maar bruin eumelanine gevormd wordt. Cinnamon vogels worden geboren met rode ogen, die na enkele dagen donker kleuren. De groene veren kleuren laurierachtig groen. De zwarte veren en pennen worden bruin van kleur. De poten en de nagels hebben een bruine was.</p>
<p>Bronze fallow:</p> <p>Genetisch symbool: <i>a^{bz}</i> Vererft autosomaal recessief. Kwalitatieve reductie van 30-40% eumelanine. Het is het donkere type van fallow. Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige iris. Het is een meervoudige mutatie reeks met NSL ino. Noot: als je een bronzefallow x een palefallow paart krijg je hieruit alleen wildkleuren, die voor beide factoren split zijn. Het is af te raden om deze combinatie op te zetten.</p>
<p>Pale fallow:</p> <p>Genetisch Symbool: <i>pf</i> Vererving: autosomaal recessief. Kwalitatieve reductie van 75-80% eumelanine. Het lichte type van de fallow. Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood, zonder zichtbare iris.</p>
<p>Dominant gezoomd:</p> <p>Symbol: <i>Ed</i> Vererving: autosomaal onvolledig dominant (of incompleet dominant). Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70%, waarbij het ideaal een reductie van 50% is, de variatiebreedte is echter groot. De kleur van de pennen is typisch voor een pastelmotatie, licht bij de schacht, donkerder wordend naar de rand toe. Vooral in de grote dekveren zien we de omzoming het best. Deze is recent ontstaan bij de geelvoorhoofd kakariki, maar er zijn nu nog te weinig gegevens over bekend om hem nu al in deze standaard te doen opnemen.</p>

Dominant bont:

Genetisch symbool: *Pi*

Vererft autosomaal dominant.

Vererft gewoon dominant. Er kan geen duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen enkelfactorig (EF) en dubbelfactorig (DF) dominant bont.

Is een vorm van leucisme.

Bij dominant bont zijn bepaalde huidsegmenten genetisch zodanig veranderd dat de pigmentcellen er zich niet kunnen vestigen of zelfs afsterven. In de bonte veervelden is geen enkele matrix van de pigment granules afgezet in de veer.

Het bont kan variëren van enkele bonte veertjes tot een bijna volledige eumelanine reductie.

Recessief bont:

Genetisch symbool: *s*

Vererft autosomaal recessief.

Is een vorm van leucisme. Hierbij ontbreken in bepaalde huidsectoren de pigmentcellen bijna volledig. Er kan dan ook geen pigment worden aangemaakt. Er ontstaan veervelden zonder eumelanine. De groene veervelden worden geel en de blauwe veervelden worden wit.

Bij recessief bont is er een defect in de distributie van de pigmentcellen vanuit de neurale lijst. Dat is de plaats waar de melanoblasten, de voorlopers van de pigmentcellen, ontstaan.

Bij deze bontvorm kan de afname van het eumelanine tot 95% bedragen.

Gele zwartoog:

Gele zwartoog is een combinatie van Dominant bont en recessief bont mutatie.

Aqua:

Genetisch symbool: *b^{aq}*

Is een allele van *bl*-locus

Vererft autosomaal recessief.

Het aanwezige psittacine is voor ongeveer de helft verdwenen en de reductie is gelijkmatig verdeeld over het volledige verenkleed. De groene veervelden worden zeegroen en de rode veervelden worden flets oranje gekleurd.

Turquoise:

Symbool: *b^{tr}*

Vererving: autosomaal recessief.

Kwantitatieve reductie psittacine tot 75%, multiple allele van de blauwfactor.

Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is wanneer deze reductie ongeveer minimaal 75 % is.

In de praktijk blijkt dat de voorzijde van de vogel sterker reduceert, ongeveer 80%, dan het rug- en vleugeldeuk, ongeveer 60%. Dit geeft een grote variatie in kleur.

De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw, waarbij het psittacine bezit co-dominant is.

De volgorde van dominantie in de vererving is dus: aqua - turquoise - blauw.

Blauw:

Genetisch symbool: *bl*

Vererft autosomaal recessief.

Bij blauw is het psittacine volledig uit de bevedering verdwenen. De veervelden, die normaal groen zijn, kleuren nu blauw. De rode, oranje en gele veervelden worden wit van kleur.

4.3. Mutatiecombinaties

Welke combinaties van mutaties zijn toegestaan op de tentoonstellingen?

- Combinaties van opaline met eumelanine-, psittacinemutaties en mutaties van de veerstructuur.
- Combinaties van psittacinemutaties met eumelaninemutaties en mutaties van de veerstructuur.
- Combinaties van eumelaninemutaties met mutaties van de veerstructuur.

Welke combinaties van mutaties worden niet gevraagd op de tentoonstellingen?

- Combinaties tussen eumelaninemutaties.
- Combinaties tussen psittacinemutaties.
- Combinaties tussen allelen van hetzelfde gen (bijvoorbeeld combinatie van SL ino met pallid).
- Bij combinaties van mutaties van de veerstructuur wordt de combinatie van de donkerfactor met de violetfactor enkel in de combinatie blauw met één donkerfactor en één of twee violetfactoren gevraagd.

[Terug naar index](#)

Mutaties aanwezig bij de roodvoorhoofd kakariki:

Eumelaninemutaties:	Psittacinemutaties:
SL ino.	Aqua.
Cinnamon.	Turquoise.
Fallow.	Blauw (toekomst).
Dominant bont.	
Recessief bont.	
Gele zwartoog.	

Bij de beschrijving van de mutaties beperken we ons tot de combinaties die het duidelijkst zijn en of tot combinaties, waarvan er al voldoende zijn gekweekt en er eensgezindheid bestaat over hoe deze kleurmutatiecombinaties er uit zien.

In de standaard zijn geen gedetailleerde beschrijvingen van de volgende mutaties en mutatiecombinaties van de Roodvoorhoofdkakariki:

De tekeningonderdelen van de roodvoorhoofd kakariki:

Bij de roodvoorhoofdkakariki worden de volgende tekeningonderdelen onderscheiden:

Voorhoofd:	Het voorhoofd en de kruin, via de teugel tot aan het oog, dit is bij de wildkleur een karmozijn rode tekening
Oogtekening:	Achter het oog een omgekeerd driehoekje, doorlopend tot aan het oog. Dit is bij de wildkleur rood
Flanken:	Groen, aan weerszijden van de flank bevindt zich bij de wildkleur een karmozijn rode vlek.
Duimveertjes:	De duimveertjes zijn bij de wildkleur violetblauw

[Terug naar index](#)

6. BESCHRIJVING VAN WILDKLEUR, PRIMAIRE MUTATIES EN MUTATIECOMBINATIES BIJ DE ROODVOORHOOFD KAKARIKI:

Wildkleur en primaire mutaties – Roodvoorhoofd kakariki:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur/mutatie:	Groen:	Aqua:	Turquoise:
Kleur:			
Hals, wangen en achterschedel:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Borst:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Buik:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Broek:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Aarsstreek:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Mantel:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Middelste staartpennen:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw.
Overige staartpennen:	Groen.	Zeegroen.	Iets lichter blauw dan het lichaam.
Onderstaartdekveren:	Iets lichter groen dan het lichaam.	Iets lichter zeegroen dan het lichaam.	Iets lichter turquoise dan het lichaam.
Bovenstaartdekveren:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.
Ogen:	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Oogtekening:	Rood	Roze	Lichtroze
Flanken:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Duimveertjes:	Violet blauw	Violet blauw	Violet blauw
Buitenvlag vleugelpennen:	Violet blauw	Violet blauw	Violet blauw

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij wildkleur en primaire mutaties – Roodvoorhoofd kakariki:

<p>Groen Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs. De nagels behoren donkergrijs tot zwart te zijn, bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje, is de tekening die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit zit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>Aqua, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Kleur:Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is bleek staal blauw uitlopend naar een iets donkerder punt. Ondersnavel gelijke kleur als de punt van de bovensnavel. De nagels behoren donkergrijs tot zwart te zijn, bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld. Tevens moet er rekening gehouden worden dat de aqua mutatie het psittacine met 50% reduceert, wat ervoor zorgt, dat de lichaamskleur zeegroen wordt.</p> <p>Tekening:Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje, is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rozerode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is. Tevens moet er rekening gehouden worden dat de aqua mutatie het psittacine met 50% reduceert, wat ervoor zorgt dat deze tekening diep roze wordt.</p>
<p>Turquoise, Man en pop:</p>	<p>Algemeen:</p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is bleek staal blauw uitlopend naar een grijs zwarte punt. De ondersnavel is donkergrijs. De nagels behoren donkergrijs tot zwart te zijn, bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld. Tevens moet er rekening gehouden worden dat de turquoise mutatie het psittacine met 80% reduceert, wat ervoor zorgt dat de lichaamskleur licht blauw wordt met een groene waas.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje, is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een licht roze vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is. Tevens moet er rekening gehouden worden dat de turquoise mutatie het psittacine met 80% reduceert, wat ervoor zorgt dat deze tekening licht roze wordt.</p>

[Terug naar index](#)

Primaire mutaties en mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki SL ino serie:

Kleur/mutatie:	Man/Pop: SL ino: (lutino)	Man/Pop: SL ino aqua:	Man/Pop: SL ino turquoise:
Kleur:			
Hals, wangen en achterschedel:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Borst:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Buik:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Broek:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Aarsstreek:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Mantel:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Middelste staartpennen:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Overige staartpennen:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Onderstaartdekveren:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Zacht geel.	Wit, met gele waas.
Snavel:	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Rood.	Rood.	Rood.
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood	Diep roze.	
Oogtekening:	Karmozijn rood	Diep roze	Lichtroze
Flanken:	Karmozijn rood	Diep roze.	Lichtroze.
Duimveertjes:	Violet blauw	Wit	Wit
Buitenvlag vleugelpennen:	Violet blauw	Wit	Wit

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij primaire mutaties en mutatie combinaties – Roodvoorhoofd kakariki:

<p>SL ino groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop in verhouding tot de overige lichaamsproporties moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Bruine of groene aanslag moet worden bestraft.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>SL ino aqua</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Bruine of zeegroene aanslag moet worden bestraft.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit een diep roze vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>SL ino turquoise</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Bruine of blauwe aanslag moet worden bestraft.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit een licht roze vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>

[Terug naar index](#)

Mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki Cinnamon serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur/mutatie:	Cinnamon groen:	Cinnamon aqua:	Cinnamon turquoise:
Kleur:			
Hals, wangen en achterschedel:	Bleek bruinachtig groen.	Zeegroen, met bruine waas.	Lichtblauw, met bruine minieme groene waas.
Borst:	Bruinachtig groen.	Zeegroen, met bruine waas.	Lichtblauw, met bruine minieme groene waas.
Buik:	Bruinachtig groen.	Zeegroen, met bruine waas.	Lichtblauw, met bruine minieme groene waas.
Broek:	Bruinachtig groen.	Zeegroen, met bruine waas.	Lichtblauw, met bruine minieme groene waas.
Aarsstreek:	Bruinachtig groen.	Zeegroen, met bruine waas.	Lichtblauw, met bruine minieme groene waas.
Mantel:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Middelste staartpennen:	Groen.	Zeegroen, met bruin waas.	Lichtblauw, met bruine waas.
Overige staartpennen:	Bruinachtig groen.	Zeegroen, met bruine waas.	Lichtblauw, met bruine waas.
Onderstaartdekveren:	Iets lichter bruinachtig groen dan het lichaam.	Iets lichter bruinachtig zeegroen dan het lichaam.	Iets lichter bruinachtig lichtblauw dan het lichaam.
Bovenstaartdekveren:	Bruinachtig groen.	Zeegroen, met bruine waas.	Lichtblauw, met bruine waas.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een iets donkerder punt. Ondersnavel gelijke kleur als de punt van de bovensnavel.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een iets donkerder punt. Ondersnavel gelijke kleur als de punt van de bovensnavel.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een iets donkerder punt. Ondersnavel gelijke kleur als de punt van de bovensnavel.
Poten:	Bruin hoornkleurig.	Bruin hoornkleurig.	Bruin hoornkleurig.
Nagels:	Nagenoeg bruin/zwart.	Nagenoeg bruin/zwart.	Nagenoeg bruin/zwart.
Ogen:	Lichtblauw	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood	Diep roze.	Licht roze
Oogtekening:	Karmozijn rood	Diep roze	Licht roze
Flanken:	Karmozijn rood	Diep roze.	Licht roze
Duimveertjes:	Violet blauw	Violetblauw	Violet blauw
Buitenvlag vleugelpennen:	Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki

<p>Cinnamon groen, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is bleek staal blauw, uitlopend naar een iets donkerder punt. De kleur van de ondersnavel is gelijk aan de kleur van de punt van de bovensnavel.. De nagels behoren grijs/zwart te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is . Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>Cinnamon aqua, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: <i>Zie cinnamon groen.</i></p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is bleek staal blauw uitlopend naar een iets donkerder punt. De kleur van de ondersnavel is gelijk aan de kleur van de punt van de bovensnavel.. De nagels behoren bruin/zwart te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is . Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit een diep roze vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>Cinnamon turquoise, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: <i>Zie cinnamon groen.</i></p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is bleek staal blauw uitlopend naar een iets donkerder punt. De kleur van de ondersnavel is gelijk aan de kleur van de punt van de bovensnavel. De nagels behoren bruin/zwart te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een licht roze vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>

Mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur/mutatie:	Fallow groen:	Fallow aqua	Fallow turquoise
Kleur:		Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Hals, wangen en achterschedel:	Groen, met een bleek bruinachtig waas.	Zeegroen met een bleek bruinachtig waas	Lichtblauw, met minieme bleek bruinachtig groene waas.
Borst:	Olijfgroen, met een bruinachtig waas.	Zeegroen, met een bruinachtig waas.	Lichtblauw, met minieme bruinachtig groene waas.
Buik:	Olijfgroen, met een bruinachtig waas.	Zeegroen, met een bruinachtig waas.	Lichtblauw, met minieme bruinachtig groene waas.
Broek:	Olijfgroen, met een bruinachtig waas.	Zeegroen, met een bruinachtig waas.	Lichtblauw, met minieme bruinachtig groene waas.
Aarsstreek:	Olijfgroen, met een bruinachtig waas.	Zeegroen, met een bruinachtig waas.	Lichtblauw, met minieme bruinachtig groene waas.
Mantel:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Middelste staartpennen:	Groen.	Zeegroen, met een bruinachtig waas.	Lichtblauw.
Overige staartpennen:	Bruinachtig groen.	Zeegroen, met een bruinachtig waas.	Iets lichter blauw dan het lichaam.
Onderstaartdekveren:	Iets lichter bruinachtig groen dan het lichaam.	Iets lichter zeegroen dan het lichaam.	Iets lichter turquoise dan het lichaam.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.
Ogen:	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Oogtekening:	Rood	Roze	Lichtroze
Flanken:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Buitenvlag vleugelpennen:	Violet blauw	Violet blauw	Violet blauw

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki

<p>Fallow groen</p> <p>Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is rood. De nagels behoren bruin/ zwart te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>Fallow aqua:</p>	<p>Algemeen: Zie fallow groen.</p> <p>Kleur: Gelet dient te worden op de bleek bruinachtige waas over de zeegroen lichaamskleur. Dit mag niet te donker van kleur worden om verwarring met de cinnamon factor te verkrijgen.</p>
<p>Fallow turquoise:</p>	<p>Algemeen: Zie fallow groen.</p> <p>Kleur: Gelet dient te worden op de bleek bruinachtige waas over de lichtblauwe lichaamskleur. Dit mag niet te donker van kleur worden om verwarring met de cinnamon factor te verkrijgen.</p>

[Terug naar index](#)

Roodvoorhoofd kakariki gezoomd serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur/mutatie:	Gezoomd groen	Gezoomd aqua	Gezoomd turquoise
Kleur:	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Hals, wangen en achterschedel:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Borst:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Buik:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Broek:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Aarsstreek:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Mantel:	Groen, de schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Zeegroen, de schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.	Lichtblauw, met minieme groene waas, de schacht is grijszwart en de kern van de veer is opgebleekt, waardoor een zoomeffect ontstaat.
Middelste staartpennen:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw.
Overige staartpennen:	Groen.	Zeegroen.	iets lichter blauw dan het lichaam.
Onderstaartdekveren:	iets lichter groen dan het lichaam.	iets lichter zeegroen dan het lichaam.	iets lichter turquoise dan het lichaam.
Bovenstaartdekveren:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.
Ogen:	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Oogtekening:	Rood	Roze	Lichtroze
Flanken:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Buitenvlag vleugelpennen:	Violet blauw	Violet blauw	Violet blauw

[Terug naar index](#)

KEUR TECHNISCHE AANWIJZINGEN GEZOOMD SERIE

<p>Gezoomd groen:</p>	<p>Algemeen: Zie fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Groen. Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet egaal van kleur zijn, de voorkeur gaat uit naar de vogel die de scherpste omzoming laat zien op het rugdek..</p> <p>Tekening: Bij de beste exemplaren bleekt de kern van de veren op het vleugeldek op met ongeveer 40% tot 50%. Doordat de rand van de veer bijna de volledige groene kleur behoudt, ontstaat hierdoor het zogenaamde zoompatroon. Het verschil tussen een gezoomde en een pastel is dat de pastel geheel grijze slagpennen heeft en een gezoomde grijszwart met een opgebleekte kern heeft.</p>
<p>Gezoomd aqua:</p>	<p>Algemeen: Zie fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Zeegroen Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet egaal van kleur zijn, de voorkeur gaat uit naar de vogel die de scherpste omzoming laat zien op het rugdek..</p> <p>Zie verder groen.</p>
<p>Gezoomd turquoise:</p>	<p>Algemeen: Zie fysieke standaard.</p> <p>Kleur: Turquoise Van de lichaamskleur mogen we een egale kleur eisen. Het vleugeldek kan uiteraard door de zoomtekening niet egaal van kleur zijn, de voorkeur gaat uit naar de vogel die de scherpste omzoming laat zien op het rugdek..</p> <p>Zie verder groen.</p>

[Terug naar index](#)

Recessief bont serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur/mutatie:	Recessief bont groen:	Recessief bont aqua:	Recessief bont Turquoise:
Kleur:		Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Hals, wangen en achterschedel:	Groen, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door regelmatige licht gele veervelden.
Borst:	Groen, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door regelmatige licht gele veervelden.
Buik:	Groen, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door regelmatige licht gele veervelden..
Broek:	Groen, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door regelmatige licht gele veervelden..
Aarsstreek:	Groen, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door regelmatige licht gele veervelden..
Mantel:	Groen, onderbroken door onregelmatige gele veervelden en een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam onderbroken door onregelmatige gele veervelden en een nuance donkerder dan de rest van het lichaam..	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam onderbroken door onregelmatige licht gele veervelden en een nuance donkerder dan de rest van het lichaam..
Middelste staartpennen:	Geel.	Zeegroen onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Lichtblauw onderbroken door regelmatige gele veervelden..
Overige staartpennen:	Geel.	Zeegroen onderbroken door regelmatige gele veervelden.	lets lichter blauw dan het lichaam onderbroken door regelmatige licht gele veervelden..
Onderstaartdekveren:	lets lichter geel dan het lichaam	lets lichter zeegroen dan het lichaam.	lets lichter turquoise dan het lichaam.
Bovenstaartdekveren:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.
Ogen:	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.
Bovenstaartdekveren:	Groen.	Zeegroen.	Lichtblauw, met minieme groene waas.
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Oogtekening:	Karmozijn rood.	Roze	Lichtroze
Flanken:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Buitenvlag vleugelpennen:	Violet blauw	Violet blauw	Violet blauw

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki

<p>Recessief bont:</p>	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: In tegenstelling tot de dominant bonten hebben de recessief bonten een vaster en gelijkmatiger bontpatroon. Net als bij de dominant bonten is het bontpatroon variabel, maar altijd boven de 50%. Het grootste gedeelte van de lichaamsbevedering is dan ook geel. De slagpennen van de recessief bonten zijn vrijwel altijd pigment loos en gelijk van kleur. Er zijn recessief bonten met een geheel effen gele lichaamsbevedering. De oogkleur is donker, doch variabel van tint, dit afhankelijk van het bontpercentage. Bonte nagels zijn toegestaan maar de voorkeur gaat uit naar egaal gekleurde hoormdelen en pootkleur.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is. De slagpennen van de recessief bonten zijn vrijwel altijd pigment loos en gelijk van kleur.</p>
-------------------------------	--

[Terug naar index](#)

Dominant bont serie:

	Man/Pop:	Man/Pop:	
Kleur/mutatie:	Dominant bont groen:	Dominant bont aqua:	Dominant bont turquoise:
Kleur:		Herkenning omschrijving	Herkenning omschrijving
Hals, wangen en achterschedel:	Op de achterschedel bevindt zich een variabele gele vlek, menigmaal in de vorm van een op de kop staande hoofdletter T. De kleur van de wangen is gelijk aan de schedeldekkeur.	Op de achterschedel bevindt zich een variabele gele vlek, menigmaal in de vorm van een op de kop staande hoofdletter T. De kleur van de wangen is gelijk aan de schedeldekkeur.	Op de achterschedel bevindt zich een variabele lichtgele vlek, menigmaal in de vorm van een op de kop staande hoofdletter T. De kleur van de wangen is gelijk aan de schedeldekkeur.
Borst:	Groen onderbroken door onregelmatige gele veervelden .	Zeegroen onderbroken door onregelmatige gele veervelden..	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door onregelmatige gele veervelden.
Buik:	Groen, onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door onregelmatige gele veervelden.
Broek:	Groen, onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door onregelmatige gele veervelden.
Aarsstreek:	Groen, onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Zeegroen onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Lichtblauw, met minieme groene waas onderbroken door onregelmatige gele veervelden.
Mantel:	Groen, onderbroken door onregelmatige gele veervelden en een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam onderbroken door onregelmatige licht gele veervelden.
Middelste staartpennen:	Groen.	Zeegroen onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	Lichtblauw.
Overige staartpennen:	Groen.	Zeegroen onderbroken door onregelmatige gele veervelden.	iets lichter blauw dan het lichaam.
Onderstaartdekveren:	iets lichter groen dan het lichaam.	iets lichter zeegroen dan het lichaam.	iets lichter turquoise dan het lichaam.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijs.	Grijs.
Nagels:	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.	Donkergrijs tot zwart.
Ogen:	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.	Zwart, met rode iris.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Oogtekening:	Karmozijn rood.	Roze	Lichtroze
Flanken:	Karmozijn rood.	Diep roze	Lichtroze.
Buitenvlag vleugelpennen:	Violet blauw	Violet blauw	Violet blauw

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont serie:

Dominant bont:	<p>Algemeen: Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Algemene lichaamskleur is groen onderbroken door onregelmatige gele veervelden, vooral op de bef, rondom en tussen de inplant van de poten, meestal ook met één of verschillende geel getinte handpennen en staartveren. Het bont patroon is zeer variabel, maar zelden meer dan 50 % van het geheel. Bonte nagels zijn toegestaan maar de voorkeur gaat uit naar egaal gekleurde hoorndelen en pootkleur.</p> <p>Tekening: Op de achterschedel bevindt zich een variabele gele vlek, menigmaal in de vorm van een op de kop staande hoofdletter T. Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
-----------------------	---

[Terug naar index](#)

Mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur/mutatie:	DEC groen:	DEC aqua:	DEC turquoise
Kleur:	Gele zwartoog:	Herkenning omschrijving	
Hals, wangen en achterschedel:	Geel.	Lichtgeel.	Lichtgeel.
Borst:	Geel.	Lichtgeel.	Lichtgeel.
Buik:	Geel.	Lichtgeel.	Lichtgeel.
Broek:	Geel.	Lichtgeel.	Lichtgeel.
Aarsstreek:	Geel.	Lichtgeel.	Lichtgeel.
Mantel:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Middelste staartpennen:	Geel.	Lichtgeel.	Lichtgeel.
Overige staartpennen:	Geel.	Lichtgeel.	Lichtgeel.
Onderstaartdekveren:	Iets lichter geel dan het lichaam.	Iets lichter dan het lichaam.	Iets lichter dan het lichaam.
Snavel:	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Rood, met zwarte pupil.	Rood, met zwarte pupil.	Rood, met zwarte pupil..
Tekening:			
Voorhoofd:	Karmozijn rood.	Diep roze	Licht roze
Oogtekening:	Karmozijn rood.	Roze	Licht roze
Flanken:	Karmozijn rood.	Roze	Licht roze
Buitenvlag vleugelpennen:	Wit	Wit	Wit

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij mutatiecombinaties – Roodvoorhoofd kakariki

<p>DEC groen: (Gele zwartoog)</p>	<p>Algemeen: DEC groen is een combinatie van Dominant bont en Recessief bont Man 28 cm, pop 26 cm, gemeten tussen de kruin en het uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst. De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Bruine of groene aanslag moet worden bestraft. Hoorndelen en poten dienen eenkleurig te zijn en vrij van bont.</p> <p>Tekening: Het voorhoofd en de voorkruin en achter het oog een omgekeerd driehoekje is de tekening, die zichtbaar is. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>Dec Aqua</p>	<p>Algemeen: DEC aqua is een combinatie van Dominant bont en Recessief bont en aqua.</p> <p>Zie verder DEC groen.</p>
<p>DEC turquoise</p>	<p>Algemeen: DEC turquoise is een combinatie van Dominant bont en Recessief bont.</p> <p>Zie verder DEC groen.</p>

[Terug naar index](#)

GEELVOORHOOFD KAKARIKI, *CYANORAMPHUS AURICEPS FORBESI*

1: ALGEMEEN:

Nederlands:	Geelvoorhoofd kakariki.
Engels:	Yellow Fronted Parakeet.
Duits:	Gelbstirn Sittich.
Frans:	Kakariki à front jaune.

De Kakariki komt voor in Nieuw-Zeeland en de bijliggende eilanden. Het zijn middel grote parkieten. Het formaat van de man is ong. 2 cm groter dan van de pop. De man en pop verschillen niet van kleur en tekening. Wel is bij de man de snavel bij de snavelinplant wat breder en forser dan bij de pop De voetwortel beentjes zijn erg lang te noemen.

De soorten van het geslacht *Kakariki* zijn populair bij de kwekers en worden dan ook veel gehouden. De Kakariki leeft in hoofdzaak van gras- en onkruidzaden.

De voeding in gevangenschap bestaat uit een zaadmengsel voor grote parkieten. Hiernaast wordt elke dag een mengsel van kiemzaad en eivoer verstrekt. De verhouding tussen het zaad en kiemzaad /eivoer-mengsel is een op een. Scherpe maagkieszel en oesterschelpengrit mogen niet ontbreken. Als nestgelegenheid wordt een nestblok verstrekt met de volgende afmetingen: 40 cm hoog, een bodemoppervlak van 15 x 15 cm en een invlieggat van 6 cm doorsnee. Als nestmateriaal kan rottend hout, houtspaanders of zaagsel dat vermengd wordt met (onbemeste) potgrond, bos humus of turf (laagdikte circa acht cm). Met de Kakariki kan vrij gemakkelijk worden gekweekt en het zijn zeer makke vogels. Als ze aan meelwormen gewend zijn komen ze uit je hand eten. Na 8 maanden zijn ze al geslachtsrijp. In Europa wordt alleen maar gekweekt met de Roodvoorhoofdkakariki en Geelvoorhoof Kakariki

2. VEERSTRUCTUUR VAN DE GEELVOORHOOFD KAKARIKI:

We gaan ervan uit dat zich in de bevedering de volgende kleurstoffen bevinden:

- zwart eumelanine.
- psittacine: geel, rood.

De baard van de veer is van het structurele type, dus in het bezit van de blauwstructuur. Deze blauwstructuur, gecombineerd met het geel psittacine in de cortex, geeft de baard zijn groene kleur.

De felste kleuren bevinden zich aan de kop. Daar is de bevedering het meest intensief.

In de hoorndelen zit meestal zwart eumelanine.

3. FYSIEKE STANDAARD

GEELVOORHOOFD KAKARIKI (man en pop).

Formaat:

De lengte van de geelvoorhoofd kakariki man is 26 cm en de pop 24 cm. De staart is de helft van de lengte van de vogel.

Model:

Het model van de geelvoorhoofd kakariki is veel slanker dan dat van de roodvoorhoofd kakariki. De ruglijn vormt van de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn. De vleugels worden strak tegen de romp gedragen, zodat van voren gezien geen ruimte zichtbaar is tussen de vleugels en de romp.

Van opzij gezien vormt de borst een strakke, gebogen lijn.

De geelvoorhoofd kakariki heeft een nagenoeg rechte ruglijn. De staart loopt trapsgewijs, waardoor de middelste staartpennen beduidend langer zijn dan de buitenste staartpennen.

Houding:

De geelvoorhoofd kakariki staat onder een hoek van ongeveer 40° met het horizontaal stevig op zijn poten. Het onderlichaam blijft daarbij los van de zitstok. Angstige of zieke vogels tonen geen houding.

De vleugels worden strak langs het lichaam gedragen. De vleugelpunten raken elkaar net boven de bovenstaartdekveren.

Conditie:

Een goede conditie is een eerste vereiste. De vogel heeft een gezonde en levendige uitdrukking, zonder verminkingen of andere gebreken. Het oog is helder en levendig. De aarsbevedering is rein en gaaf. Als een vogel niet in een goede conditie verkeert dan komt hij niet voor een hoge puntenwaardering in aanmerking.

Kop:

De kop past qua grootte en breedte bij het lichaam. Van voren gezien bezit de kop een goede breedte. Nagenoeg in het centrum van de kop bevindt zich aan weerszijden van de kop een rond oog. Het ooglid is vrij smal en onbevederd.

Poten:

Het loopbeen is recht en stevig, zonder bevedering en zonder verruwing. De vier tenen aan elke poot, waarvan twee naar voren en twee naar achteren gericht zijn, krommen zich stevig om de zitstok. De voetwortel beentjes zijn erg lang te noemen De tenen zijn gaaf, zonder verruwingen of vergroeiingen.

Elke teen is voorzien van een vrij korte, natuurlijk gebogen nagel, die eenkleurig is.

[Terug naar index](#)

Snavel:

De snavel past bij het model van de vogel. Bij de snavelinplant van de bovensnavel bevinden zich de neusdoppen van washuid. De bovensnavel is sterk gekromd en naar onderen gericht. De bovensnavel is duidelijk langer dan de ondersnavel. De punt van de bovensnavel steekt ongeveer 4 mm over de ondersnavel.

De ondersnavel sluit goed in de bovensnavel. Hierdoor is de ondersnavel nauwelijks zichtbaar.

Bevedering:

De bevedering is compleet en glanzend en wordt strak gedragen. Van de handpennen zijn er zeven zichtbaar. Van de staartpennen hebben de twee buitenste pennen ongeveer een derde van de lengte van de staart. De staartpennen worden naar binnen toe trapsgewijs langer. De twee middelste staartpennen zijn de langste en steken variërend van minimaal tot ongeveer één cm over de één na langste pennen.

Ringmaat:

Zie [gelingindex website NBvV \(Cités bijlage A \)](#) moeten dus geringd zijn.

4. Mutaties bij de Geelvoorhoofd kakariki:

In kwekerskringen werden voor de mutaties allerlei fantasie benamingen gebruikt op basis van bepaalde uiterlijke kenmerken van het geslacht Cyanoramphus. In deze standaard is er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan de mutaties op basis van vererving en veerstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard. Wij zijn er van overtuigd, dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal. We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere parkietensoorten, onder andere grasparkieten, edelparkieten en agaporniden.

4.1. Kenmerken van en toelichting bij de mutaties:

Hierbij wordt verwezen naar de roodvoorhoofd kakariki.

4.2. Mutatiecombinaties:

Welke combinaties van mutaties zijn toegestaan op de tentoonstellingen?

- Combinaties van **opaline** met eumelanine-, psittacine mutaties en mutaties van de veerstructuur.
- Combinaties van **psittacine mutaties** met eumelanine mutaties en mutaties van de veerstructuur.
- Combinaties van **eumelanine mutaties** met mutaties van de veerstructuur.

Welke combinaties van mutaties worden niet gevraagd op de tentoonstellingen?

- Combinaties **tussen eumelanine mutaties.**
- Combinaties **tussen psittacine mutaties.**
- Combinaties tussen **allelen van hetzelfde gen** (bijvoorbeeld combinatie van SL ino met pallid).

Mutaties aanwezig bij de Geelvoorhoofd kakariki:

Eumelaninemutaties:	Psittacinemutaties:	Veerstructuurmutaties:
SL ino.	Aqua	Donkerfactor (toekomst).
Pallid.	Turquoise	Violet (toekomst).
Cinnamon.	Blauw (toekomst).	
Dominant bont.		
Recessief bont.		
DEC groen		
Fallow		

Bij de beschrijving van de mutaties beperken we ons tot de combinaties die het duidelijkst zijn en of tot combinaties waarvan er al voldoende zijn gekweekt en er eensgezindheid bestaat over hoe deze kleurmutatie combinaties er uit zien.

In de standaard zijn geen gedetailleerde beschrijving van de volgende mutaties en mutatiecombinaties van Geelvoorhoofdkakariki:

- Blauw.
- Donkerfactor en combinaties met donkerfactor.
- EF en DF violet en combinatie met enkele donkerfactor.

5 De tekeningonderdelen van de Geelvoorhoofd kakariki:

Bij de geelvoorhoofdkakariki worden de volgende tekeningonderdelen onderscheiden:

Voorhoofd:	Boven de snavel inplant loopt van oog tot oog een rood bandje, scherp afgetekend en ongeveer 0,5 cm breed. Achter dit bandje tot iets achter het midden van de schedel is dit geel.
Flanken:	Groen, aan weerszijden van de flank bevindt zich een karmozijn rode vlek.
Duimveertjes:	De duimveertjes zijn bij de wildkleur violetblauw
Vleugelpennen:	Buitenste vleugelpennen violetblauwe buitenvlag.

[Terug naar index](#)

6. Beschrijving van wildkleur, primaire mutaties EN MUTATIECOMBINATIES BIJ DE GEELVOORHOOFD KAKARIKI:

	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:	Man/Pop:
Kleur/mutatie:	Groen:	Cinnamon groen:	Fallow groen:	SL ino groen:	Dominant bont:
Kleur:					
Hals en wangen en achterschedel:	Groen, iets geel bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Geel.	Groen, iets geel bewaasd.
Borst:	Groen, iets geel bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Geel.	Groen, iets geel bewaasd.
Buik:	Groen, iets geel bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Geel.	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door onregelmatige gele veervelden.
Broek:	Groen, iets geel bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Geel.	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door onregelmatige gele veervelden.
Aarsstreek:	Groen, iets geel bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Groen, iets gelig en bruin bewaasd.	Geel.	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door gele veervelden.
Mantel:	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Groen, onderbroken door gele veervelden en een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Middelste staartpennen:	Groen.	Groen, met bruine waas.	Groen, met bruine waas.	Geel.	Groen.
Overige staartpennen:	Groen.	Groen, met bruine waas.	Groen, met bruine waas.	Geel.	Groen.
Onderstaartdekveren:	iets lichter geelachtig groen dan het lichaam.	iets lichter groen dan het lichaam, met bruine waas.	iets lichter groen dan het lichaam, met bruine waas.	iets lichter geel dan het lichaam.	iets lichter groen dan het lichaam.
Bovenstaartdekveren:	Groen, uiteinde blauw bewaasd.	Groen, met bruine waas, uiteinde blauw bewaasd.	Groen, met bruine waas, uiteinde blauw bewaasd.	Geel, uiteinde wit bewaasd.	Groen, uiteinde blauw bewaasd.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.
Poten:	Grijs.	Grijsbruin.	Grijsbruin.	Vleeskleurig.	Grijs.
Nagels:	Nagenoeg zwart.	Nagenoeg bruin/zwart.	Nagenoeg bruin/zwart.	Hoornkleurig.	Donkergrijs tot zwart.
Ogen:	Oranjerood, met zwarte pupil.	Oranjerood, met zwarte pupil.	Rood.	Rood.	Oranjerood, met zwarte pupil.
Tekening:					
Voorhoofd:	Smalle karmozijn rode voorhoofdsband met daarachter gele schedel.	Smalle rode voorhoofdsband met daarachter gele schedel.	Smalle rode voorhoofdsband met daarachter gele schedel.	Smalle rode voorhoofdsband met daarachter gele schedel.	Smalle rode voorhoofdsband met daarachter gele schedel.
Flanken:	Karmozijn rood.	Karmozijn rood.	Karmozijn rood.	Karmozijn rood.	Karmozijn rood.
Duimveertjes:	Violetblauw	Violetblauw	Violetblauw	Wit	Violetblauw
Buitenvlag vleugelpennen:	Violetblauw.	Violetblauw.	Violetblauw.	Wit	Violetblauw.

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij wildkleur en primaire mutaties – Geelvoorhoofd kakariki:

<p>Groen, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 26 cm, pop 24 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst, De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is grijs, uitlopend naar een donkergrijze punt. De nagels behoren donkergrijs tot zwart te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: De voorhoofdband strekt zich uit van oog tot oog en is donker karmijnrood. De kruin is geel. Sommige exemplaren laten achter het oog een minimaal geel driehoekje zien, hier moeten we soepel mee omgaan. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>Cinnamon groen, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 26 cm, pop 24 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst, De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is grijs, uitlopend naar een donkergrijze punt. De nagels behoren bruin/ zwart te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: De voorhoofdband strekt zich uit van oog tot oog en is donker karmijnrood. De kruin is geel. Sommige exemplaren laten achter het oog een minimaal geel driehoekje zien, hier moeten we soepel mee omgaan. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>

[Terug naar index](#)

<p>Fallow groen, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 26 cm, pop 24 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst, De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Zowel bij de man als de pop is een regelmatig voorkomende fout een storende onregelmatige zwarte kleur op de vleugels. De snavel is grijs, uitlopend naar een donkergrijze punt. De nagels behoren donkergrijs tot zwart te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Dit wordt in de rubriek kleur beoordeeld.</p> <p>Tekening: De voorhoofdband strekt zich uit van oog tot oog en is donker karmijnrood. De kruin is geel. Sommige exemplaren laten achter het oog een minimaal geel driehoekje zien, hier moeten we soepel mee omgaan. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>SL ino (lutino), Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 26 cm, pop 24 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst, De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Bruine of groene aanslag moet worden bestraft.</p> <p>Tekening: De voorhoofdband strekt zich uit van oog tot oog en is donker karmijnrood. wat overgaat in de nek- en algemene lichaamskleur. Sommige laten achter het oog een minimaal okergeel driehoekje zien, hier moeten we soepel mee omgaan. Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>Dominant bont groen, Man en pop:</p>	<p>Algemeen: Man 26 cm, pop 24 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst, De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: Algemene lichaamskleur is groen onderbroken door onregelmatige gele veervelden, vooral op de bef, rondom en tussen de inplant van de poten, meestal ook met één of verschillende geel getinte handpennen en staartveren. Het bont patroon is zeer variabel, maar zelden meer dan 50 % van het geheel.</p> <p>Tekening: De voorhoofdband strekt zich uit van oog tot oog en is donker karmijnrood. De kruin is geel. Sommige laten achter het oog een minimaal geel driehoekje zien, hier moeten we soepel mee omgaan.. Op de flanken is ook nog tekeningaanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>

Primaire mutaties – Geelvoorhoofdkaariki.

Kleur/mutatie:	Man/Pop: Recessief bont:	Man/Pop: DEC groen:	Man/Pop: DEC turquoise:
Kleur:		Gele zwartoog:	Herkenning omschrijving
Hals en wangen en achterschedel:	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Borst:	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Buik:	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Broek:	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Aarsstreek:	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door regelmatige gele veervelden.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Mantel:	Groen, iets geel bewaasd, onderbroken door onregelmatige gele veervelden en een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.	Geel.	Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Middelste staartpennen:	Geel.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Overige staartpennen:	Geel.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Onderstaartdekveren:	Iets lichter geel dan het lichaam.	Iets lichter geel dan het lichaam.	Wit, met lichtgele waas.
Bovenstaartdekveren:	Geel.	Geel.	Wit, met lichtgele waas.
Snavel:	Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs.	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.	Lichte basiskleur, overgaand naar hoornkleurig.
Poten:	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
Nagels:	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
Ogen:	Rood, met zwarte pupil.	Rood, met zwarte pupil.	Rood, met zwarte pupil.
Tekening:			
Voorhoofd:	Smalle karmozijn rode voorhoofdsband met daarachter gele schedel.	Rood,	Oranje
Flanken:	Karmozijn rood.	Karmozijn rood.	Licht geel
Buitenvlag vleugelpennen:	Violetblauw.	Wit.	Licht geel

[Terug naar index](#)

Keurtechnische aanwijzingen bij wildkleur en primaire mutaties – Geelvoorhoofd kakariki:

<p>Recessief bont:</p>	<p>Algemeen: Man 26 cm, pop 24 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst, De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: In tegenstelling tot de dominant bonten hebben de recessief bonten een vaster en gelijkmatiger bontpatroon. Net als bij de dominant bonten is het bontpatroon variabel, maar altijd boven de 50%. Het grootste gedeelte van de lichaamsbevedering is dan ook geel. De slagpennen van de recessief bonten zijn vrijwel altijd pigment loos en gelijk van kleur. Er zijn recessief bonten met een geheel effen gele lichaamsbevedering. De oogkleur is donker, doch variabel van tint, dit is afhankelijk van het bontpercentage.</p> <p>Tekening: De voorhoofdband strekt zich uit van oog tot oog en is donker karmijnrood. De kruin is geel. Sommige exemplaren laten achter het oog een minimaal geel driehoekje zien, hier moeten we soepel mee omgaan. De voorkeur hebben de exemplaren die deze driehoek niet tonen Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek, die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>DEC groen: (Gele zwartoog)</p>	<p>Algemeen: DEC groen is de combinatie van Dominant bont en Recessief bont. Man 26 cm, pop 24 cm, gemeten tussen kruin en uiteinde van de 2 verlengde staartpennen. De man is forser van bouw dan de pop en de snavel is groter dan die van de pop. De vogel moet een geblokte indruk maken, zonder vet te zijn en een wigvormige gestalte bezitten. De kop, in verhouding tot de overige lichaamsproporties, moet markant en fors zijn. De hals, van alle kanten gezien, is kort en breed. De schouders zijn breed en krachtig. De borst is zwaar en van een sierlijke vorm. De vleugels moeten goed aansluiten bij de borst, De ruglijn is van het achterhoofd tot aan de punt van de verlengde staartpennen nagenoeg gestrekt. Alle lichaamsproporties dienen op elkaar afgestemd te zijn, d.w.z. dienen een harmonisch geheel te vormen.</p> <p>Kleur: De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Bruine of groene aanslag moet worden bestraft.</p> <p>Tekening: De voorhoofdsband strekt zich uit van oog tot oog is donker karmijnrood. wat overgaat in de nek- en algemene lichaamskleur. Sommige laten achter het oog een minimaal okergeel driehoekje zien, hier moeten we soepel mee omgaan. . De voorkeur hebben de exemplaren die deze driehoek niet tonen Op de flanken is ook nog tekening aanwezig. Aan weerszijden van de stuit een rode vlek die onder de strak gedragen vleugels niet zichtbaar is.</p>
<p>DEC turquoise</p>	<p>Algemeen: DEC turquoise is de combinatie van Dominant bont en Recessief bont .</p> <p>Zie verder DEC groen</p>

[Terug naar index](#)


Algemene aanvulling Geel voorhoofd kakariki serie

Keurtechnische aanwijzingen T.o.v. de roodvoorhoofd kakariki

Dit is een opsomming als herkenning omschrijving afwijkend aan de Roodvoorhoofd kakariki.

Herkenning omschrijvingen voorhoofd en oogtekening t.o.v. Roodvoorhoofd kakariki

	Voorhoofd:	Oogtekening:
Aqua	Diep roze daarachter lichtgele schedel	Roze
Turquoise	Lichtroze. daarachter wit geel bewaasde schedel	Lichtroze.
Cinnamon aqua	Diep roze daarachter lichtgele schedel	Roze
Cinnamon turquoise	Karmozijn rood daarachter lichtgele schedel	Rood
Fallow aqua	Diep roze daarachter lichtgele schedel	Roze
Fallow turquoise	Lichtroze. daarachter wit geel bewaasde schedel	Lichtroze.
Gezoomd groen	Karmozijn rood daarachter geel	Rood
Gezoomd aqua	Diep roze daarachter lichtgele schedel	Roze
Gezoomd turquoise	Lichtroze. daarachter wit geel bewaasde schedel	Lichtroze.
SL ino aqua	Diep roze. daarachter lichtgele schedel	Lichtgeel
SL ino turquoise	Lichtroze. daarachter witgele schedel	Witgeel



[Terug naar index](#)