

## Omschrijving Aratinga soorten:



**Uitgave 2021**

Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

© Copyright by NBvV

Alle rechten voorbehouden

## Inhoud

### Inhoudsopgave

Inhoud.....	2	Psittacara leucopthalmus callogenys.....	14
Voorwoord 2021.....	4	Psittacara leucopthalmus propinqua.....	15
Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus.....	5	Psittacara mitratus mitratus .....	15
Thectocercus acuticaudatus haemorrhous .....	5	Psittacara alticolus .....	16
Thectocercus acuticaudatus neumanni.....	6	Eupsittula pertinax pertinax.....	17
Thectocercus acuticaudatus koenigi.....	6	Eupsittula pertinax xanthogenia .....	17
Thectocercus acuticaudatus neoxena .....	7	Eupsittula pertinax aeruginosa .....	18
Psittacara holochiorus holachiorus .....	8	Eupsittula pertinax griseipecta.....	18
Psittacara holochiora brewsteri.....	8	Eupsittula pertinax arubensis.....	19
Psittacara holochiora strenua.....	9	Eupsittula pertinax lehmanni .....	19
Psittacara holochiora brevipes .....	9	Eupsittula pertinax tortugensis .....	20
Psittacara wagleri wagleri.....	10	Eupsittula pertinax margaritensis .....	20
Psittacara wagleri transilis.....	10	Eupsittula pertinax chrysophrys.....	21
Psittacara wagleri frontatus frontatus .....	11	Eupsittula pertinax venezuelae .....	21
Psittacara wagleri minor .....	11	Eupsittula pertinax surinama .....	22
Psittacara finschi.....	12	Eupsittula pertinax chrysogenus.....	22
Psittacara erythrogegens.....	12	Eupsittula pertinax paraensis.....	23
Psittacara chiropterus chiropterus.....	13	Eupsittula pertinax ocularis.....	23
Psittacara chiropterus maugei.....	13	Eupsittula cactorum cactorum.....	24
Psittacara leucopthalmus leucopthalmus .....	14	Eupsittula cactorum caixana .....	24
		Eupsittula aurea aurea .....	25
		Eupsittula aurea major .....	26



Eupsittula nana astec.....	27
Eupsittula nana vicinalis .....	27
Eupsittula nana nana .....	28
Eupsittula canicularis canicularis .....	28
Eupsittula canicularis eburnirostrum .....	29

Eupsittula canicularis clarea .....	29
Aratinga auricapillus auricapillus .....	30
Aratinga auricapilla aurifrons .....	30
Aratinga jandaya .....	31
Aratinga weddellii .....	32

[Inhoudsopgave](#)

## Voorwoord 2021

Deze omschrijving is opgesteld door Jef Kenis en aan de hand van bezoeken bij kwekers die deze vogels bezitten en aan de hand van foto's en beschrijvingen door specialisten uit binnen- en buitenland.

De basis van deze omschrijving is het bestand Aratingas 2006 welke door Jef Kenis in samenwerking met de toenmalige Parkietenfederatie is opgesteld.

In de loop der jaren zijn er diverse wijzigingen in de wetenschappelijk benamingen ontstaan en die zijn nu dus bijgewerkt aan de hand van de Avibase en de Clements-Checklist-v2019-Augustus2019

U zal in dit schrijven alle specifieke zaken die soort eigen zijn de soort herkenning te kunnen vinden.

Gooreind-Wuustwezel (Jef Kenis)

Utrecht

Voorjaar 2021

Technische commissie Europese Cultuur, Tropen en Parkieten

[Inhoudsopgave](#)



## Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus

Nederlands: Blauwkop parkiet  
Engels: Blue - crowned Conure, Sharp — tailed Conure  
Duits: Blaukopsittich

Grootte: 38 cm

### Kop

De volledige kop is blauw, het voorhoofd is vrij diep blauw. Naar het achterhoofd en de oren toe wordt doffer blauw met een grijzige tint. Dit vindt men ook terug onder de ondersnavel. Heel het blauwe gebied is licht geschubd. Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten. De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje, de ondersnavel zwart. Rond het oog is er een witte oogring die toch vrij groot is. De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil. De neusdoppen zijn haast niet te zien. Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

### Vleugels

De volledige vleugel is groen gekleurd. De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur. De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel. De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel. Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.

### Lichaam

Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen. Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de kleur eerder bewolkt is door de gele aanslag. De bovenzijde van de borst durft soms een blauwe waas te vertonen, zeker wanneer het gaat om oudere vogels.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen. De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig rood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn. Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van de staart zitten.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

## Thectocercus acuticaudatus haemorrhous

Nederlands: Braziliaanse blauwkop parkiet  
Engels: Blue - crowned Conure  
Duits: Blaustirnsittich

Grootte: 37 cm

### Kop

Het voorhoofd is licht blauw. Naar het achterhoofd en de oren toe is de kleur licht groen. Maar op de gehele kop is er wel een zeer lichte blauwe waas. Door het veel of weinig aanwezig zijn van geel beïnvloed deze blauwe waas zeer sterk. De bovensnavel en de ondersnavel zijn hoornkleurig. De kleur van de bovensnavel loopt uit in een grijs puntje. Rond het oog is er een witte oogring die toch vrij groot is. De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil. De neusdoppen zijn haast niet te zien. Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

### Vleugels

De volledige vleugel is groen gekleurd. De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur. De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel. De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel. Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.

### Lichaam

Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen. Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de kleur eerder bewolkt is door de gele aanslag. Het bewolkt zijn van de lichaamskleur valt echt op en wordt alleen maar erger wanneer de vogel ouder wordt..

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen. De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig rood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn. Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van de staart zitten.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

## Thectocercus acuticaudatus neumanni

Nederlands: Boliviaanse blauwkop parkiet  
Engels: Bolivian Blue - crowned Conure  
Duits: Bolivien Blaustirnsittich

Grootte: 38cm

### Kop

Het blauw blijft bij deze beperkt tot het voorhoofd en voorste gedeelte van de kroon. Heel het blauwe gebied is licht geschubd. Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten. De keel vertoont vanaf de ondersnavel eerste een donkergrijze waas die hoe meer men richting borst gaat lichter grijs wordt. De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje. Ook aan de zijkanten is er een smal grijs/zwart lijntje richting snavelpunt. De ondersnavel zwart. Rond het oog is er een witte oogring. De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil. De neusdoppen zijn haast niet te zien. Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

### Vleugels

De volledige vleugel is groen gekleurd. De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur. De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel. De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel. Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.

### Lichaam

Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen. Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl van de borst de kleur eerder bewolkt is door de gele aanslag. De bovenzijde van de borst durft soms een blauwe waas te vertonen, zeker wanneer het gaat om oudere vogels.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen. De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig rood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn. Dit wil zeggen dat de buitenste eerder donkerder in kleur zijn dan diegene die in het midden van de staart zitten.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Thectocercus acuticaudatus koenigi

Nederlands: Venuzuelaanse blauwkop parkiet  
Engels: Venezuelan Blue - crowned Conure  
Duits: Venezuela Blaustirnsittich

Grootte: 34 cm

### Kop

Het blauw blijft bij deze beperkt tot het voorhoofd en voorste gedeelte van de kroon. Op het voorhoofd is de kleur vrij diep. Ook zijn er uitlopers tot onder het oog. Heel het blauwe gebied is licht geschubd. Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten. De keel vertoont vanaf de ondersnavel een licht grijs waas. De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje. De ondersnavel is eveneens hoornkleurig tot grijs met een zwart puntje op het uiteinde. Rond het oog is er een vrij grote witte oogring. De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil. De neusdoppen zijn haast niet te zien. Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

### Vleugels

De volledige vleugel is groen gekleurd. De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur. De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfachtig geel. De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel. Verder is de vleugel kleur vrij sterk bewolkt door een gele aanslag. Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfachtig geel.

### Lichaam

Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen. Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de kleur eerder vrij sterk bewolkt is door de gele aanslag. De bovenzijde van de borst durft soms een grijzige waas te vertonen, zeker wanneer het gaat om oudere vogels.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen. De buitenste veren van staart zijn onderaan een weinig bruinrood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn. Dit wil zeggen dat de buitenste eerder donkerder in kleur zijn dan diegene die in het midden van de staart zitten.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

## Thectocercus acuticaudatus neoxena

Nederlands: Margarita blauwkop parkiet  
Engels: Margarita Conure  
Duits: Margarita Blaustirnsittich

Grootte: 34 cm

### Kop

Het blauw blijft bij deze beperkt tot het voorhoofd en voorste gedeelte van de kroon. Heel het blauwe gebied is licht geschubd. Dit komt omdat de uiteinde van de blauwe een zwarte omranding bezitten. De keel vertoont vanaf de ondersnavel een licht grijs waas. De bovensnavel is hoornkleurig met een zwart/grijs puntje. De ondersnavel is eveneens hoornkleurig met een zwart puntje op het uiteinde. Rond het oog is er een witte oogring. De irisring is geel/oranje met een zwarte pupil. De neusdoppen zijn haast niet te zien. Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleurige kleur.

### Vleugels

De buitenste slagpennen hebben een bruinachtige kleur. De grote vleugelpennen en de onderliggende veren zijn olijfgachtig geel. De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel. Bij de onderzijde van de vleugels zijn de vleugeldekveren olijfgachtig geel.

### Lichaam

Het lichaam is van de keel tot het begin van de staart groen. Ter hoogte van de schouder is de kleur eerder donkerder groen terwijl vanaf de borst de kleur eerder bewolkt is door de gele aanslag. De bovenzijde van de borst en de buik durft soms een blauwe waas te vertonen, zeker wanneer het gaat om oudere vogels.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen. De buitenste veren van staart zijn onderaan bruinachtig rood, terwijl de andere roodachtig bruin zijn. Dit wil zeggen dat de buitenste eerder doffer in kleur zijn dan diegene die in het midden van de staart zitten.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Psittacara euops

Nederlands: Cuba parkiet  
Engels: Cuban Conure  
Duits: Kubasittich

Grootte: 26 cm

### Kop

De kopkleur is groen tot donkergroen. Boven de neusdoppen is er een roodbruin bandje. Op het hoofd en in de nek zijn er vrij vee! rode veren. Hoe ouder de vogel hoe meer rode vlekken er zijn en hoe groter deze worden. Rond het oog is er een Vrij grote witte oogring. De irisring is oranje rood. De iris zelf is zwart. De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

### Vleugels

De vleugelbocht is groen met verspreidde rode veertjes, de vleugelzoom evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel zijn rood. Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren geel tot olijfgeel. erder is de vleugel groen.

### Lichaam

De lichaamskleur is groen. Op de borst en de nek komen rode veren voor die dikwijls rode vlekken vormen, maar dat hangt echt af van vogel tot vogel en de ouderdom van deze vogel. Naar de staart toe wordt het aantal rode veren een stuk minder en komen er soms zelfs geen voor. Naar de staart wordt ook de groene kleur lichter tot olijfgeel.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel olijfgkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

### INFORMATIEF

Jonge vogels missen vaak volledig de rode vlek op het voorhoofd. Slechts enkele rode vlekjes komen voor. De rode vlekken groeien vanaf het tweede jaar uit en wordt jaarlijks nog groter.

## Psittacara holochlorus holachlorus

Nederlands: Groene parkiet  
Engels: Green Conure  
Duits: Gruensittich

Grootte: 32 cm

### Kop

De ganse kop is groen.

Soms zien we rode veertje verspreid over de kop, meestal op de keel en ter hoogte van de oren.

De snavel is hoornkleurig met halfweg zwarte vlekken op zowel de boven- als ondersnavel.

Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.

De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.

### Lichaam

Op de borst en de buik vinden we meer lichtgroen.

Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van geel.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

## Psittacara holochlora brewsteri

Nederlands: Brewster aratinga  
Engels: Brewster's Green Conure  
Duits: Brewsters Gruensittich

Grootte 32 cm.

### Kop

De ganse kop is groen tot donkergroen.

Soms zien we rode veertje verspreid over de kop, meestal op de keel en ter hoogte van de oren.

Bij deze komt er een blauwige waas voor op de kruin.

De snavel is hoornkleurig met halfweg zwarte vlekken op zowel de boven- als ondersnavel.

Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.

De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.

### Lichaam

Op de borst en de buik vinden we een weinig lichtgroen.

Verder is het lichaam groen tot

donkergroen.

Het valt wel op dat bij deze vogel de borst en de buik bewolkt zijn, door het weinig aanwezige geel.

### Staat

De bovenzijde van de staart is donkergroen.

De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)



## Psittacara holochiora strenua

Nederlands: Nicaragua Aratinga  
Engels: Nicaraguan Green Conure  
Duits: Nicaragua - Gruensittich

Grootte 34 cm.

### Kop

De ganse kop is groen.

Soms zien we meerdere rode veertje verspreid over de kop, meestal op de keel en ter hoogte van de oren.

De snavel is hoornkleurig met halfweg flinke zwarte vlekken op zowel de boven- als ondersnavel, uitlopende tot op het puntje van de bovensnavel.

Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring, soms is deze lichter tot zelfs wit.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.

De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.

### Lichaam

Op de borst en de buik vinden we meer lichtgroen.

Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van geelgroen.

### Staat

De bovenzijde van de staat is groen.

De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

## Psittacara holochiora brevipes

Nederlands: Socorro Aratinga  
Engels: Socorro Green Conure  
Duits: Socorro Grunsittich

Grootte: 34 cm.

### Kop

De ganse kop is groen.

Het is de enige waarbij geen rode veertjes worden getoond.

De snavel is hoornkleurig met halfweg zwarte vlekken op zowel de boven- als ondersnavel.

Rond het oog vinden we een kleine grijsbruine naakte oogring.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring donkerder.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof olijfgeel.

De onderzijde van de vleugels is olijfgeel.

### Lichaam

De vogel is volledig donkergroen gekleurd, met zelfs een lichte grijze band tussen de borst en de keel.

### Staat

De bovenzijde van de staat is donkergroen.

De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Psittacara wagleri wagleri

Nederlands: Wagler parkiet of Colombia parkiet  
Engels: Red-fronted Conure  
Duits: Kolumbiasittich

Grootte 36 cm.

### Kop

Vanaf de neus tot op de kroon van het hoofd, iets voorbij de ogen heeft deze aratinga een fel rode vlek.

Verder is de ganse kop groen, ook tussen de ogen en de rode voorhoofdsvlek.

Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt door de aanwezigheid van wat gele vlekjes.

De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.

Rond het oog vinden we een kleine witbruine naakte oogring.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje-rood.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.

De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.

Verder is de onderzijde groen.

### Lichaam

Op de borst en de buik vinden we meer geelgroen.

Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van geel.

Verder kan het zijn dat er hier en daar wat verdwaalde rode veertjes terug te vinden zijn.

Dit komt zeker voor bij de wat oudere vogels.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel - olijf.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig tot bruin met zwarte nagels.

## Psittacara wagleri transilis

Nederlands: Kleine waglerparkiet  
Engels: Peter's Conure  
Duits: Venezuelasittich

Grootte: 34 cm.

### Kop

Vanaf de neus tot op het voorhoofd heeft deze aratinga een dofferode vlek die niet tot voorbij de ogen komt.

Verder is de ganse kop donkergroen, ook tussen de ogen en de rode voorhoofdsvlek.

Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt door de aanwezigheid van wat gele vlekjes.

De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.

Rond het oog vinden we een kleine witbruine naakte oogring.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen tot donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.

De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.

Verder is de onderzijde groen.

### Lichaam

Op de borst en de buik vinden we wat geelgroen.

Verder is het lichaam groen, met wat variatie door het meer of minder aanwezig zijn van geel.

Verder kan het zijn dat er hier en daar wat verdwaalde rode veertjes terug te vinden zijn.

Dit komt zeker voor bij de wat oudere vogels.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig tot bruin met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Psittacara wagleri frontatus frontatus

Nederlands: Grote Peru parkiet  
Engels: Scarlet-fronted Conure  
Duits: Perusittich

Grootte: 40 cm.

### Kop

Vanaf de neus tot op het voorhoofd heeft deze parkiet een rode vlek die tot voorbij de ogen komt en begint halfweg de bovensnavel.

Verder is de ganse kop groen.

Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt.

De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.

Rond het oog vinden we een vrij brede witte oogring.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.

Bij jonge vogels komt de rode vlek ook niet voorbij het oog.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.

De vleugelboeg en de buitenzijde van de vleugel, en soms ook de dij, zijn rood.

De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.

Verder is de onderzijde groen.

### Lichaam

De kleur op de borst en de buik is nooit egaal groen, maar eerder een schakering van de groene kleur.

Dit gaat van geelgroen naar olijf.

Verder kan het zijn dat er hier en daar wat verdwaalde rode veertjes terug te vinden zijn.

Dit komt zeker voor bij de wat oudere vogels.

De dijen hebben een bruinrode kleur.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig met zwarte nagels.

## Psittacara wagleri minor

Nederlands: Kleine Peru parkiet  
Engels: Carriker's Conure  
Duits: Carrikersittich

Grootte: 38 cm.

### Kop

Vanaf de neus tot op het voorhoofd heeft deze aratinga een rode vlek die tot voorbij de ogen komt en begint halfweg de bovensnavel.

Verder is de ganse kop groen.

Ter hoogte van de oren is dit groen wat meer bewolkt.

De snavel is hoornkleurig met op het uiteinde een zwartgrijs puntje.

Rond het oog vinden we een vrij brede witte oogring.

De irisring is zeker bij volwassen vogels oranje.

Bij jonge vogels tot een jaar of vier is de irisring eerder geel.

Bij jonge vogels komt de rode vlek ook niet voorbij het oog.

De iris zelf is zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn donkergroen, met een zeer lichte schubtekening.

De onderste dekveren van de vleugel zijn dof geelgroen.

De buitenzijde van de vleugel vertoont soms rode veertjes

Soms komen deze ook voor op de vleugelboeg.

De onderzijde van de vleugelpennen is olijfgeel.

Verder is de onderzijde groen.

### Lichaam

De kleur op de borst en de buik is eerder dof donkergroen.

Het valt op dat de lichaamskleur nergens dezelfde is door de aanwezige bewolking.

De dijen hebben een bruinrode kleur.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Psittacara finschi

Nederlands: Finsch's parkiet  
Engels: Finsch's Conure  
Duits: Finschsittich

Grootte: 28 cm.

### Kop

De voorkroon, en alleen maar de voorkroon, vanaf de neusdoppen tot juist boven de ogen (nooit verder) is diep rood.

Het rood loopt nooit langs de zijkanten (de kaken) tot aan het oog.

Het rood begint boven de neusdoppen (die vleeskleurig zijn) en de rode vlek is even breed als de plaats waar de neusdoppen zich bevinden, maar wordt richting voorhoofd vrij snel smaller.

Tussen het oog en deze rode vlek is de kop kleur groen met vrij dikwijls enkele zeer kleine rode veertjes.

De kroon en de nek zijn eveneens groen, maar de kroon is vrij donkergroen.

Op de plaats waar het oor zit is dit groen weer wat lichter door de aanwezigheid van geelgroene veertjes. -

Op gans de keel en de nek komen we verdwaalde rode veren tegen.

Deze worden zelden vlekken.

Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.

De irisring is oranje rood.

De iris zelf is zwart.

De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

### Vleugels

De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.

Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren geel tot olijfgeel.

Verder is de vleugel groen.

### Lichaam

De keel is donkerder dan de rest van het lichaam.

De verdere lichaamskleur wordt lichter door de aanwezige geel-olijfgroene kleur.

Tussen de poten naar de aarsstreek is de kleur weer licht groen.

Bovenaan de borst zijn er soms wat rode vlekjes te zien.

Deze komen er meer wanneer de vogel ouder wordt.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.

### Opmerking

Jonge vogels missen vaak volledig de rode vlek op het voorhoofd.

## Psittacara erythrogenys

Nederlands: Guayaquil parkiet  
Engels: Red-masked Conure  
Duits: Guyaquilsittich

Grootte: 33 cm.

### Kop

Vanaf de snavel loopt het rood tot achter het oog en loopt rond het oog naar halfweg de ondersnavel.

Er is bijna geen intensiteit verschil in dit rood.

De groene kleur begint na het rood en bedekt verder de gehele kop.

De groene kleur is ter hoogte van het oor iets donkerder.

Ook de keel is groen.

Zelden komen hier verdwaalde rode veren voor.

Rond het oog is er een Vrij grote witte oogring. De irisring is oranje rood. De iris zelf is zwart.

De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

### Vleugels

De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.

Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren geel tot olijfgeel.

Verder is de vleugel groen.

### Lichaam

De lichaamskleur is groen.

De borst en de buikstreek zijn geelgroen.

De aarsstreek is dan weer iets donkerder.

De scheidingslijn met de poten vertoont een rood bandje.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.

### Opmerking

Jonge vogels missen vaak volledig de rode vlek op het voorhoofd.

Slechts enkele rode vlekjes komen voor.

De rode kopvlek groeit vanaf het tweede jaar uit en wordt jaarlijks nog groter.

[Inhoudsopgave](#)

## Psittacara chiropterus chiropterus

Nederlands: Hispaniola parkiet  
Engels: Hispanolian Conure  
Duits: Haitisittich

Grootte: 32 cm.

### Kop

De volledige kop is groen.

Boven de neusdoppen is er een "bruin" bandje.

Daarboven wordt de kleur geelgroen overgaand in donkergroen op het achterhoofd en de nek.

Soms vinden we enkele verdwaalde rode veren op de kop.

Dit zijn er echter maar een paar en vormen zeker geen rode vlekken.

Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.

De irisring is oranje rood.

De iris zelf is zwart.

De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

### Vleugels

De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.

Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren olijfgeel.

De grotere dekveren vertonen een lichte rode waas, variërend van vogel tot vogel.

Verder is de vleugel groen.

### Lichaam

De keel is donkerder dan de rest van het lichaam.

De verdere lichaamskleur wordt lichter door de aanwezige geel-olijfkleurige kleur.

Tussen de poten naar de aarsstreek is de kleur weer echt groen.

Bovenaan de borst zijn er soms wat rode vlekjes te zien.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Psittacara chiropterus maugei

Nederlands: Porto Rica parkiet  
Engels: Puerto Rican Conure  
Duits: Puerto-Rico-sittich

Grootte: 32 cm.

### Kop

De volledige kop is groen.

Boven de neusdoppen is er een "bruin" bandje.

Daarboven wordt de kleur geelgroen overgaand in donkergroen op het achterhoofd en de nek.

Soms vinden we enkele verdwaalde rode veren op de kop.

Dit zijn er echter maar een paar en vormen zeker geen rode vlekken.

Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.

De irisring is oranje rood.

De iris zelf is zwart.

De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig.

### Vleugels

De vleugelbocht is rood evenals de kleine dekveren aan de onderzijde van de vleugel.

Bij de onderzijde van de vleugel zijn grote dekveren olijfgeel.

De grotere dekveren zijn rood.

Verder is de vleugel groen.

### Lichaam

De keel is donkerder dan de rest van het lichaam, maar de verdere lichaamskleur wordt iets lichter door de aanwezige doffe olijfkleurige kleur.

Tussen de poten naar de aarsstreek is de kleur weer echt groen.

Bovenaan de borst zijn er soms wat rode vlekjes te zien.

Deze komen er meer wanneer de vogel ouder wordt.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

### Opmerking

Deze ondersoort is zeer zeldzaam, zelfs in de streek waar zijn habitat zou moeten zijn.

[Inhoudsopgave](#)

## Psittacara leucophthalmus leucophthalmus

Nederlands: Witoogparkiet  
Engels: White-eyed Conure  
Duits: Pavuasittich

Grootte: 32 cm.

### Kop

De kopkleur is groen tot donkergroen.  
Dikwijls komen er rode veertjes voor.  
Je kan ze niet echt vast situeren.  
Rond het oog is er een vrij brede grijswitte oogring.  
De irisring is geeloranje met een zwarte pupil.  
De snavel is hoornkleurig met aan de zijkanten, waar de twee delen van de snavel elkaar raken, een grijszwarte kleur, zowel bij de boven- als ondersnavel.  
Ook het puntje van de bovensnavel is grijs tot zwart.

### Vleugels

De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.  
De vleugelboegen laten meestal een rode kleur zien.  
De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekveren) is rood, terwijl de vleugelpennen zelf olijfgeel zijn.

### Lichaam

De borst tot aan de aars is groen, veelal lichter naar de onderzijde toe.  
Dit komt door het meer aanwezig zijn van geel.  
De rug en de stuit zijn groen, donkerder dan de borstkleur.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is olijfkleurig (gele aanslag).

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.  
De dijnen hebben soms verspreide rode veertjes.

### Opmerking

Jonge vogels hebben zeker geen rode veertjes en de irisring is donker.

## Psittacara leucophthalmus callogenyus

Nederlands: Equador witoogparkiet  
Engels: Ecuadorian white-eyed Conure  
Duits: Ekuador weissaugensittich

Grootte: 32 cm.

### Kop

De kopkleur is donkergroen tot olijfgroen.  
Dikwijls komen er rode veertjes voor.  
Je kan ze niet echt vast situeren.  
Rond het oog is er een vrij brede grijswitte oogring.  
De irisring is geeloranje met een zwarte pupil.

De snavel is hoornkleurig met aan de zijkanten, waar de twee delen van de snavel elkaar raken, een grijszwarte kleur, zowel bij de boven- als ondersnavel.  
Ook het puntje van de bovensnavel is grijs tot zwart.  
De snavel zelf is vrij groot voor een vogel van deze grote.

### Vleugels

De bovenzijde van de vleugels is groen tot donkergroen, zeer licht geschubd.  
De vleugelboegen laten meestal een rode kleur zien.  
De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekveren) is rood, terwijl de vleugelpennen zelf olijfgeel zijn.

### Lichaam

De borst tot aan de aars is groen tot donkergroen, veelal iets lichter naar de onderzijde toe.  
Meestal zijn er verspreid enkel rode veertjes aanwezig, meestal op de hals en wangen.  
Dit geeft de indruk dat een lichte rode waas aanwezig is.  
De rug en de stuit zijn donker groen.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.  
De dijnen hebben soms verspreide rode veertjes.

### Opmerking

Jonge vogels hebben zeker geen rode veertjes en de irisring is donker.

[Inhoudsopgave](#)

## Psittacara leucophthalmus propinqua

Nederlands: Argentijnse witoogparkiet  
Engels: Argentinian white-eyed Conure  
Duits: Argentinien weissaugensittich

Grootte: 34 cm.

### Kop

De kopkleur is groen tot donkergroen.  
Dikwijls komen er rode veertjes voor.  
Je kan ze niet echt vast situeren, maar ze vormen soms echte vlekken..  
Rond het oog is er een Vrij brede grijswitte oogring.  
De irisring is geeloranje met een zwarte pupil.  
De snavel is hoornkleurig.  
Bij deze ondersoort is niet direct een andere kleur terug te vinden op de snavel.

### Vleugels

De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.  
De vleugelboegen laten meestal een rode kleur zien.  
De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekveren) is rood, terwijl de vleugelpennen zelf olijfgeel zijn.

### Lichaam

De borst tot aan de aars is groen, veelal lichter naar de onderzijde toe.  
Dit komt door het meer aanwezig zijn van geel.  
De rug en de stuit zijn groen, donkerder dan de borstkleur.

### Staat

De bovenzijde van de staat is groen.  
De onderzijde is olijfkleurig (gele aanslag).

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.  
De dijen hebben soms verspreide rode veertjes.

### Opmerking

Jonge vogels hebben zeker geen rode veertjes en de irisring is donker.

## Psittacara mitratus mitratus

Nederlands: Roodmaskerparkiet  
Engels: Mitred Conure  
Duits: Rotmaskensittich

Grootte: 38 cm.

### Kop

Het voorhoofd, het voorste deel van de kruin en rond de ogen is de kleur vrij donkerrood. Ter hoogte van de kaken is het rood lichter.  
Verder zijn zowel ter hoogte van de keel, de nek en het achterhoofd vrij regelmatig rode vlekjes te vinden.  
Verder is de kop donkergroen.  
Rond het oog is er een witte oogring die bijna nooit volledig is.  
Onder oog is deze bijna niet te zien.  
De irisring is bruingeel.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig uitlopend in een grijszwart puntje.

### Vleugels

De ondervleugeldekveren, de onderzijde van de grote vleugelpennen zijn olijfgeel.  
Verder is de vleugel aan de bovenzijde groen tot donkergroen.

### Lichaam

Het gehele lichaam is groen.  
Dit groen is wel doffer op de borst.  
Rond de aars is de kleur donkerder dan op de borst.  
Wanneer de vogel ouder wordt, zijn er verspreide rode vlekken op de gehele borst terug te vinden.

### Staat

De bovenzijde van de staat is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.

### Opmerking

Hoe ouder de vogel is, hoe meer rood voorkomt en hoe groter de rode vlek op de kop wordt.  
Jonge vogels vertonen meestal een rode voorhoofdsband en wat verspreide vlekken.  
Bij het ouder worden, worden deze vlekken groter en vormen zo een gehele rode vlek.

## Psittacara alticolus

Nederlands: Chapmans Roodmaskerparkiet  
Engels: Chapman's Mitred Conure  
Duits: Chapmans Sittich

Grootte: 37 cm.

### Kop

Diep rode voorhoofdsband, die zich uitstrekt vanaf de neusdoppen tot juist boven de aanzet van het oog, tussen het oog en de bovensnavel en ook rond het oog.

Verder vinden we rode vlekjes over het ganse hoofd.

Rond het oog is er een witte oogring die bijna nooit volledig is.

Onder oog is deze bijna niet te zien.

De irisring is bruingeel.

De iris zelf is zwart.

De boven- en ondersnavel zijn hoornkleurig uitlopend in een grijszwart puntje.

### Vleugels

De ondervleugeldekenveren, de onderzijde van de grote vleugelpennen zijn olijfgeel.

Verder is de vleugel aan de bovenzijde groen tot donkergroen.

### Lichaam

Het gehele lichaam is groen.

Dit groen is wel differ op de borst.

Rond de aars is de kleur donkerder dan op de borst.

De ganse borst laat een licht rode waas zien door de aanwezigheid van kleine rode veertjes.

Deze groeien nooit uit tot rode vlekken.

Verder is de borstkleur dof groen en deze kleur wordt donkerder tussen de poten..

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn vleeskleurig tot grijs met zwarte nagels.

### Opmerking

Jonge vogels vertonen meestal enkel een rode voorhoofdsband.

Bij het ouder worden, wordt de rode voorhoofdsband groter en krijgen we verspreide rode vlekjes op het hoofd, maar nooit op het lichaam.

Ook de irisring wordt pas oranje wanneer de vogel ongeveer 24 tot 30 maanden oud is.

## Psittacara holochlorus rubritorquis

Nederlands: Roodkeelparkiet  
Engels: Red troated Conure  
Duits: Grünsittich

Grootte: 30 cm.

### Kop

De kopkleur is groen. Rond het oog en naast de snavel is de kleur lichter groen, terwijl deze op het voorhoofd donkergroen is.

Op de kop komen soms verdwaalde rode veren voor, voornamelijk tussen het oog en de ondersnavel.

Rond het oog is er een kleine bruinzwarte oogring.

De irisring is oranje met een zwarte pupil.

De snavel is hoornkleurig met aan de zijanten, waar de twee delen van de snavel elkaar raken, een grijszwarte kleur, zowel bij de boven- als ondersnavel.

### Vleugels

De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.

De vleugelboegen laten meestal een geelgroene kleur zien.

De onderzijde van de vleugel (de vleugeldekenveren) is geelgroen, terwijl de vleugelpennen zelf olijfgeel zijn.

### Lichaam

De borst tot aan de aars is groen, veelal geelgroen naar de onderzijde toe.

Dit komt door het meer aanwezig zijn van geel.

De oranjevlekkende vlek loopt bij een volwassen vogel vanaf de ondersnavel tot juist op de borst.

Deze vlek wordt groter naarmate de vogel ouder wordt.

Jonge vogels krijgen deze vlek meestal pas vanaf de 15<sup>e</sup> levensmaand en zijn daardoor moeilijker te onderscheiden van de groene aratinga.

De rug en de stuit zijn groen, donkerder dan de borstkleur.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is olijfkleurig (gele aanslag).

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)



## Eupsittula pertinax pertinax

Nederlands: St. Thomas parkiet  
Engels: St. Thomas Conure  
Duits: St. Thomas-Sittich

Grootte: 25 cm.

### Kop

De wangen, het voorhoofd en de kin zijn intensief geel tot licht oranje. Het geel loopt tot aan de zijkanten van de nek. De kruin en de nek zelf zijn groen met blauwe waas. De kruin is vrij bewolkt. Ook de grote van de gele vlek op de wang is niet echt te beschrijven. Ze varieert van een grote vlek rond de ogen tot de ganse kop (zonder de kruin). Hoe ouder de vogels zijn hoe meer oranje zich manifesteert. Het is samen met de Bonaire de enige die een geeloranje bandje heeft boven de snavel. Rond het oog is er een kleine grijze naakte oogring. De irisring is oranje rood. De iris zelf is zwart. De boven- en ondersnavel zijn zwart. De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen. De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt. De buitenste secundaire pennen zijn blauw. De onderzijde van de vleugel is olijfgeel. De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is olijfbruin. Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst. Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur. De buikkleur begint geelgroen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt. Dat komt door de aanwezige geeloranje vlekken. Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula pertinax xanthogenia

Nederlands: Bonaire Maïsparkiet  
Engels: Bonaire Brown-throated Conure  
Duits: Bonairesittich

Grootte: 25 cm.

### Kop

De volledige kopkleur kan intensief geel tot licht oranje zijn. Toch is het oranje minder sterk dan bij de St. Thomas. Het geel loopt tot op de keel. Bij het ouder worden blijft het geel overheersen en wordt het niet oranje zoals bij de St. Thomas. Rond het oog is er een kleine grijze naakte oogring. De irisring is oranje rood. De iris zelf is zwart. De boven- en ondersnavel zijn zwart. De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen. De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt. De buitenste secundaire pennen zijn blauw. De onderzijde van de vleugel is olijfgeel. De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is olijfbruin. Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst. Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur. De buikkleur begint geelgroen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt. Dat komt door de aanwezige geeloranje vlekken. Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen. De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula pertinax aeruginosa

Nederlands: Bruinkeel Maisparkiet  
Engels: Brown-throated Conure  
Duits: Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.  
Ook de brede voorhoofdsband is bruin, naar de kruin toe wordt deze bewolkt door het aanwezige geel en het donkerblauw van de kruin.  
De kruin zelf is dofblauw tot bijna in de nek.  
Verder is rond het oog een kleine geeloranje ring.  
Deze is echter zeer fijn en boven het oog vrij dikwijls onderbroken.  
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is bruin.  
Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.  
De buikkleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.  
Dat komt door de aanwezige geel vlekken.  
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula pertinax griseipecta

Nederlands: Grijskeel Maisparkiet  
Engels: Sinu Brown-throated Conure  
Duits: Sinu Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.  
Ook de brede voorhoofdsband is bruin, naar de kruin toe wordt deze bewolkt door het donkerblauw, van de kruin, en kleine witte vlekjes.  
De kruin zelf is dofblauw maar de kleur wordt groen in de nek, maar blijft dof.  
Verder is rond het oog een kleine geeloranje ring.  
Deze is echter zeer fijn en boven het oog vrij dikwijls onderbroken.  
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste vleugelpennen zijn groen.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is bruin.  
Dit bruin gaat over naar grijs op de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.  
De buikkleur begint groen, maar richting de poten is deze bewolkt.  
Dat komt door de weinige aanwezige gele vlekken.  
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.  
Maar het aantal blijft beperkt.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula pertinax arubensis

Nederlands: Aruba Maisparkiet  
Engels: Aruba Brown-throated Conure  
Duits: Aruba Braunwangensittich

Grootte: 25 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is lichtbruin tot geelbruin.  
Ook de brede voorhoofdsband is geelbruin.  
De kruin zelf is dofblauw en loopt tot boven het oog.  
Het achterhoofd en de nek zijn bewolkt groen.  
Verder is rond het oog een geeloranje ring.  
Deze ring is onder en achter het oog breder dan boven het oog.  
De geeloranje kleur is ook vrij intens.  
Rond het oog is er een witgrijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.  
Het komt vrij veel voor dat op de schouders geelgroene veren te vinden zijn, voornamelijk met iets oudere vogels.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De borstkleur is geelbruin.  
De buik en de onderbuik zijn geelgroen.  
Maar aan de inplanting van de poten zijn er vrij veel geeloranje vlekken.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula pertinax lehmanni

Nederlands: Colombia Maisparkiet  
Engels: Colombian Brown-throated Conure  
Duits: Kolombien-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.  
Ook de brede voorhoofdsband is bruin, naar de kruin toe wordt deze bewolkt door het aanwezige geel en het donkerblauw van de kruin.  
De kruin zelf is dofblauwgroen.  
Verder is rond het oog een geeloranje ring, die breder onder en achter het oog is, en boven het oog vrij dikwijls onderbroken.  
Rond het oog is er een kleine grijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste pennen zijn groen met een blauwe waas.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is bruin tot aan het bovenste deel van de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen het bovenste stuk van de borstkleur en de borstkleur zelf.  
De buikkleur begint groen met vele geeloranje vlekjes, maar richting de poten is deze buikkleur sterk bewolkt.  
Deze zijn het sterkst op de dij en tussen de poten.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula pertinax tortugensis

Nederlands: Tortuga Maïsparkiet  
Engels: Tortuga Brown-throated Conure  
Duits: Tortuga-Braunwangensittich

Grootte: 26 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.  
Ook de brede voorhoofdsband is geelbruin.  
Het voorhoofd is donkerblauw tot op de kruin.  
De nek is bewolkt groen.  
Verder is rond het oog een geeloranje ring.  
Deze is echter zeer intens waardoor de witte oogring soms zelf niet opvalt.  
Deze ring is niet al te breed maar sluit wel volledig rond het oog.  
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt. De buitenste pennen zijn groen met een lichte blauwe waas.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is bruin aan het bovengedeelte van de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de borst zelf.  
De borstkleur zelf is olijfbruin.  
De buikkleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.  
Dat komt door de aanwezige geel vlekken.  
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula pertinax margaritensis

Nederlands: Margarita Maïsparkiet  
Engels: Margarita Brown-throated Conure  
Duits: Margarita-Braunwangensittich

Grootte: 25 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.  
De voorhoofdsband is vrij klein en bruinwit van kleur maar loopt uit naar geelbruin.  
Het voorhoofd zelf is blauw.  
Rond het oog zit een klein geel bandje.  
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is geelbruin.  
Dit geelbruin loopt tot op de borst.  
Men heeft niet echt een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur, waardoor je echt een bewolkte borstkleur krijgt.  
Ook de afscheiding tussen de bewolkte groene borstkleur en de buikkleur is haast niet te vinden.  
De buikkleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.  
Dat komt door de aanwezige geel vlekken.  
Deze zijn het sterkst op de dijen en tussen de poten.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula pertinax chrysophrys

Nederlands: Guyana Maisparkiet  
Engels: Guyana Brown-throated Conure  
Duits: Guyana-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is geelbruin.  
Ook de brede voorhoofdsband is geelbruin.  
De kruin zelf is donkerblauw overgaand naar olijfgroen in de nek.  
Verder is rond het oog een kleine geeloranje ring.  
Deze is echter zeer fijn en boven het oog vrij maar niet onderbroken.  
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring, die soms onderbroken is.  
Maar voor en achter oog is steeds een wit vlekje te zien.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste pennen zijn blauw.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is geelbruin tot bruin op de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.  
De buikkleur begint geelgroen en in tegenstelling tot de andere soorten is de buik veel minder bewolkt.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula pertinax venezuelae

Nederlands: Venezuela Maisparkiet  
Engels: Venezuelan Brown-throated Conure  
Duits: Venezuela-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is dofbruin .  
De voorhoofdsband is boven de neus geelbruin, maar is daar vrij smal.  
De band wordt dan bijna wit om vervolgens over te gaan naar een helder blauwe kruinvlek, die achter de ogen overgaat naar een olijf kleur  
Rond het oog is een kleine geeloranje ring.  
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
Op de schouders is de kleur eerder olijfgeel, met wat donkergroene vlekken.  
Dit komt voor bij de meeste wat oudere vogels.  
De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste pennen zijn blauw.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is geelbruin tot bruin op de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.  
De buikkleur begint geelgroen en in tegenstelling tot de andere soorten is de buik veel minder bewolkt.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula pertinax surinama

Nederlands: Suriname Maisparkiet  
Engels: Surinam Brown-throated Conure  
Duits: Surinam-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen en onder de oren zijn bruin.  
Ook de brede voorhoofdsband is geelbruin.  
De kruin zelf is donkerblauw overgaand naar olijfgroen in de nek.  
Verder is rond het oog een vrij grote geeloranje ring tot aan de ondersnavel en het oor.  
Rond het oog is er een kleine witgrijze naakte oogring, die soms onderbroken is.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen. De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste pennen zijn blauw.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is geelbruin tot op de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.  
Deze afscheiding tussen de borst en de buik is groen.  
De buikkleur is geelgroen en vrij sterk bewolkt.  
De dijen zijn bij de inplanting groen.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfgroen.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula pertinax chrysogenus

Nederlands: Braziliaanse Maisparkiet  
Engels: Brazilian Brown-throated Conure  
Duits: Brasilien-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen en de plaats waar de oren zitten is bruin.  
Ook de smalle voorhoofdsband is bruin..  
De kruin is dofblauw tot bijna in de nek.  
De nek zelf is bruin tot olijf en is Vrij dof.  
Het enige geel dat we bij deze aantreffen is een kleine gele vlek achter het oog.  
Rond het oog is er een witgrijze naakte oogring.  
De irisring is oranje rood.  
De iris zelf is zwart.  
De boven- en ondersnavel zijn zwart.  
De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen. De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt.  
De buitenste secundaire pennen zijn blauw.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.  
De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is bruin tot op de borst.  
Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.  
De buikkleur is volledig geelgroen.  
Ter hoogte van de inplanting van de dijen is deze wel bewolkt.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfgroen.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Inhoudsopgave

## Eupsittula pertinax paraensis

Nederlands: Para Maisparkiet  
Engels: Tapajés Brown-throated Conure  
Duits: Tapajés-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen zijn dofbruin.

De plaats waar de oren zitten is dit de doffe bruine overgaan naar een donkerbruine kleur. Het is de enige maisparkiet die geen voorhoofdsband heeft, maar direct de gekende blauwe kruinkleur.

Deze verandert boven de ogen al naar een donker groene kleur.

Rond het oog is er een vrij grote witgrijze naakte oogring.

Achter en onder het oog is een geel bandje aanwezig.

De irisring is oranje rood.

De iris zelf is zwart.

De boven- en ondersnavel zijn zwart.

De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.

De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt waardoor je een olijfkleur krijgt.

De buitenste primaire pennen zijn blauw tot donkergroen met een blauwe waas.

De vleugel zelf is toch vrij sterk geschubd.

De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.

De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is bruin. Dit bruin gaat over naar grijsbruin op de borst.

Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.

De buikkleur begint groen, maar richting de poten is deze sterk bewolkt.

Dat komt door de weinig aanwezige gele vlekken.

Deze zijn het sterkst op de dijnen en tussen de poten.

De dijnen zelf zijn groen

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula pertinax ocularis

Nederlands: Panama Maisparkiet (bruinoor maisparkiet)  
Engels: Brown-eared Conure  
Duits: Augentreif-Braunwangensittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

De wangen zijn dofbruin.

De plaats waar de oren zitten is dit een donkerbruine kleur.

Onder het oog is er een klein geeloranje bandje.

Er is een kleine voorhoofdsband in dezelfde donkere bruine kleur.

Daarachter is de kleur donkergroen.

Deze wordt wat lichter naar de nek toe.

Rond het oog is er een vrij grote witgrijze naakte oogring.

De irisring is oranje rood.

De iris zelf is zwart.

De boven- en ondersnavel zijn zwart.

De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.

De primaire pennen zijn niet echt zuiver van kleur maar bewolkt waardoor je een olijfkleur krijgt.

De buitenste primaire pennen zijn blauw tot donkergroen met een blauwe waas.

De vleugel zelf is toch vrij sterk geschubd.

De onderzijde van de vleugel is olijfgeel.

De dekveren zijn geelgroen.

### Lichaam

De keel is bruin tot op de borst.

Men heeft een mooie afscheiding tussen de borstkleur en de buikkleur.

De buikkleur is groen, maar richting de poten is deze een weinig bewolkt.

Dat komt door de weinig aanwezige gele vlekken.

De dijnen zijn eveneens groen

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is geel olijfkleurig.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula cactorum cactorum

Nederlands: Cactus parkiet  
Engels: Cactus Conure  
Duits: Kaktussittich

Grootte: 25 cm.

### Kop

Het voorhoofd is bruin, maar daarachter is de kruin blauw tot in de nek.  
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt bruin.  
De plaats waar de oren zitten is de kleur eerder groen.  
De grote oogring is wit.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De snavel is hoornkleurig.  
De ondersnavel is licht grijs.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De buitenste vliegpennen zijn blauw.

Op de onderzijde van de vleugel, de dekveren zijn geelgroen.  
De onderzijde van de vliegveren zijn grijs.

### Lichaam

Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt bruin.  
De buikkleur is oranjegeel.  
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik Vrij duidelijk.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen met aan het uiteinde een blauwe omranding.  
De onderzijde is olijfgeel.  
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

## Eupsittula cactorum caixana

Nederlands: Cactus parkiet of bleke Cactus parkiet  
Engels: Pale Cactus Conure  
Duits: Blasser Kaktussittich

Grootte: 25 cm

### Kop

Het voorhoofd is bruin, maar daarachter is de kruin blauw tot in de nek.  
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt olijfbruin.  
De plaats waar de oren zitten is de kleur eerder dof groen.  
De grote oogring is wit.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De snavel is hoornkleurig.  
De ondersnavel is licht grijs.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De buitenste vliegpennen zijn blauw.  
Op de onderzijde van de vleugel, de dekveren zijn geelgroen.  
De onderzijde van de vliegveren zijn grijs.

### Lichaam

Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.  
De buikkleur is geel.  
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen met aan het uiteinde een blauwe omranding.  
De onderzijde is olijfgeel.  
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)



## Eupsittula aurea aurea

Nederlands: Goudvoorhoofd parkiet  
Engels: Peach-fronted Conure  
Duits: Goldstirnsittich

Grootte: 26 cm.

### Kop

Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.

Daarachter is een blauwwazig gebied tot achter het oog.

Deze blauwe kleur vinden we ook terug rond het oog en ter hoogte van het oor.

Onder deze blauwe waas is de kleur groen.

De keel en de wangen zijn bewolkt olijfbruin.

Rond het oog is er een oranje ring.

De oog ring zelf is wit, maar zeer fijn.

De irisring is oranje.

De iris zwart.

**Opmerking:** de oranje ring rond de ogen moet volledig zijn.

Nochtans hoeft hij er niet te zijn, maar dan helemaal niet.

Het al of niet aanwezig zijn van deze ring zou te maken hebben met het feit dat de vogels in een buiten of binnen volière zitten.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.

De uiteinde van de primaire vleugelpennen en de primaire dekveren bezitten een blauwe waas.

De buitenste secundaire veren zijn blauw.

Op de onderzijde van de vleugel zijn de vleugelpennen geelgroen, de vliegveren zijn olijfgeel.

### Lichaam

Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.

De buikkleur is olijfbruin.

De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik is groener.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.

De onderzijde is geel olijfkleurig.

De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.

### Poten

Hier gekweekte vogels hebben een pootkleur die van vleeskleurig tot grijs gaat.

### Opmerking

Jonge vogels hebben minder blauw op de kop en is ook de voorhoofdsvlak minder intens.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula aurea major

Nederlands: Grote Goudvoorhoofd parkiet  
Engels: Greater Golden Crowned Conure  
Duits: Grosser-Goldstirnsittich

Grootte: 30 cm.

### Kop

Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.  
Daarachter is een blauwwazig gebied tot achter het oog.  
Deze blauwe kleur vinden we ook terug rond het oog en ter hoogte van het oor.  
Onder deze blauwe waas is de kleur groen.  
De keel en de wangen zijn bewolkt olijfbruin.  
Rond het oog is er een oranje ring.  
De oogring zelf is wit, maar zeer fijn.  
De irisring is oranje.  
De iris zwart.

**Opmerking:** de oranje ring rond de ogen moet volledig zijn.  
Nochtans hoeft hij er niet te zijn, maar dan helemaal niet.  
Het al of niet aanwezig zijn van deze ring zou te maken hebben met het feit dat de vogels in een buiten of binnen volière zitten.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De uiteinde van de primaire vleugelpennen en de primaire dekveren bezitten een blauwe waas.  
De buitenste secundaire veren zijn blauw.  
Op de onderzijde van de vleugel zijn de vleugelpennen geelgroen, de vliegveren zijn olijfgeel.

### Lichaam

Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbruin.  
De buikkleur is olijfbruin.  
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik is groener.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.  
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen..

### Poten

Hier gekweekte vogels hebben een pootkleur die van vleeskleurig tot grijs gaat.

### Opmerking

Jonge vogels hebben minder blauw op de kop en is ook de voorhoofdsvlek minder intens.

## Eupsittula nana astec

Nederlands: Aztekenparkiet  
Engels: Aztec Conure  
Duits: Aztekensittich

Grootte: 24 cm

### Kop

De kop is overwegend donkergroen met bruine stippen.  
De kin en de wangen hebben een lichte bruine waas.  
De bovensnavel is bij de inplanting eerder donkergrijs tot halfweg.  
Bij de ondersnavel heeft dit ook.  
Het puntje van de bovensnavel is zwart.  
Verder zijn de twee snaveldelen hoornkleurig.  
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De neusdoppen zijn vleeskleurig.

### Vleugels

De buitenste slagpennen zijn donkerblauw.  
Verder is de vleugel groen.  
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.

### Lichaam

De keel en de bovenzijde van de borst zijn olijfgroen tot bruin.  
Dit bruin loopt door tot tussen de poten.  
Naar de staart wordt de kleur donkergroen.  
De dijen zijn donkergroen..

### Staat

De bovenzijde van de staart is donkergroen.  
De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

## Eupsittula nana vicinalis

Nederlands: Oostelijke Aztekenparkiet  
Engels: Eastern Aztec Conure  
Duits: Ostlicher Aztekensittich

Grootte: 24 cm

### Kop

De kop is overwegend donkergroen met bruine stippen. De kin en de wangen hebben een lichte bruine waas.  
De bovensnavel is bij de inplanting eerder donkergrijs tot halfweg. Bij de ondersnavel heeft dit ook.  
Het uiterste puntje van de bovensnavel is zwart.  
Verder zijn de twee snaveldelen hoornkleurig.  
Rond het oog is er een vrij grote witte oogring.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De neusdoppen zijn vleeskleurig.

### Vleugels

De buitenste slagpennen zijn donkerblauw.  
Verder is de vleugel groen tot geelgroen.  
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.

### Lichaam

De keel en de bovenzijde van de borst zijn olijfgroen tot bruin.  
De buikstreek is geelgroen.  
Naar de staart wordt de kleur donkergroen.  
De dijen zijn donkergroen..

### Staat

De bovenzijde van de staart is donkergroen.  
De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula nana nana

Nederlands: Jamaicaparkiet  
Engels: Jamaican Conure  
Duits: Jamaikasittich

Grootte: 26 cm.

### Kop

De kop is overwegend donkergroen.  
De kin heeft een lichte bruine waas die naar de keel toe het groen gaat overheersen.  
De snavel, die voor de grote van de vogel vrij groot is, is hoornkleurig.  
De bovensnavel heeft bij de inplanting een licht grijze schijn.  
Bij de ondersnavel is dit duidelijker.  
Rond het oog is er een witte oogring.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De neusdoppen zijn haast niet te zien.  
Hetgeen zichtbaar is, vertoont een vleeskleur.

### Vleugels

De buitenste slagpennen zijn donkerblauw.  
Verder is de vleugel groen.  
De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.  
De onderzijde van de vleugel is olijfgroen.

### Lichaam

De keel en de bovenzijde van de borst zijn olijfgroen tot bruin.  
Deze kleur begint juist onder de kin en loopt tot de aarstreek.  
Daar wordt de kleur weer meer geelgroen.  
De dijen zijn donkergroen ter hoogte van de poot en worden olijfkleurig aan de billen..

### Staat

De bovenzijde van de staart is donkergroen.  
De onderzijde is olijfgeel.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

## Eupsittula canicularis canicularis

Nederlands: Petzparkiet  
Engels: Orange-fronted Conure  
Duits: Elfenbeinsittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.  
Daarachter hebben een blauwwazig gebied tot het oog.  
Achter deze blauwe waas is de kleur groen met een lichte blauwe waas.  
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt olijfbuin.  
De grote oogring is crèmekleurig wit.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De snavel is hoornkleurig.  
De ondersnavel is bij de basis zeer licht grijs.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De buitenste vliegpennen zijn blauw.  
Op de onderzijde van de vleugel is olijfgeelgroen.

### Lichaam

Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbuin.  
De buikkleur is geelgroen.  
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.  
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

### Opmerking

Er is niet direct een geslachtsonderscheid maar bij de poppen is meestal de oranje voorhoofdsvlek kleiner dan bij de mannen.

[Inhoudsopgave](#)

## Eupsittula canicularis eburnirostrum

Nederlands: Zuid-Mexicaanse Petz parkiet  
Engels: Eastern Mexican Petz's Conure  
Duits: Südmexikanischer Elfenbeinsittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

Het voorhoofd en het voorste deel van de kroon is oranje.  
Het oranje loopt maar juist tot boven het oog.  
Daarachter hebben een blauwwazig gebied tot achter het oog.  
Achter deze blauwe waas is de kleur groen met een lichte blauwe waas.  
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt olijfbroen.  
De grote oogring is crèmekleurig wit.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De snavel is hoornkleurig.  
De ondersnavel is aan de zijkanten licht grijs.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De buitenste vliegpennen zijn blauw.  
Op de onderzijde van de vleugel is olijfgeelgroen.

### Lichaam

Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt olijfbroen.  
De buikkleur is groen met een zeer lichte gele waas.  
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.  
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

### Opmerking

Er is niet direct een geslachtsonderscheid maar bij de poppen is meestal de oranje voorhoofdsvlak kleiner dan bij de mannen.

## Eupsittula canicularis clarea

Nederlands: West Mexicaanse Petz parkiet  
Engels: Orange-fronted Conure  
Duits: Elfenbeinsittich

Grootte: 24 cm.

### Kop

Het voorhoofd bezit een kleine oranje vlek.  
Deze oranje vlek loopt nooit tot boven de ogen.  
Daarachter hebben een blauw gebied tot achter het oog.  
Dit blauw vinden we ook terug tussen de oranje voorhoofdsvlak en de ogen en de bovensnavel.  
De nek is naar de rug toe groen maar met een blauwe waas.  
De keel, de wangen en de keelstreek zijn bewolkt groen.  
De grote oogring is crèmekleurig wit.  
De irisring is oranje.  
De iris is zwart.  
De snavel is hoornkleurig.  
De ondersnavel is aan de zijkanten zwart.

### Vleugels

De vleugels zijn groen.  
De buitenste vliegpennen zijn blauw.  
Op de onderzijde van de vleugel is olijfgeelgroen.

### Lichaam

Het bovenste gedeelte van de borst is bewolkt groen.  
De buikkleur is groen, licht bewolkt.  
De scheiding tussen het bovengedeelte van de borst en de buik vrij duidelijk.

### Staart

De bovenzijde van de staart is groen.  
De onderzijde is geel olijfkleurig.  
De dekveren van de onderzijde van de staart zijn geelgroen.

### Poten

De poten zijn grijs met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Aratinga auricapillus auricapillus

Nederlands: Goudkap aratinga  
Engels: Golden-capped Conure  
Duits: Goldscheitelsittich

Grootte: 30 cm.

### Kop

De strek boven de neusdoppen en de strek tussen de bovensnavel en het oog en rond het oog is rood.

Dit rood wordt op de kruin oranje.

Dit oranje loopt tot ongeveer de achterzijde van het oog. Naar de keel en borst toe wordt dit rood eveneens oranje tot geel, maar in dit oranje vinden we, hoe meer we naar de keel gaan, meer en meer groene veren.

Hetzelfde hebben we richting het oor.

Op gans de keel komen we verdwaalde oranje veren tegen.

Rond het oog is er een witte oogring.

De iris is bruin.

De boven- en ondersnavel zijn zwart.

De neusdoppen zijn haast niet te zien.

Hetgeen zichtbaar is, vertoont een zwart kleur.

### Vleugels

De buitenste slagpennen, de primaire en de secundaire dekveren zijn blauw.

Verder is de vleugel groen.

De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.

De onderzijde van de vleugel: de onderste dekveren zijn rood.

Verder is de onderzijde van de vleugel zwart.

### Lichaam

De keel en de bovenzijde van de borst zijn groen maar met een sterke grijze waas.

Vanaf de onderzijde van de borst naar de onderbuik is roodbruin.

Naar de vleugels toe en hoe lager op het lichaam wordt het wijnrood bruin.

Toch bedekt dit donkerrood niet de volledige onderbuik.

Men vindt steeds groene veertjes terug in dit donkerrood.

De aars strek is dan weerom donkergroen, licht geschubd.

### Staart

De bovenzijde van de staart is olijfkleurig met blauwe vlekken.

De onderzijde is zwart.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

## Aratinga auricapilla aurifrons

Nederlands: Groenstuit Goudkap parkiet  
Engels: Golden fronted Conure  
Duits: Goldkappensittich

Grootte: 30 cm. (toch heeft deze meer lichaamsbreedte, meer volume dan de nominaat)

### Kop

De strek boven de neusdoppen en de strek tussen de bovensnavel en het oog is rood. Dit rood wordt op de kruin iets lichter.

De kleur loopt tot ongeveer de achterzijde van het oog.

Rond het oog vinden we nog een kleine rode band, maar iets donkerder van kleur dan op de kruin.

De kaken en de rest van het hoofd is groen tot donkergroen.

Op de keel komen gele geeloranje vlekken voor.

Deze gele vlekken komen bijna niet voor op de wangen.

Rond het oog is er een kleine witbruine oogring.

De iris is bruin.

De boven- en ondersnavel zijn zwart.

De neusdoppen zijn haast niet te zien.

Hetgeen zichtbaar is, vertoont een zwart kleur.

### Vleugels

De buitenste slagpennen, de primaire en de secundaire dekveren zijn blauw.

Verder is de vleugel groen tot donkergroen.

De schouder is donkerder en sterker geschubd dan de rest van de vleugel.

De onderzijde van de vleugel: de onderste dekveren zijn rood.

Verder is de onderzijde van de vleugel zwart.

### Lichaam

De keel en de bovenzijde van de borst zijn donkergroen maar met een sterke grijze waas.

Vanaf de onderzijde van de borst naar de onderbuik is roodbruin.

Naar de vleugels toe en hoe lager op het lichaam wordt het bruine wijnrood.

Toch bedekt dit donkerrood niet de volledige onderbuik.

Men vindt steeds groene veertjes terug in dit donkerrood.

De aars strek is dan weerom donkergroen, licht geschubd.

### Staart

De bovenzijde van de staart is olijfkleurig met blauwe vlekken. De onderzijde is zwart.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

## Aratinga jandaya

Nederlands: Jendaya parkiet  
Engels: Jandaya Conure  
Duits: Jendayasittich

Grootte: 30 cm.

### Kop

De kopkleur is overwegend geel.

Rond de ogen en rond de basis van de bovensnavel tot aan het oog is het geel vervangen door een oranje tot rode kleur.

De intensiteit van dit oranje wordt groter naarmate de vogel ouder wordt.

Rond het oog is een grijze oogring, die soms wat lichter tot zelfs wit is aan het begin van de oogring.

De irisring is oranje, de iris zelf zwart.

De snavel zelf is zwart.

De neusdoppen zijn grijszwart.

### Vleugels

De bovenzijde van de vleugels is groen, zeer licht geschubd.

De buitenst primaire vleugelpennen en de secundaire vleugelpennen zijn blauw tot donkerblauw.

Op de onderzijde zijn de dekveren oranje rood.

De onderzijde van de vleugelpennen zijn zwart.

### Lichaam

De keel is geel. Dit geel gaat over naar oranje rood met gele vlekken op de borst.

De buik tot een uitloper tussen de poten is bloedrood.

Vanaf de inplanting van de poten naar de staart toe is de hoofdkleur groen, met flink wat gele en oranje vlekjes.

Dit vinden we ook op de dijnen terug.

### Staat

De bovenzijde van de staart is olijfgroen met blauwe aanslag.

De onderzijde is zwart.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)

### Opmerking

Jonge vogels laten veel meer groen zien.

Dit groen verdwijnt na ongeveer 18 maand.

De orangerode kleur komt dan ook pas echt tot zijn uiting en zal, naarmate de vogels ouder worden alleen maar toenemen aan intensiteit.

## Aratinga weddellii

Nederlands: Weddels parkiet  
Engels: Dusky-headed Conure  
Duits: Braunkopsittich

Grootte: 28 cm.

### Kop

De kopkleur is overwegend grijsbruin met een blauwige waas door de dofblauwe omranding van de kopveren.

Rond het oog is een brede witte oogring.

De irisring is geeloranje, de iris zelf zwart.

De snavel zelf is zwart.

De neusdoppen en de washuid vertonen een roze waas.

Deze roze waas is trouwens bij oudere vogels (en vooral de mannetjes) tussen de inplanting van de bovensnavel en de ogen ook terug te vinden.

Bij oudere vogels wordt ook de grijze kruin met een lichte blauwe waas bedekt, voornamelijk achter de ogen.

De snavel is zwart.

### Vleugels

De vleugel is groen tot olijfgroen.

De buitenste vleugelpennen zijn zwart met een blauwe omranding.

Verder zijn de vleugelpennen groen met een blauwe omranding.

De onderzijde is zwart.

### Lichaam

De borst is olijfgroen.

Naarmate men naar de onderbuik gaat wordt dit groen olijfgroen met een gele waas.

Tussen de poten is de kleur echter weer groen, te vergelijken met deze van de borst.

### Staat

De bovenzijde van de staart is groen door de groene basis, maar de kleur van deze staartveer loopt uit in het blauw.

De onderdekveren van de staart zijn groen met een gele omranding.

Verder is de staart aan de onderzijde zwart.

### Poten

De poten zijn grijsachtig met zwarte nagels.

[Inhoudsopgave](#)