

Standaard:

Europese Cultuurvogels

Deel 4: Europese duiven en grondvogels

Uitgegeven door: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

© Copyright by NBvV, Alle rechten voorbehouden

Uitgave: September 2015-2024

Revisie voorjaar 2024

INHOUD

INHOUD.....	2	HOLENDUIF:	16
EUROPESE PATRIJS	3	Kleuomschrijving: Holenduif	17
Kleuomschrijving Haan en hen:	5	Doffer.....	17
Europese patrijs haan	5	Duivin	17
Europese patrijs hen	5	HOUTDUIF	18
EUROPESE KWARTEL	6	Kleuomschrijving: Houtduif	19
Kleuomschrijving Haan en hen:	7	Doffer.....	19
Europese kwartel haan	7	Duivin	19
Europese kwartel hen	7	TURKSE TORTEL:	20
STEENPATRIJS	8	Kleuomschrijving: Turkse tortel:	21
Kleuomschrijving Haan en hen:	9	Doffer.....	21
Steenpatrijs haan	9	Duivin	21
Steenpatrijs hen	9	EUROPESE TORTEL:	22
RODE STEENPATRIJS	10	Kleuomschrijving: Europese tortel	23
Kleuomschrijving Haan en hen:	11	Doffer.....	23
Rode steenpatrijs haan	11	Duivin	23
Rode steenpartrijs hen.....	11	ROTSDUIF	24
CHUKAR PATRIJS	12	Kleuomschrijving Rotsduif	25
Kleuomschrijving Haan en hen:	13	Doffer.....	25
Chukarpatrijs haan wildkleur.....	13	Duivin	25
Chukarpatrijs hen wildkleur.....	13		
BARBARIJNSE PATRIJS	14		
Kleuomschrijving Barbarijnse patrijs:	15		
Haan	15		
Hen	15		

Bij het geslacht *Perdix* (gewone patrijs)

Patrijzen zijn middelgrote vogels die hun leefgedrag hebben afgestemd op het leven in grasvlakten. Ze komen voor in heel Europa en Azië. Haan en hen zijn niet gelijk van kleur.

P. perdix Europese patrijs
P. dauuricae Baardpatrijs

EUROPESE PATRIJS

Wetenschappelijke naam: *Perdix perdix*
Engels: Partridge, Common Partridge, European Partridge, Hungarian Partridge, Hun Partridge
Duits: Rebhun
Frans: Perdrix grise

Algemeen:
De geslachten zijn niet gelijk gekleurd.

Herkomst: Europa

Lengte: 30 cm.

Ringmaat: Zie vogelindex.nl NBV website

HAAN:

Kop en masker: Voorhoofd, zijkanten van de kop, de kin en de keel zijn oranje tot roestbruin van kleur. De oorstreek is donkerbruin met witte schachtstrepen. Schedel en nek zijn geelbruin met, hier en daar zichtbaar, zwartachtig gekleurde veerbases en smalle geelachtig gekleurde schachtstrepen

Bovenlichaam: Bovenrug lichtgrijs met zwarte golfjesteekening. De veren van ellebogen, schouders en de bovenvleugeldekveren zijn lichtgrijs met smalle, duidelijk afgetekende geelachtig gekleurde schachtstrepen met kastanjebruine en zwarte veerbasis. De uiteinden van de veren vertonen een zwakke zwarte golfjesteekening. Onderste gedeelte van de rug, de stuit en bovenstaartdekveren lichtgrijs met een bruinachtig waas met een naar achteren toe sterker wordende tekening van zwartbruine golfjes. Vlak voor het uiteinde laten de veren een donker kastanjebruin patroon zien in de vorm van een pijlpunt.

Onderlichaam: De borst en zijkanten van de hals zijn lichtgrijs met een zwakke tekening van zwarte dwarsgolfjes. De flankveren en veren aan de zijkanten van de borst hebben brede kastanjebruine banden vlak bij het uiteinde van de veer. Naar achter toe hebben deze veren witte schachtstrepen. In het midden van het bovenstuk van de onderbuik bevindt zich een grote donker kastanjebruin gekleurde hoefijzervormige vlek. Het midden van de buik is witachtig.

Kleine en grote slagpennen: Dekveren van de grote slagpennen en de grote slagpennen zelf zijn donker grijsbruin met een zwakke bleek bruinachtige golfjesteekening, vaak niet meer dan enkele vlekken. De kleine slagpennen vertonen een kriebelachtig patroon op de roodachtig gekleurde buitenvanen en veeruiteinden en de lichter gekleurde binnenvanen. Oksels en ondervleugeldekveren wit, aan de kanten van het lichaam en de vleugelbocht fijn donkergrijs gestippeld.

Staart: De twee middelste staartpennen zijn geelbruin met kastanjebruin gekleurde schachtstrepen en een dichte en onregelmatige bruinzwarte golfjesteekening. Het ernaast liggende paar staartpennen heeft gelijk getekende uiteinden en zijranden; voor het overige gelijk gekleurd aan de overige pennen, namelijk eenkleurig roodachtig kastanjebruin met smalle lichte eindranden.

Snavel, ogen, poten: Snavel hoornkleurig met een groen waas; iris grijsbruin; oogring leigrijs. Onder en achter het oog bevinden zich dieprood gekleurde naakte huidvlekken. Deze vlekken zijn buiten het broedseizoen kleiner van formaat. Vergeleken met de haan is de kop meestal wat bleker van kleur, meer geelachtig roestbruin. De bovenkop heeft bredere ei- of druppelvormige schachtvlekken, welke vlekken ingebed liggen in lichter grijs of witachtiger gekleurde veervelden. Oorstreek zwartbruin met bredere witte schachtstrepen.

Bovenlichaam: Hals en de hele bovenzijde zijn bruiner dan bij de haan en hebben een meer of minder sterk patroon van geelachtige schachtstrepen of schachtvlekken en hier en daar geelbrune dwarsbanden. De dwarsbanden vlak bij het uiteinde van de pennen zijn donker- tot zwartbruin, maar slechts zelden even duidelijk als bij de haan.

[Terug naar index](#)

- Onderlichaam:** De kleur en tekening van onderlichaam lijken op die van de haan. De borst is echter niet zo zuiver grijs als bij de haan, maar vertoont een geelachtig waas; het midden van het onderste gedeelte van de borst is wit. De hoefijzervormige vlek bij de haan wordt bij de hen slechts aangeduid door een aantal kastanjebruine veren en is vaak zelfs niet aanwezig.
- Kleine en grote slagpennen:** Slagpennen hetzelfde gekleurd als bij de haan. De grote vleugeldekveren idem. De ellebogen, de schouderveren, de middelste en kleine vleugeldekveertjes zijn minder kastanjebruin gekleurd met donkerbruine tot zwart gekleurde veerbasis en bleek bruinachtige dwarsbanden.
- Snavel, ogen, poten:** Naakte huidpartijen rond de ogen hetzelfde gekleurd als bij de haan.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving Haan en hen:

Soort:	Europese patrijs haan	Europese patrijs hen
Voorhoofd en bovenschedel	Schedel en nek zijn geel bruin	Wat bleker dan de haan
Achterschedel en nek	Bruiner dan schedel naar achteren lopend	Wat bleker dan de haan.
Mantel	Overwegend bruin met crème omzoming aan veren.	Wat donkerder bruin metb wat minder tekening aan veren.
Rug en stuit	Bruin met lichte omzoming stuit grijs met bruine waas.	Kleur wat bleker als haan en minder tekening
Borst	Grijs met een zwakke tekening. Op onderborst een hoefijzer tekening kastanje bruin van kleur	Grijs met een wat gele waas. Hoefijzer tekening bijna tot niet aanwezig.
Onderlijf	Vuil wit.	Vuil wit
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Vuil wit.	Vuil wit
Vleugel dekveren	Grijs bruin	Wat lichter van tint als de haan.
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Overwegend bruin, bruin tot in top.	Gelijk de haan.
Vleugelpennen, binnenvlag	Grijs bruin naar binnen toe lichter wordend.	Gelijk de haan.
Bovenkant staart	Warm bruin.	Gelijk de haan.
Onderkant staart	Wat lichter bruin	Gelijk de haan.
Snavel	Hoornkleurig met wat groene waas	Gelijk de haan.
Neusdoppen	Gelijk snavel kleur.	Gelijk de haan.
Ogen	Donker rood bruin Rond ogen een naakte rode ring	Gelijk de haan.
Iris	Grijs bruin	Gelijk de haan.
Poten	Licht hoornkleurig	Gelijk de haan.
Nagels	Hoorn kleurig	Gelijk de haan.
Tekening:		
Vleugeltekening	Op vleugels bestreping crème van kleur	Tekening zwakker dan bij de haan.
Oogring	Leigrijs	Gelijk de haan.
Staart	Verticale tekening bruin van kleur.	Gelijk de haan.
Flanken	Kastanje bruine bandjes aan uiteinde van de veren.	Wat minder sprekend.

[Terug naar index](#)

EUROPESE KWARTEL

Bij het geslacht *Coturnix* (europese kwartel)

Kleine kwartels die leven in grasachtige gebieden in de gehele Oude Wereld (Afrika, Europa, Azië).

Ze dragen geen sporen.

De vleugels zijn niet afgerond maar wat spits.

De meeste van deze kleine kwartels leiden een nomadisch bestaan.

Wetenschappelijke naam:	<i>Coturnix coturnix</i>
Engels:	Quail, European Quail, Common Quail
Duits:	Wachtel
Frans:	Colin, Caille des blés

Algemeen:

Haan en hen vrijwel gelijk gekleurd. Tekening en kleur kunnen tussen de verschillende exemplaren behoorlijk verschillen.

Herkomst: Europa, Azië

Lengte:	16 - 18 cm
Ringmaat:	Zie vogelindex.nl NBvV website

HAAN:

Schedel: Veren van de schedel zwart met brede roestbruine uiteinden; over het midden van de schedel loopt een roomkleurige streep.

Kop: Boven het oog loopt vanaf het voorhoofd tot boven de zijkanten van de bovenkop een beigewitte band. De teugels zijn vooraan wit en bij het oog bruin. Onder oog en oorstreek loopt een bruine streep. Verder zijn zijkanten van kop en keel wit; door deze witte veren loopt een roestbruin tot zwart gekleurde streep die begint onder de oorstreek en een gelijk gekleurde parallel lopende band die achter het oog begint en de keel omsluit maar aan de voorkant vaak niet of slechts ten dele aansluit op de band die aan de andere kant van de kop begint.

Keel en kin: Keelzijden en de ruimte tussen de keel omsluitende band en de keelvlek is wit. De keelvlek zelf is min of meer driehoekig en roodbruin of zwart gekleurd en in grootte variabel bij de verschillende individuele exemplaren. Tekening en kleur verschillen dan ook behoorlijk tussen de verschillende exemplaren.

Bovenlichaam: Bovenrug en schouders roestbruin of roodachtig bruin; de meeste veren hebben een tamelijk brede, naar het uiteinde spits uitlopende, geelachtig beige schachtstreep die zwart omzoomd is. Bovendien grotere, onregelmatig gevormde zwarte vlekken. Vaak zijn deze zwarte vlekken en lichtbruine dwarsstrepen alleen zichtbaar op één van de vanen. De zijkanten van de rug hetzelfde gekleurd als bovenrug en schouders. Het midden van de rug is zwart met roestbruine of geelbruine smalle, vaak winkelhaakvormige "dwarsverbindingen" en krabbelachtige patronen.

Bovenstaartdekveren: Bovenstaartdekveren donkerbruin met roomkleurige schachten en dwarsstrepen.

Onderlichaam: Krop en bovenste gedeelte van de borst roestbruin met witte schachtstrepen. De rest van het onderlichaam is wit. Het midden van de buik toont een duidelijk beige-geel waas. Zijden roodbruin met brede witte schachtstrepen en meestal enkele donkerbruin vlekken.

Vleugels: Grote slagpennen bruin. De binnenste met zacht beige buitenzoom. De rest met vale roodachtige bruine dwarsstrepen op de buitenvanen. Kleine slagpennen eveneens met roodachtig bruine dwarsstrepen, maar dan op de binnen- én de buitenvanen. De binnenste kleine slagpennen met duidelijk lichte schachtenstrepen en zwarte vlekken. Vleugeldekveren bruin met lichtbeige dwarsstreepjes.

Staat: Donkerbruin met roomkleurige schachten en dwarsstreepjes. Onderstaartdekveren roomkleurig.

Ogen, snavel, poten: Iris donkerbruin tot roodbruin; snavel hoornkleurig bruin met zwartbruine punt. De basis van de ondersnavel vleeskleurig tot bruinachtig. Poten bleek geelachtig vleeskleurig tot licht geelbruin.

HEN:

Formaat: Iets groter dan de haan

Kop: Zijkanten van de kop bruinachtig wit; keel roomkleurig, bijna wit. Krop laat meer of minder uitgebreid zwartbruine vlekjes in de lengterichting.

Bovenlichaam: Gelijk gekleurd aan haan

Vleugels: Gelijk gekleurd aan haan

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving Haan en hen:

Soort:	Europese kwartel haan	Europese kwartel hen
Voorhoofd en bovenschedel	Donkerbruin met lichte bestreping, crème witte wenkbrauwstreep die op de snavelbasis begint.	Donkerbruin met lichte bestreping, crème witte wenkbrauwstreep die op de snavelbasis begint.
Achterschedel en nek	Donker bruin met lichte bestreping.	Donker bruin met lichte bestreping.
Mantel	Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Hier tussen geel/bruine schachtstrepen die in een punt uitlopen en er zo het lijkt bovenop liggen.	Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Hier tussen geel/bruine schachtstrepen die in een punt uitlopen en er zo het lijkt bovenop liggen.
Rug en stuit	Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Stuit gelijk de aan rugkleur.	Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Stuit gelijk aan de rugkleur.
Borst	Roestbruin met een lichte omzoming.	Roestbruin met een lichte omzoming.
Onderlijf	Wat lichter bruin dan borst.	Wat lichter bruin dan borst.
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Licht beige, roomkleurig	Licht beige, roomkleurig
Vleugel dekveren	Bruin met licht beige streepjes.	Bruin met licht beige streepjes.
Vleugelpennen	Donkerbruin.	Donkerbruin.
Bovenkant staart	Bruin met een lichte omzoming	Bruin met een lichte omzoming
Snavel	Bruin/grijs	Bruin/grijs
Ogen	Donkerbruin	Donkerbruin
Iris	Donkerbruin	Donkerbruin
Poten	Vleeskleurig	Vleeskleurig
Nagels	Vleeskleurig en allen gelijk van kleur	Vleeskleurig en allen gelijk van kleur
Groote	15 tot 16 cm niet groter.	15 tot 16 cm niet groter.
Tekening:		
Onder de ogen	Crème witte streep	
Keelvlek	Beige met anker vormige tekening afgelijnd met een donkerbruin tekening. Hieronder een boogvormige keel band.	Bezit geen keelvlek wel de donkerbruine afgetekende keelband
Keurtechnische aanwijzingen	<p>Vogel zal een wat gedrukte houding geven die eigen is aan de soort. Komen voor met kruising van de Japanse kwartel, deze zijn echter te groot en te vol van lichaam en moeten we echt straffen.</p> <p>Mutanten worden niet gevraagd.</p>	<p>Hen over algemeen tint lichter ven kleur en in de flanken minder bruin.</p> <p>Mutanten worden niet gevraagd.</p>

[Terug naar index](#)

Bij het geslacht *Alectoris* (Steenpatrijzen)

Midden grote tot grotere patrijsachtigen die alle roodgekleurde poten hebben. Bovendelen zijn meestal grijsachtig gekleurd; de zijanten en flanken vertonen een duidelijk zichtbare zwart-bruin-witte streeptekening. De oogring is oranje tot rood gekleurd.

Steenpatrijzen komen voor in Europa, Azië en het Arabisch schiereiland.

Hanen en hennen lijken doorgaans erg veel op elkaar. Deze patrijsachtigen dragen geen sporen, maar wel afgeronde knobbels op de plaats waar doorgaans de sporen zitten. Bij de haan zijn deze knobbels wat duidelijker.

Steenpatrijzen stellen weinig eisen aan hun verzorging; ze kunnen vrij tam worden, terwijl ze vrij goed fokken.

In avicultuur wordt met name de Chukarpatrijs tentoongesteld.

<i>A. barbara</i>	Barbariïse patrijs
<i>A. chukar</i>	Chukar patrijs
<i>A. graeca</i>	Steenpatrijs
<i>A. rufa</i>	Rode steenpatrijs

STEENPATRIJS

Wetenschappelijke naam: *Alectoris graeca*

Engels: Rock Partridge, Greek Partridge

Duits: Alpensteinhuhn, Steinhuhn

Frans: Perdrix bartavelle

Algemeen:

De geslachten zijn gelijk gekleurd.

Herkomst: Alpen, Midden en Zuid-Italië, Sicilië, Joegoslavië, Griekenland, West- en Zuid-Bulgarije.

HAAN en HEN:

Lengte: 32-35 cm.

Ringmaat: [Zie vogelindex.nl](http://vogelindex.nl) NBvV website

Kop en masker: Bovenkop leigrijs; naar achteren toe worden de bruinachtige eindzomen steeds breder. Onderlangs de grijze bovenkop loopt een smalle witachtige band vanaf het voorhoofd boven langs het oog en de oorstreek naar achteren. Een zwarte voorhoofdsband loopt boven over het oog naar achteren door de oorstreek en

buigt achter de wangen en de halszijden naar beneden, langs de keel naar de borst, waar beide banden bij elkaar komen. De zwarte band worden naar beneden toe steeds breder. Aan de basis van de ondersnavel bevindt zich een zwarte vlek (sikje). Aan de onderzijde van de snavelin-plant bevindt zich eveneens een zwarte vlek. De oorstreek bij de steenpatrijs is hoofdzakelijk zwart met een smal lang roodachtig geel tot bruin streepje in tegenstelling tot die van de Chukarpatrijs die roodbruin is.

Bovenlichaam:

De schouderveren meer of minder fel lila tot wijnrood met grijze of bruinachtige randen; het gedeelte van de buitenvanen dicht bij de schacht is leigrijs. De dekveren van de grote slagpennen hebben grijsbruine buitenvanen met een lichte tekening van roomkleurige stipjes; de binnenvanen zijn grijs. De rest van de dekveren is blauwgrijs met bruinviolette omzoming. De veren van het bovenste gedeelte van de rug zijn meer of minder fel lila tot wijnrood met in de richting van de benedenrug steeds breder wordende grijze of bruinachtige randen. Het onderste gedeelte van de rug, stuit en bovenstaartdekveren is grijs met een bruin waas.

Onderlichaam:

De borst is leigrijs met lila tot wijnrood gekleurde veerranden. De buik is geelachtig tot roomkleurig met een bruin waas. De anaalstreek is lichter roomkleurig met een grijs waas. Flankbevedering blauwgrijs; het buitenste gedeelte is gebandeerd. Een tot 3 mm brede zwarte band wordt afgewisseld door een 13 tot 15 mm brede witte tot roomkleurige strook en een wat bredere zwarte band. De uiteindelijke rand van de flankveren is circa 7 mm breed en kastanjebruin gekleurd.

Kleine en grote Slagpennen :

Grote slagpennen bruin met roomkleurige veerschachten en strogele zijstreepjes op de buitenvaan. Kleine slagpennen grijs tot grijsbruin; het uiteinde van de buitenvanen heeft een witte tot roomkleurige zoom.

Staart:

De staartpennen zijn roestkleurig; de buitenste zijn aan de basis tot circa 1/3 gedeelte van hun lengte asgrijs; de pennen verder naar het midden toe zijn ongeveer voor de helft asgrijs. De twee middelste paren zijn helemaal asgrijs. Onderstaartdekveren roomkleurig met een geelachtig tot bruinachtig waas.

Ogen, snavel, poten:

Snavel diep rood; de oogring en een vlek achter het oog zijn oranjerood tot rood gekleurd. Oogleden lichtblauw; iris roodbruin. Poten roodbruin; de achterzijde van het loopbeen heeft korte sporen.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving Haan en hen:

Soort:	Steenpatrijs haan	Steenpatrijs hen
Voorhoofd en bovenschedel	Blauw grijs	<p>Beide zijn in kleur en tekening bijna gelijk.</p> <p>Maar de haan is wat meer uitgesproken in kleur.</p> <p>De borstkleur is wat helderder grijs.</p> <p>Bovendien is de haan meestal een fractie groter.</p>
Achterschedel en nek	Blauw grijs	
Mantel	Blauw grijs met een wijnrode tint	
Rug en stuit	Grijs met bruine waas	
Borst	leigrijs	
Onderlijf	Wat lichter grijs	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Licht roomkleurig	
Vleugel dekveren	Grijs met een wat bruine waas	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Bruin met wat lichtere schachten	
Vleugelpennen, binnenvlag	Tint lichter	
Bovenkant staart	Roestkleurig buitenkant wat grijs	
Onderkant staart	Roomkleurig	
Snavel	Diep rood	
Neusdoppen	Wat lichter rood	
Ogen	Rood	
Iris	Wat donkerder rood	
Poten	Rood bruin	
Nagels	Wat rood hoornkleurig	
Tekening:		
Vleugeltkening	Op grote slagpennen lichte roomkleurige stippen	
Oogring	Oranje rood	
Staart	Bijna geen tekening	
Flanktekening	Ondergrond grijs met daarop banden die roomkleurig zijn aan. Weerzijde zijn deze banden afgezet door zwarte band	
Koptekening	Net boven oog een zwarte band die naar voren wat breder is en onder de snavel doorloopt als een zwarte kinvlek.	

[Terug naar index](#)

RODE STEENPATRIJS

Wetenschappelijke naam: *Alectoris rufa*
Engels: Red-legged Partridge, French Partridge
Duits: Rothuhn
Frans: Perdrix rouge

Algemeen:
Beide geslachten zijn hetzelfde gekleurd. Wordt ook wel Rode Patrijs genoemd.

Herkomst: Frankrijk, Corsica, Spanje, Portugal, Noordwest-Italië. Verder zijn deze patrijsachtigen uitgezet op de Azoren, Madeira, Gran Canaria, de Baleraren en in Groot-Brittannië.

HAAN en HEN:

Lengte: 32 tot 34 cm

Ringmaat: Zie vogelindex.nl NBvV website

Kop en masker: Het voorste gedeelte van de schedel is blauwgrijs; het midden van de schedel bruin, in de nek overgaand in roodbruin. Onder langs de kleurrijke bovenkop loopt een witte band vanaf de snavelbasis boven langs de ogen en de oorstreek naar de nek. De teugels, een smalle streep boven de ogen, een kleine kinvlek en een vlek onder de basis van de ondersnavel zijn zwart. Kin, keel en wangen beigewit, omgeven door een brede zwarte band die het onderste gedeelte van de oorstreek zwart kleurt en naar beneden achter langs wangen en hals naar de voorzijde van de keel trekt. Het bovenste gedeelte van de oren is roodbruin; de hals is opzij parelgrijs met zwarte streepjes in de lengterichting.

Bovenlichaam: Mantel, zijkanten van de krop zijn kaneelkleurig bruin; de rest van het bovenlichaam, de vleugeldekveren, dekveren van de kleine slagpennen zijn donker olijfgrijs; dit grijs is op de stuit zuiverder grijs van kleur.

Onderlichaam: De zwarte band die om de wangen en de hals naar de keel loopt, verbreedt zich in het midden van de krop tot een zwarte slab die in de richting van de borst als het ware "wegloopt" in een groot aantal grotere zwarte vlekken. De borst is blauwgrijs. De buik, tot aan de onderstaartdekveren, de dijen en het onderste gedeelte van de flanken zijn donker oranjebruin. De flanken zelf zijn opvallend geelachtig crème met zwarte en kastanjebruine dwarsbanden

Kleine en grote slagpennen:

Grote slagpennen donker sepiagrijs tot zwart; de zomen van de buitenvanen zijn geelachtig beige. De basis van de vanen van de buitenste grote slagpennen zijn beige en met een bruin waas overtrokken en overdekt met donkere stippeltjes. De kleine slagpennen zijn donker olijfgrijs met isabelbeige omzoming van de buitenvanen.

Staat: Middelste staartveren donker grijs; overige staartpennen roodbruin. Onderstaartdekveren licht grijsbruin met een isabelbeige waas.

Ogen, snavel, poten: De snavel en de washuid rondom het oog is koraalrood. De iris is lichtbruin. De poten zijn koraalrood tot karmijnrood. De voetzolen zijn geel gekleurd.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving Haan en hen:

Soort:	Rode steenpatrijs haan	Rode steenpartrijs hen
Voorhoofd en bovenschedel	Bruin naar achteren wat rood bruin. Net boven oog een witte streep die doorloopt tot in de nek	De Hen is in kleur en tekening gelijk aan de haan.
Achterschedel en nek	Rood bruin nek zilvergrijze ondergrond met daarop een zwarte tekening deze loopt door rond de borst	
Mantel	Net onder de zwarte tekening wat rood bruin de mantel zelf grijs met een bruine waas.	
Rug en stuit	Grijs met een bruine waas	
Borst	Onder de zwarte tekening nog wat bruin grijs	
Onderlijf	Grijs wat bruine waas	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Bruin met donker, onderstaart veren okergeel	
Vleugel dekveren	Bruin grijs	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Bruin grijs met een buiten rand die iets donkerder is.	
Vleugelpennen, binnenvlag	Wat lichter en geen donkere rand	
Bovenkant staart	Rood bruin	
Onderkant staart	Bruin tot okergeel	
Snavel	Rood	
Neusdoppen	Rood	
Ogen	Bruine ogen met een rode oogrand	
Iris	Donker bruin	
Poten	Rood	
Nagels	Wat donkerder, meer hoorn kleurig	
Tekening:		
Vleugeltekening	Geen tekening op vleugels	
Oogring	Rood	
Staart	Geen tekening	
Flanken	Kastanje bruine strepen aan de voorzijde wat donkerder met een grijze kleur tussen de bestreping	
Opmerking	Haan laat een eerste aanzet van spoorvorming zien op binnenzijde van loopbeen	Hen heeft geen spoor vorming aan de binnenzijde van het loopbeen.

[Terug naar index](#)

CHUKAR PATRIJS

Wetenschappelijke naam: *Alectoris chukar*
Engels: Chucor Partridge, Chukar Partridge
Duits: Chukarhuhn, Chukar Steinhuhn
Frans: Perdrix chukar

Algemeen:
Beide geslachten hetzelfde gekleurd.
Wordt ook wel Europese Steenpatrijs genoemd.

Herkomst: Balkanstreek; Nabije Oosten, Kaukasië, Iran, Verre Oosten.
Inmiddels ook ingeburgerd in Europa: Groot-Brittannië, Zuid-Frankrijk en Italië.

Lengte: 38 cm.
Ringmaat: [Zie vogelindex.nl](http://vogelindex.nl) NBvV website.

HAAN en HEN:

Kop en masker: Voorhoofd grijsachtig bruin, naar de schedel toe wijnrood gekleurd en naar het achterste gedeelte van de nek overgaand in bruinachtig grijs. Vlak achter de bovensnavel loopt een vrij brede zwarte voorhoofdsband tot aan het oog en een heel smal strookje zwart boven en onder het oog, naar achteren toe weer in een brede band dwars over de oorstreek achter langs de wangen naar beneden in de richting van de keel waar beide steeds breder wordende banden bij elkaar komen in de kropstreek. Een grijsachtig witte band loopt vanachter de zwarte voorhoofdsband over het oog naar achteren tot achter het oor. De teugels, keel, kin en wangen zijn beigeachtig wit. Aan de snavelbasis bevindt zich een duidelijke afstekend zwart vlekje; eenzelfde zwart vlekje bevindt zich in het midden van de keel, vlak onder de snavelinplant (a.h.w. een sikje vormend). De oorstreek zelf is roodbruin.

Bovenlichaam: Rug en schouders wijnrood. Het onderste gedeelte van de rug, de stuit en de bovenstaartdekveren zijn blauwgrijs met brede, grijsbruine veerzomen. De buitenste schouderveren hebben een lichtgrijs middenstuk; de kleine en middelste vleugeldekveren zijn blauwgrijs met brede grijsbruine veerzomen; de buitenste vleugeldekveren zijn bruingrijs.

Onderlichaam: De borst is licht blauwachtig grijs; de toppen van de borstveren hebben een brede grijsbruine zoom. Naar de zijken van de borst krijgt het grijs een meer of minder roodachtig bruin waas. Het onderste gedeelte van de borst is bijna zuiver grijs. Onderbuik, anaalstreek en dijen roestachtig beige. Het niet zichtbare gedeelte van de flankbevedering is grijs; naar het uiteinde toe bevinden zich twee zwarte dwarsbanden die onderbroken worden door een bredere isabelkleurige band. Het uiteinde van de flankveren is roodbruin gezoomd.

Kleine en grote slagpennen: Binnenste kleine slagpennen blauwgrijs met brede grijsbruine veerzomen; Buitenste kleine slagpennen en grote slagpennen bruin met een isabelgele vlek in het midden van de buitenvanen. e stuurpennen zijn grijsbruin; met uitzondering van de middelste staartpennen zijn de onderste veerhelften kastanjebruin.

Staat: De snavel is diep rood; de naakte oogring is karmijnrood; de iris is lichtbruin of roodbruin; de poten koraalrood tot dieprood

Ogen, snavel, poten:

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving Haan en hen:

Soort:	Chukarpatrijs haan wildkleur	Chukarpatrijs hen wildkleur
Voorhoofd en bovenschedel	Blauw grijs	De hen is gelijk als de haan wel kan deze iets kleiner zijn en mist de aanzet van sporen op het loopbeen
Achterschedel en nek	Blauw grijs	
Mantel	Nek blauw grijs verder naar onder met een bruine waas.	
Rug en stuit	Blauw grijs met bruine waas.	
Borst	Blauw grijs met een rood bruine waas.	
Onderlijf	Roest bruin	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Beige	
Vleugel dekveren	Bruin beige	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Bruin beige	
Vleugelpennen, binnenvlag	Bruin beige	
Bovenkant staart	Donker bruin.	
Onderkant staart	Donker bruin.	
Snavel	Rood	
Neusdoppen	Rood	
Ogen	Bruin	
Iris	Bruin	
Poten	Rood	
Nagels	Hoornkleurig	
Tekening:		
Vleugeltekening	Geen	
Oogring	Rood	
Staart	Geen tekening	
Flanken	Zwart en kastanje bruin tekening op een licht grijze ondergrond.	
Opmerking	Deze lijkt veel op de Europese steen patrijs maar de koptekening loopt boven over de snavel door en bij de steen patrijs onder het oog naar voren op de snavel inplant	

[Terug naar index](#)

BARBARIJNSE PATRIJS

Wetenschappelijke naam: *Alectoris barbara*
Engels: Barbary Partridge
Duits: Klippenhuhn, Felsenhuhn
Frans: Perdrix gabra

Algemeen:

Beide geslachten gelijk gekleurd. Wordt ook wel Baardpatrijs genoemd.

Herkomst: Noord-Afrika, Canarische eilanden, Sardinië, Zuid-Spanje.

Lengte: 32 cm.

Ringmaat: [Zie vogelindex.nl](http://vogelindex.nl) NBvV website

HAAN en HEN:

Kop en masker: Een brede band loopt vanaf het midden van de bovensnavel over het midden van het voorhoofd, de schedel naar de nek en is donker roodbruin gekleurd tot bijna zwart aan de zijkanten van de schedel en de nek, en iets lichter van tint op het midden van de schedel. Wangen asgrijs, evenals een brede band die vanaf de teugels over de ogen naar de zijkanten van het achterhoofd loopt. Deze band is het donkerst gekleurd boven de ogen. De oorstreek is donker roestrood. De Baardpatrijs heeft een kenmerkende wit gespikkelde donkerroodbruine halsband die het breedste is opzij van de hals en in de keel bij elkaar komt.

Kin en keel: Kin en keel asgrijs, naar de keel toe in wit overgaand.

Bovenlichaam: Mantel, rug en stuit zijn donkergrijs met een olijfbroen waas aan het uiteinde van de veertjes van mantel, zijkanten van de krop en de rug. Die van stuit en bovenstaartdekveren hebben een leigrijs waas aan het uiteinde. De buitenste kleine vleugeldekveertjes zijn roodachtig kaneelkleurig en in het midden duidelijk afstekend lichtblauw. Binnenste vleugeldekveren, onderste schouderveren en de dekveren van de kleine slagpennen licht grijsbruin, waarbij de buitenvanen een leigrijs waas vertonen. De grote vleugeldekveren en de dekveren van de grote slagpennen vertonen een isabelkleurig waas. Enkele van de binnenste vleugeldekveren zijn in het midden lichtblauw; een aantal grote vleugeldekveren en dekveren van de kleine slagpennen vertonen wat zwartachtige stipjes.

Onderlichaam: De borst is asgrijs; de kropstreek is in het midden wat lichter grijs dan opzij. De flanken vertonen een typische tekening van zwarte, witte en roestachtig kaneelbruine banen; elke veer heeft witte en kaneelbruine banden, waarbij het witte en buitenste brede kaneelbruine gedeelte gescheiden wordt door een circa 2 mm brede zwarte band. Het midden van de veren is licht blauwgrijs, door een smalle donkere band (die vaak ontbreekt) gescheiden van de rest van het roodachtig kaneelkleurige gedeelte van het middenstuk van de veer. De borst vertoont in het midden een brede vlek met een roseachtige kaneelkleur. De rest van het onderlichaam is roodachtig beige. De anaalstreek laat een grijs waas zien.

Kleine en grote slagpennen: Grote slagpennen donker sepiagrijs tot zwart. De zomen van de buitenvanen zijn beigegeel; de basis van de vanen van de grote slagpennen is smoezelig beigeachtig bruin met donkere stippen. Kleine slagpennen donker olijfachtig grijs met een beige waas en zachte donkere stipjespatroon langs de buitenste zomen. Schouderveren lichtgrijs met beige zomen en uiteinde.

Staart: Onderstaartdekveren kaneelkleurig met een roodachtig waas. Middelste staartpennen en de basis van de andere staartpennen is donker leigrijs, maak met donkere stippentekening. De overige staartpennen zijn roodbruin gekleurd.

Ogen, snavel, poten: De snavel is karmijnrood of oranjerood, naar de punt toe overgaand in geel. De naakte oogring is bleek oranjerood; de iris is licht- tot roodbruin. De poten zijn donkerrood.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving Barbarijnse patrijs:

Soort:	Haan	Hen
Voorhoofd en bovenschedel	Kastanje bruine band. Naast deze band een tot op het oog een zilver grijze band die uitloopt in vuil wit. Achter de ogen (oorstreek) een roest bruine oog streep.	Gelijk de haan maar geen enkele vorm van spoorvorming.
Achterschedel en nek	Kastanje bruine band	
Mantel	Blauw grijs	
Rug en stuit	Blauw grijs	
Borst	Wat lichter bouw grijs dan mantel	
Onderlijf	Bruin met een wat gele waas.	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Bruin met een wat gele waas.	
Vleugel dekveren	Blauw grijs	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Blauw grijs naar de buiten kant toe wat rood bruin.	
Vleugelpennen, binnenvlag	Blauw grijs	
Bovenkant staart	Grijs met een bruine waas.	
Onderkant staart	Bruin met een wat gele waas.	
Snavel	Rood	
Neusdoppen	Rood	
Ogen	Bruin	
Iris	Bruin	
Poten	Rood met lichte aanzet van sporen.	
Nagels	Hoornkleurig	
Tekening:		
Vleugeltkening	Geen tekening	
Oogring	Rood	
Staart	Geen tekening	
Flanken	Kastanje bruin met zwart afgezette dwars strepen op een ondergrond die vuil wit is	
Hals	Rond hals en nek een band met helder witte stippen op een donker kastanje bruine ondergrond.	

[Terug naar index](#)

Holenduif:

Wetenschappelijke naam: *Columba oenas*

Nederlands: Holenduif
Engels: Stock-dove
Duits: Hohltaube

Familie: Duiven (Columbidae)
Grootte: 28 tot 32 cm
Biotoop: Bossen en parken (holenbroeder)
Herkomst: Het gehele jaar door aanwezig

Algemeen:

De holenduif lijkt veel op de rotsduif, maar is te onderscheiden door het ontbreken van de witte stuit. In de vlucht vallen de zwarte vleugelpunten op. Eveneens te zien dat in tegenstelling tot de onderkant van de vleugel bij de rotsduif niet wit maar grijs is. De holenduif is een beschermd inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn holenduiven beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de holenduif is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. Holenduiven zijn standvogels en zwervers, die vooral in de winter in groepen naar voedsel zoeken. De afstanden die ze daarbij afleggen zijn niet erg groot, maar voldoende om voor vermenging te zorgen met soortgenoten uit de omliggende landen. Holenduiven uit noordelijke streken zakken af naar onder meer ons land omdat hier gemakkelijker aan voedsel te komen is.

De holenduif is door een aantal provincies onder de Wet natuurbescherming aangewezen als soort die belangrijke schade veroorzaakt. In de relevante provinciale verordeningen is vastgelegd welke maatregelen onder voorwaarden door grondgebruikers mogen worden gebruikt ter voorkoming of bestrijding van belangrijke schade door deze soort.

De holenduif heeft jaarlijks 2 of 3, soms zelfs 4 (of 5) legfels met meestal 2 eieren. Broedduur 16-17 dagen. Zoals de naam al suggereert zijn het hollenbroeders, zij gebruiken holtes in bomen, nestkasten, oude gebouwen en soms konijnenholten. De nesten zijn niet veel meer dan enkele takjes bij elkaar. Goede broedplekken worden jaarrond verdedigd. De jongen zitten zo'n 24 dagen op het nest. Ze zijn na 37-40 dagen zelfstandig. Het voedsel is vooral plantaardig en bestaat uit zaden en andere plantdelen. Foerageert op de grond, vaak in groepen. Vaker in graslanden te vinden dan houtduiven.

[Terug naar index](#)



Leefgebied

Gebroed wordt in bomen langs bosranden en open plekken in oud loofbos, ook in parken. Geregeld ook in schuren en uilennestkasten. De grootste aantallen holenduiven bevinden zich in het 'traditionele' agrarische gebied, met verspreid staande boerderijen, akkers en bossen: Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving: Holenduif

Soort:	Doffer	Duivin
Voorhoofd en bovenschedel	Blauw grijs	Gelijk de doffer maar wat kleine van formaat. Ook wat minder sprekende neusdoppen
Achterschedel en nek	Blauw grijs achter in de nek een paars groene heldere kleur.	
Mantel	Blauw grijs met een wat rosé gloed	
Rug en stuit	Blauw grijs stuit blauw grijs	
Borst	Hals, rosé tint op een wat grijze ondergrond	
Onderlijf	Licht grijs	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Licht grijs, onderstaart wat donkerder van tint	
Vleugel dekveren	Grijs	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Antraciet kleur wat lichter aan de buiten vlag	
Vleugelpennen, binnenvlag	Antraciet	
Bovenkant staart	Antraciet kleur met zwarte uiteinden.	
Onderkant staart	Wat donkerder dan bovenzijde	
Snavel	Licht vlees kleurig	
Neusdoppen	Vuilwit	
Ogen	Donker bruin	
Iris	Bruin	
Poten	Vleeskleurig naar rood toe	
Nagels	Licht hoornkleurig	
Grootte	29 tot 32 cm.	
Tekening:		
Vleugeltekening	Op de vleugels bevinden zich op de armpennen twee zwarte vleugelbanden. Deze lopen niet door op de grote pennen	
Oogring	Wat lichter dan de oogkleur	
Staart	Op de uiteinden van de pennen een zwarte band	
Grootte	28 tot 32 c/m.	

[Terug naar index](#)

HOUTDUIF

Wetenschappelijke naam: *Palumbus palumbus*

Nederlands: Houtduif
Engels: Wood pigeon
Duits: Ringeltaube

Familie: Duiven (Columbidae)

Grootte: 38-43 cm

Biotoop Bossen, parken, tuinen, en steden

Herkomst: Gehele jaar aanwezig

Algemeen:

De houtduif is de grootste in Nederland voorkomende duif en gemakkelijk te herkennen aan de witte vlek in de nek. In de vlucht zijn de witte vleugelpennen goed zichtbaar. De houtduif is een zware vogel maar vliegt toch snel en behendig en is erg wendbaar. De houtduif is een Pal arctische vogelsoort, dus met een breed voorkomen van Europa en noordelijk Afrika tot in Azië ten noorden van de Himalaya. Europa vormt echter het voornaamste verspreidingsgebied. De houtduif ontbreekt vrijwel nergens, alleen op IJsland is het een onregelmatige broedvogel. Grootste duif van ons land. De adulte houtduif heeft een witte vlek in de nek, een brede roze borst en een zeer kenmerkende witte streep op de vleugels, die goed zichtbaar zijn tijdens de vlucht. Door die witte vleugelstreep is de houtduif op grotere afstand gemakkelijk te onderscheiden van de stadsduif en holenduif. Jonge houtduiven missen de witte halsvlek. De houtduif kan eigenlijk het hele jaar tot broeden komen, voornamelijk in het voorjaar en de zomer. Kan drie legsels per jaar hebben met meestal 2 eieren. De late legsels zijn in de regel succesvoller doordat de nestpredatiedruk dan minder is. Houtduiven maken rommelige nesten van wat takken, die nog wel eens uit een boom komen vallen. Daarna maken zij weer een nieuw nest. Broedduur 16-17 dagen. De jongen zitten 28-29 dagen op het nest, vanaf 35 dagen volledig vliegvlug.



Leefgebied:

Houtduiven komen voor in vrijwel het hele land, zij ontbreken alleen in de meest boomloze landschappen.

Zij broeden in uiteenlopende biotopen, van tuinen en parken tot bossen.

Voor hun voedsel bezoeken ze daarnaast ook vaak akkers, waar graanresten te vinden zijn. Hoewel zij in het broedseizoen vaak solitair zijn, kunnen ze buiten het broedseizoen in grote groepen worden aangetroffen.

In herfst en winter soms massaal in eikenbossen om eikels te eten.

De meeste broedvogels in ons land zijn standvogels, maar een klein deel trekt weg richting Frankrijk en Spanje.

In de winter komen er in Nederland ook houtduiven bij uit Duitsland en de Scandinavische landen, een deel blijft hier tot in april.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving: Houtduif

	Doffer	Duivin
Voorhoofd en bovenschedel	Blauw grijs	Gelijk de doffer, snavel wat minder en neusdoppen wat minder aanwezig
Achterschedel en nek	Blauwgrijs, nek purper groene glans met daaronder een heldere witte band	
Mantel	Grijs met een wat bruine waas.	
Rug en stuit	Grijs stuit blauw grijs	
Borst	Grijs met een rosé schijn	
Onderlijf	Grijs	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Grijs	
Vleugel dekveren	Grijs met een wat bruine waas.	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Kleine hand pennen gelijk de vleugel dekveren, slagpennen zijn donker grijs tot zwart. Buitenvlag een witte omzoming	
Vleugelpennen, binnenvlag	Grote vleugel pennen en binnenvlag donker grijs met een donkere binnenvlag	
Bovenkant staart	Donker grijs tot zwart.	
Onderkant staart	Donker grijs tot zwart	
Snavel	Licht vleeskleurig	
Neusdoppen	Vuil wit	
Ogen	Rood bruin	
Iris	bruin	
Poten	Bruin rood	
Nagels	Hoornkleurig	
Tekening:		
Vleugeltekening	Over de gehele onderkant van de vleugel een witte band.	
Oogring	Wat lichter dan de kopkleur	
Staart	Eenkleurig geen tekening aanwezig.	
Opmerking	Vrij kleine kop t.o.v. het vrij grote lichaam. Meet 38 tot 43 c/m.	

[Terug naar index](#)

Turkse tortel:

Wetenschappelijke naam: *Streptopelia decaocto*

Nederlands: Turkse tortel
Engels: Collared dove
Duits: Türkentaube

Familie: Duiven (Columbidae)
Grootte: 26-28 cm
Biotoop: Bossen, parken, tuinen, en steden
Herkomst: Gehele jaar aanwezig

Algemeen:

De Turkse tortel is door zijn lichtbeige kleur met een zwarte streep in de nek goed te herkennen. In de vlucht goed te zien de vrij lange staart met brede witte uiteinden

De Turkse tortel broedt al vanaf half februari, tot in november. In deze periode heeft een paartje 2 tot wel 5 legsels met elk meestal 2 eieren. De jongen uit het eerste nest kunnen zich in hetzelfde seizoen zelf al voortplanten. Het broedsel mislukt regelmatig. Soms valt het gammele nest met eieren en/of kuikens uit de boom of waait weg. Behalve in bomen en struiken broeden zij ook op onder meer luifels en rolluiken. De Turkse tortel heeft een uitzonderlijk groot voortplantings- en verspreidingsvermogen. Ze kunnen tot wel 5 legsels per jaar groot brengen, waarbij hun jongen zich over zeer grote afstanden kunnen verspreiden. Dit maakt de Turkse tortel een bijzonder succesvolle soort, in tegenstelling tot de verwante zomertortel.

Leefgebied:

Het leefgebied van de Turkse tortel bestaat uit tuinen, parken, boerenerven en stadscentra. Hier worden de jongen groot gebracht en wordt het voedsel gevonden. Ook buiten steden kunnen ze bij menselijke bebouwing (boerenerven) worden aangetroffen.

De Turkse tortel is een standvogel, de jongen kunnen zich wel op zeer grote afstand van de geboorteplek vestigen. In 1900 broedde de Turkse tortel alleen in Klein-Azië. Tot aan de jaren '30 verspreidde deze soort zich over de Balkan en tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog had de Turkse tortel het grootste deel van Europa aan zijn areaal toegevoegd. In 1950 werd het eerste Nederlandse broedgeval gemeld, inmiddels heeft de soort geheel Europa veroverd, met uitzondering van IJsland.

[Terug naar index](#)



Kleuromschrijving: Turkse tortel:

Soort:	Doffer	Duivin
Voorhoofd en bovenschedel	Grijs met een wat rossig tint	Geheel gelijk de doffer.
Achterschedel en nek	Grijs bruin	
Mantel	Grijs bruin	
Rug en stuit	Grijs bruin	
Borst	Grijs bruin	
Onderlijf	Wat lichtere tint	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Gelijk het onderlijf onderstaart veren wat donkerder	
Vleugel dekveren	Grijs bruin	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Donker bruin	
Vleugelpennen, binnenvlag	Donker bruin	
Bovenkant staart	Grijs bruin	
Onderkant staart	Grijs bruin	
Snavel	Donker hoorn kleurig tot bijna zwart.	
Neusdoppen	Niet aanwezig	
Ogen	Rood bruin	
Iris	Donker rood	
Poten	Donker rood	
Nagels	Hoorn kleurig	
Tekening:		
Vleugeltekening	geen	
Oogring	Wat licht t.o.v. de oogkleur	
Staart	Geen tekening	
Hals tekening	Bij de overgang hals, mantel een zwarte band met daar boven een licht randje.	
Grootte	26 tot 28 c/m.	

[Terug naar index](#)

Europese tortel:

Wetenschappelijke naam: *Streptopelia turtur*

Nederlands: Europese tortel duif (Zomertortel)

Engels: Turtle dove

Duits: Turteltaube

Familie: Duiven (Columbidae)

Grootte: 26-28 cm

Biotoop : Bossen, parken, tuinen, en steden

Herkomst: Gehele jaar aanwezig

Algemeen:

De Europese tortel is de in Nederland voorkomende kleinste duif. Is duidelijk te herkennen aan het schubpatroon op het rugdek dit in de kleuren zwart met roodbruin. Ook de nekband die zwart met lichtblauw is, is een opvallende tekening bij deze duif. De zomertortel is de enige duivensoort uit Nederland die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere Nederlandse duivensoorten zijn standvogels. Zomertortels zijn meestal erg onopvallend en schuw voor een duivensoort. Het gehele jaar worden zaden gegeten, zowel oogstresten als onkruidzaden. Ei leg vanaf half mei tot eind juli. Heeft 2-3 legsels per jaar, maar door voedselgebrek soms maar 1 legsel. Per legsel 2 (soms 3) eieren. Broedt in open, veelal jong bos, kleinschalig cultuurlandschap met dichte grote struiken, niet (meer) in bebouwde omgeving. Broedduur 13-16 dagen. Jonge vogels zijn vliegvlug na 25-30 dagen. De zomertortel is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn zomertortels beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de zomertortel is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.



Leefgebied:

De zomertortel broedt in bosranden, parkachtige landschappen met verspreid staande bomen en bosjes, heggen, houtwallen en grote tuinen. Zijn voedsel zoekt de zomertortel op akkers en weilanden en in gevarieerde kruidenvegetatie. De zomertortel is de enige in ons land voorkomende duivensoort die elders overwintert. Zomertortels trekken in september-oktober weg in zuidwestelijke richting, via West-Frankrijk en het westelijk Iberisch schiereiland naar tropisch West-Afrika. Eind april of begin mei keren onze broedvogels weer terug. De zomertortel staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels in de categorie Kwetsbaar. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving: Europese tortel

Soort:	Doffer	Duivin
Voorhoofd en bovenschedel	Rossig grijs overgoten.	Gelijk als de doffer
Achterschedel en nek	Rossig grijs overgoten naar de nek toe wat grijzer. In de nek zelf zitten aan de zijkanten zwarte veren met een mooi witte omzoming.	Grootte is 25 tot 27 c/m.
Mantel	Rossig	
Rug en stuit	Rossig stuit is bruin grijs.	
Borst	Rossig wat grijs overgoten.	
Onderlijf	Wat lichter dan de borst.	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Lichter gekleurd dan onderlijf. Onderstaart veren zwart bruin met lichte uiteinden.	
Vleugel dekveren	Zwart in het centrale deel van de veren met een roest bruine omzoming	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Donker bruin	
Vleugelpennen, binnenvlag	Donker bruin	
Bovenkant staart	De twee buitenste pennen zijn geheel donker bruin de overige zijn donkerbruin met lichte uiteinden.	
Onderkant staart	Donker bruin met lichtere uiteinden.	
Snavel	Hoorn kleurig	
Neusdoppen	Zijn bijna niet aanwezig	
Ogen	Donker rood	
Iris	Rood bruin	
Poten	Donker rood	
Nagels	Hoornkleurig	
Tekening:		
Vleugeltekening	Over de gehele vleugel een mooie regelmatige tekening die ontstaat door een zwart centraal deel met roest bruine omzoming	
Oogring	Roodbruin	
Staart	Witte band op uiteinde v.d. staart	
Hals tekening	Aan zijkanten van de hals een tekening die ontstaat door zwarte veertjes met een vuil witte omzoming.	

[Terug naar index](#)

Rotsduif

Wetenschappelijke naam: *Columba livia*


Nederlands: Rotsduif
Engels: Rock pigeon
Duits: Felsentaube

Algemeen:

De Rotsduif is het best te herkennen aan de twee zwarte vleugelbanden. In de vlucht valt de donkergrijze staart met de zwarte eindband en de witte ondervleugel op. In grootte tussen Houtduif en Holenduif. Lijkt op Holenduif; verenkleed hoofdzakelijk grijs met groene en paarse glans op zijhals, twee duidelijke vleugelstrepen en zwarte eindband aan staart. Belangrijkste onderscheidende kenmerk is witte stuit. Ondervleugels wit, snavel zwart. De gedomesticeerde vorm, de Stadsduif, is algemeen bij menselijke bewoning en enkele kleurvariëteiten hiervan lijken precies op Rotsduif. Kruist soms met Stadsduif

Het verenkleed is lichtgrijs van kleur, met een donkergrijze kop en hals. De zijden van de hals zijn glanzend groen en paars. De vleugels bevatten twee donkere vleugelstrepen. In de vlucht valt de donkergrijze staart met de zwarte eindband en de witte ondervleugel op. De snavel is donker met een witte vlezig washuid rond de neusgaten. Het verenkleed bij beide geslachten is gelijk. De lichaamslengte bedraagt 31 tot 34 cm en het gewicht 200 tot 300 gram. Het legsel bestaat meestal uit twee vuilwitte eieren, die door beide vogels in 17 dagen uitgebroed worden in een nest op een rotsrichel of in holten. Er kunnen twee tot drie broedsels per jaar voorkomen.

[Terug naar index](#)



Leefgebied:

De rotsduif komt oorspronkelijk uit Europa, Azië en Noord-Afrika. De halfwilde stadsduif, ontstaan uit 'wilde' rotsduiven en verwilderde tamme duiven, wordt soms beschouwd als een ondersoort: *Columba livia domestica*.

Ringmaat:

Zie vogelindex website NBV (Cités bijlage A) moeten dus geringd zijn.

[Terug naar index](#)

Kleuromschrijving Rotsduif

Soort:	Doffer	Duivin
Voorhoofd en bovenschedel	Lichtgrijs	Duivin gelijk van kleur en tekening. Wat kleinere snavel met minder sprekende neusdoppen.
Achterschedel en nek	Lichtgrijs nek een glanzend groene en paarse tint.	
Mantel	Licht grijs	
Rug en stuit	Licht grijs stuit is vuil wit.	
Borst	Hals gelijk de kleur die vanuit de nek komt. Wat donker grijs hier net onder.	
Onderlijf	Donker grijs	
Aarsstreek en onderstaart dekveren	Donker grijs bij aars iets lichter	
Vleugel dekveren	Licht grijs	
Vleugelpennen, buitenvlag en top	Grijs	
Vleugelpennen, binnenvlag	Grijs onder de vleugels vrij licht tot wit.	
Bovenkant staart	Donker grijs	
Onderkant staart	Donker grijs	
Snavel	Zwart	
Neusdoppen	Vuil wit	
Ogen	Rood bruin	
Iris	Bruin	
Poten	Donker rood	
Nagels	Hoornkleurig	
Tekening:		
Vleugeltekening	Twee zwarte royale vleugelbanden over de gehele vleugel. Buiten deze banden mag geen zwart aanwezig zijn.	
Oogring	Donker	
Staart	Zwarte band op uiteinde van de staartpennen.	
Grootte	31 tot 33 c/m.	
Algemeen:	Mutanten worden niet gevraagd.	Mutanten worden niet gevraagd.

[Terug naar index](#)